

Guía de emergencia en trasplantes de médula ósea



Memorial Sloan-Kettering
Cancer Center

Síntoma		Acción
EMERGENCIAS	ESTADO DE ALERTA	Imposibilidad para despertar Convulsiones Alteraciones repentinas en la visión Incapacidad repentina para mover los brazos o las piernas
	HEMORRAGIAS	Hemorragia incontrolable Imposibilidad para despertar
	AZÚCAR EN LA SANGRE	Mayor a 400 o menor a 50
	RESPIRACIÓN	Sin respiración Ahogo
	CATÉTER CENTRAL	Catéter abierta al aire y dificultad para respirar - pinzar el catéter inmediatamente
	CAÍDAS	Golpe en la cabeza al caer Alteraciones en el conocimiento
	FATIGA	Imposibilidad para despertar
	MUCOSITIS CON DOLOR EN LA BOCA	Sin respiración Dificultad respiratoria
	DOLOR	Dolor intenso en el pecho Compresión o presión intensa en el pecho Dolor de cabeza intenso y repentino
	HINCHAZÓN	Hinchazón en la garganta Dificultad respiratoria
NO EMERGENCIAS	Consulte la guía de referencia de síntomas en la página siguiente	

1. **Llame al 911**
No transportar al paciente sin el apoyo de servicios médicos de emergencia (EMS, por sus siglas en inglés)

2. **Pida que lo lleven al Centro de Atención de Urgencias en el MSKCC**
Lunes-Viernes: de 6 a. m. hasta la media noche
Ingrese por 425 East 67th St.

A cualquier hora distinta entrar por 1275 York Ave. y pedir indicaciones en el puesto de seguridad

3. **Identificar al paciente como un paciente de trasplante de médula ósea**

8 a. m. a 8 p. m.
Llame al
(212) 639-2399

8 p. m. a 8 a. m.
Llame al
(212) 639-2000
Pregunte por el médico a cargo de los trasplantes de médula ósea

Síntoma	EMERGENCIA	NO ES EMERGENCIA	
	Acuda al Centro de Atención de Urgencias en el MSKCC	8 a. m. a 8 p. m. llamar a la clínica BMT: (212) 639-2399 8 p. m. a 8 a. m. llamar al (212) 639-2000 y preguntar por el médico a cargo de los trasplantes de médula ósea	
ESTADO DE ALERTA	Imposibilidad para despertar Convulsiones Alteración repentina en la visión Incapacidad repentina para mover los brazos o las piernas	Aumento o aparición de confusión Cambio en el nivel de alerta Cambio en el estado de ánimo Cambio en el nivel de energía Dificultad para dormir Caídas	Mareos Letargia Temblores/tembladera Entumecimiento, hormigueo Incapacidad para desplazarse Dificultad para tragar
HEMORRAGIA	Hemorragia incontrolable Imposibilidad para despertar	Aumento o aparición de hemorragias Sangrado por la nariz que no detiene Orina con sangre Diarrea con sangre Vómitos de sangre	Se utilizan 1 o más toallas por hora Aparición de moretones Pequeñas manchas rojas o moradas en la piel
AZÚCAR EN LA SANGRE	Mayor a 400, menor a 50	Azúcar en la sangre entre 50 y 401 Dificultad para despertar	
RESPIRACIÓN	Sin respiración Ahogo	Dificultad para respirar Sensación de no poder inhalar suficiente aire Dificultad para respirar al permanecer acostado Sensación de "fatiga" con más facilidad con actividad mínima	Sibilancias al respirar Tos persistente o de aparición reciente Tos con sangre o secreciones verdes o amarillas
CATÉTER CENTRAL	Catéter abierta al aire y dificultad para respirar Pinzar el catéter inmediatamente	Catéter roto o con fugas Hinchazón de la cara o el cuello Hinchazón, enrojecimiento o sensibilidad en el lugar	Dolor en el sitio Drenaje del sitio Incapacidad para vaciar el catéter Caída del catéter
DIARREA		Diarrea incontrolable Diarrea con fiebre y calambres abdominales	Diarrea de aparición reciente Pastillas enteras que pasan en las heces
CAÍDAS	Golpe en la cabeza al caer Alteraciones en el conocimiento después de la caída	No sufrió golpe en la cabeza al caer No presentó alteraciones en el conocimiento después de la caída	
FATIGA	Imposibilidad para despertar	Mareos Cansancio excesivo para salir de la cama o para ir al baño	
FIEBRE/ ESCALOFRÍOS		Escalofríos, la temperatura puede ser normal Temperatura oral superior a 100,4 °F (38 °C) Fiebre superior a 100 °F (38 °C) si recibe tratamiento con esteroides Síntomas de resfriado (secreción nasal, ojos llorosos, estornudos, tos)	
MUCOSITIS/ DOLOR EN LA BOCA	Sin respiración Dificultad respiratoria	Sangre roja brillante en la boca Dolor que no cede con los medicamentos Parches blancos o llagas en las encías, boca o labios Dificultad para deglutir alimentos o bebidas	
NÁUSEAS/ VÓMITOS		Náuseas que persisten sin control a pesar de los medicamentos antieméticos Vómitos y náuseas constantes y sin control Vómitos con sangre o con material con apariencia a café molido No puede mantener los medicamentos en el estómago Vómitos en proyectil Dolor abdominal intenso al vomitar	
DOLOR	Dolor intenso en el pecho Compresión o presión intensa en el pecho Dolor de cabeza intenso y repentino	Dolor de aparición reciente o no controlable Dolor de cabeza de aparición reciente Molestia en el pecho Latidos cardíacos rápidos Sensación de "aleteo" en el corazón Ardor en el pecho o en el estómago Dolor o ardor durante la micción o la defecación Dolor en el sitio de la vía central Dolor con la perfusión de medicamentos o líquidos en la vía central	
ERUPCIÓN CUTÁNEA		Erupción cutánea de aparición reciente Erupción cutánea con dolor y/o picazón	
HINCHAZÓN	Hinchazón en la garganta Dificultad para respirar	Hinchazón repentina con o sin dolor Hinchazón de las piernas, los brazos y/o las manos	
AL ORINAR		Incapacidad para orinar durante más de 8 horas Orina con sangre Dolor o ardor al orinar	