



PATIENT & CAREGIVER EDUCATION

Aluminum Sulfate and Calcium Acetate

Marcas estadounidenses

Domeboro® [OTC]; Gordon Boro-Packs [OTC]; Pedi-Boro® [OTC]

¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la irritación de la piel.

¿Puede mi niño tomar este medicamento sin riesgo?

- No si el niño es alérgico al sulfato de aluminio, el acetato de calcio o a algún otro componente de este medicamento.
- No olvide indicar a su médico si el niño es alérgico o reacciona a algún medicamento, conservante de alimentos o colorantes. No olvide informarle de su alergia y la forma en que la misma ha afectado al niño. Entre otras, algunas afecciones que debe mencionar son: sarpullido; urticaria; comezón; falta de aire; silbido en el pecho; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma que haya ocurrido.

¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija toma este medicamento?

- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos que el niño toma (recetados, productos naturales, vitaminas, medicamentos que obtuvo sin receta). Entregue esta lista al médico del niño.
- No cubra la compresa ni el apósito mojado con plástico.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?

- Si cualquier parte de esta información le preocupa, si aparece alguno de los efectos secundarios indeseados o si niño no se mejora después de tomar este medicamento.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.
- Si el niño presenta signos de una muy mala reacción, llame al doctor o a Urgencias de inmediato. Entre otros: silbido; tensión en el pecho; fiebre, comezón; tos fuerte; piel de color azulado; ataques; inflamación de la cara, los labios, la lengua, o la garganta; o si el niño presenta algún otro comportamiento fuera de lo común.
- Si el niño tiene irritación severa en la piel.
- Si aparece un sarpullido en el niño.
- Si el problema de salud de su hijo no mejora o si usted cree que empeora.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

- Sarpullido.
- Irritación cutánea.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea y siga al pie de la letra la dosificación que se indica en la etiqueta.

- No administre por la boca. Solo para uso cutáneo. No acerque a la boca, la nariz ni los ojos (puede quemar) del niño.
- Las tabletas o paquetes se disuelven en agua a temperatura ambiente.

Compresa o apósito húmedo:

- Lávese las manos antes y después de usar.
- Sature un paño limpio y blanco (por ejemplo: pañal, pañuelo, sábana) con la solución.
- Aplique el paño sobre la zona afectada.
- Puede cubrirlo con una toalla seca.
- Repita cada 15 a 30 minutos o según sea necesario.

Remojadores:

- Remoje el área afectada por 15 a 30 minutos.
- Repita 3 veces al día o según sea necesario.
- Enjuague con agua el área tratada y seque a toques.
- Deseche la solución usada después de cada uso.
- Suspenda el medicamento cuando desaparezca la condición.
- Si vuelven a aparecer síntomas o signos, vuelva a tomar el medicamento.

¿Qué hago si el niño se salta una dosis? (no es pertinente para pacientes hospitalizados)

- Aplique la dosis que olvidó lo antes posible.
- Muchas veces este medicamento se administra según sea necesario.

¿Cómo debo guardar y/o desechar este medicamento?

- Conserve a temperatura ambiente.
- La solución usada no se debe reusar.

Domeboro (marca):

- La solución sin usar se puede guardar en un recipiente cerrado por hasta 7 días.

Afirmaciones generales

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta los medicamentos de su hijo con otras personas ni le administre a su hijo el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos de su hijo (recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas). Entregue esta lista al médico de su hijo.
- Hable con el médico de su hijo antes de administrarle cualquier medicamento nuevo, ya sea uno

recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas.

- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento consulte al médico de su hijo, el farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para usted. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y beneficios de tomar este medicamento.

Copyright

Todo el contenido está protegido por derechos de autor (copyright © 1978-2014) de Lexi-Comp Inc. o sus respectivos dueños. Todos los derechos están reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, consulte a su médico, enfermero/a u otro integrante de su equipo de atención médica. Puede encontrarlos de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 en el _____ . Después de las 17:00, los fines de semana y días festivos, llame al _____ . Si no figura ningún número, o si no está seguro, llame al (212) 639-2000.

Aluminum Sulfate and Calcium Acetate

Printed on January 28, 2015, 4:11 pm [P-5597-es]