Memorial Sloan Kettering Cancer Center

PATIENT & CAREGIVER EDUCATION

Esomeprazole

Marcas estadounidenses

NexIUM; NexIUM I.V.

Marcas canadienses

Apo-Esomeprazole; Mylan-Esomeprazole; Nexium; PMS-Esomeprazole DR

¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar la enfermedad del reflujo gastroesofágico.
- Este medicamento se utiliza para tratar o evitar úlceras gastrointestinales provocadas por una infección.
- Este medicamento se utiliza para tratar o evitar úlceras en el esófago.
- Este medicamento se utiliza para tratar los síndromes provocados por la cantidad elevada de ácidos estomacales.
- Este medicamento se utiliza para tratar o evitar las úlceras gástricas asociadas con los AINE (antiinflamatorios no esteroideos) en pacientes con antecedente de úlceras.
- Este medicamento se utiliza para tratar el ardor de estómago.
- Se usa para reducir la probabilidad de úlceras sangrantes después de un procedimiento determinado (endoscopía).
- Este medicamento se le puede administrar por otras razones. Comuníquese con el proveedor de salud médica.

¿Qué debo informar al médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico al esomeprazol o cualquier otro componente de este medicamento.
- Si es alérgico a algún medicamento como este, a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado, tales como, sarpullido; urticaria; comezón; falta de aire; sibilancia; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.
- Si toma alguno de los siguientes medicamentos: atazanavir, clopidogrel, nelfinavir, rifampina o la hierba de San Juan.

Nexium 24HR:

- Si tiene alguno de los trastornos siguientes: Heces de color negro o con sangre, ardor estomacal con mareos, sudoración o mareos, dolor de pecho, dolor en los hombros con dificultad para respirar, dolor que se extiende a los brazos, cuello u hombros, mareos, abundante sudoración, vómitos con sangre o problemas o dolor al tragar alimentos.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo tener en cuenta al usar este medicamento?
Todas las presentaciones:

- Informe al dentista, cirujano u otro personal médico que usa este medicamento.
- Tenga cuidado si tiene factores de riesgo como osteoporosis (uso de alcohol, fuma cigarrillos, otros familiares con osteoporosis, está tomando medicamentos para tratar convulsiones, está tomando esteroides).
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Informe al médico y a los bioquímicos que está tomando este medicamento.
- Llame a su médico si tiene dolor de garganta, dolor en el pecho, dolor abdominal muy fuerte, problemas para tragar o signos de una úlcera que sangra como heces de color negruzco con aspecto alquitranado o sanguinolentas, vómitos con sangre o vómito que parece granos de café. Estos pueden síntomas de un problema de salud más grave.
- Tome calcio y vitamina D según las recomendaciones de su médico.
- Este medicamento puede aumentar la posibilidad de fracturarse la cadera, la columna vertebral o la muñeca en las personas con huesos débiles (osteoporosis). El riesgo puede ser mayor si toma este medicamento en grandes dosis o si lo toma durante más de un año, o si es mayor de 50 años. Hable con su médico.
- Las personas que tomaron medicamentos como este durante 3 meses, como mínimo, rara vez presentaron niveles bajos de magnesio. La mayoría de las veces, esto sucedió después de 1 año de tratamiento. Deberá realizarse un análisis de sangre si tomará este medicamento durante un largo tiempo o si toma otros medicamentos específicos como la digoxina o las píldoras de agua. Hable con su médico.
- Informe a su médico si está embarazada o tiene intención de embarazarse. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios de utilizar este medicamento mientras esté embarazada.
- Informe a su médico si está amamantando a su bebé. Tendrá que hablar acerca de si hay riesgos para el bebé.

Nexium 24HR:

- Es posible que se requieran varios días para que se manifiesten los resultados completos.

Razones por las que debe llamar a su médico de inmediato.
ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: *A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:*

Todas las presentaciones:

- Síntomas de una reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; comezón; piel inflamada, con ampollas o descamada con o sin fiebre; silbido en el pecho; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Síntomas de niveles bajos de magnesio como cambios de humor, dolor o debilidad en los músculos, calambres o espasmos musculares, convulsiones, temblores, falta de apetito, mucho malestar estomacal o vómitos, o pulso que no parece normal.
- Mareos severos o desmayos.
- Dolor severo de panza.
- Dolor de huesos.
- Fiebre o escalofríos.
- Dolor de garganta.
- Falta de aire.
- Notable pérdida de peso.
- Este medicamento puede aumentar el riesgo de tener diarrea muy fuerte. Llame a su médico de inmediato si tiene dolor de estómago o cólicos, heces muy flojas o acuosas o con sangre. No intente tratar las heces flojas sin consultar primero al médico.
- Puede producirse una reacción cutánea grave (síndrome de Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica). Puede ocasionar problemas de salud graves que no desaparecen y, en ocasiones, la muerte. Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta signos como enrojecimiento, inflamación, ampollas o descamación de la piel (con o sin fiebre); enrojecimiento o irritación en los ojos; o heridas en la boca, la garganta, la nariz o los ojos.

Inyección:

- Irritación en la zona en la que se aplicó la inyección.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Dolor de cabeza.
- Somnolencia.
- Dolor abdominal.
- Diarrea o materia fecal blanda.
- Estreñimiento.
- Gas.
- Boca seca.

- Náuseas.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea y siga al pie de la letra la dosificación que se indica en la etiqueta.

Todas las presentaciones:

- Tómelo según las indicaciones de la receta, aun si se siente bien.
- Consulte a su médico antes de tomar antiácidos con este medicamento.

Nexium 24HR:

- Tome este medicamento en ayunas antes del desayuno.
- Se debe tragar entero. No se debe masticar, romper ni triturar.
- Tome este medicamento con un vaso de agua.
- No utilice el medicamento por más de 14 días o con mayor frecuencia que cada 4 meses, a menos que su médico le indique que lo haga.

Todos los demás productos orales:

- Tome este medicamento 1 hora antes de comer.

Cápsula:

- Se debe tragar entero. No se debe masticar, romper ni triturar.
- Puede rociar el contenido de la cápsula con una cucharada (15 mL) de puré de manzanas. Tómelo inmediatamente y no mastique los gránulos.
- Los que tienen sonda de alimentación pueden preparar un líquido. Vacíe el contenido de la cápsula en una jeringa de 60 mL con 50 mL de agua. Vuelva a colocar el émbolo y agite por 15 segundos. Enjuague la sonda de alimentación antes y después de administrar este medicamento.

Gránulos:

- Mezcle los gránulos de 2.5 mg o 5 mg con 1 cucharadita (5 mL) de agua, y los gránulos de 10 mg, 20 mg, o 40 mg con 1 cucharada (15 mL) de agua; deje reposar for unos minutos. Mezcle y beba.
- Enjuague con más agua y beba.
- Las personas con sonda de alimentación pueden preparar una solución. Vacíe el contenido del paquete en una jeringa con 1 cucharadita o 1 cucharada (5 o 15 ml) de agua. Coloque el émbolo y agite. Deje asentar durante unos minutos. Luego de utilizar este medicamento, vuelva a llenar la jeringa con agua, agite y enjuague la sonda de alimentación.

Inyección:

- Este medicamento se administra por inyección intravenosa.
- Su proveedor de salud médica puede enseñarle cómo utilizarlo.
- Siga las instrucciones de uso cuidadosamente.
- No utilizar si la solución se ve turbia, pierde o contiene partículas.
- No utilizar si la solución cambia de color.
- Deseche las agujas en la caja para agujas y objetos cortantes. Cuando la caja esté llena, siga todos los procedimientos locales para desecharla. Si tiene dudas, hable con un médico o con un farmacéutico.

¿Qué hago si se me olvida tomar una dosis?

Todas las presentaciones:

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

Nexium 24HR:

- No tome más de 1 dosis de este medicamento dentro el mismo día.

¿Cómo debo conservar este medicamento?

Todos los productos orales:

- Conserve a temperatura ambiente.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.

Inyección:

- La mayoría de las veces, este medicamento se administra en el hospital o el consultorio del médico. Si se almacena en el hogar, siga las instrucciones de almacenamiento que le proporcione su médico.

Todas las presentaciones:

- Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Pregunte al farmacéutico cómo se deben desechar los medicamentos no utilizados.

Afirmaciones generales

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos que toma (recetados, productos naturales, suplementos, vitaminas, medicamentos que obtuvo sin receta). Entregue esta lista al médico.
- Hable con su médico antes de comenzar a tomar cualquier medicamento, ya sea uno recetado o sin receta, productos naturales o vitaminas.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.

- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riegos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright

Todo el contenido está protegido por derechos de autor (copyright © 1978-2014) de Lexi-Comp Inc. o sus respectivos dueños. Todos los derechos están reservados.

Si tiene preguntas o inquietudes, comuníquese con el médico, un miembro del personal de enfermería u otro miembro del equipo de atención médica. Puede llamarlos de lunes a viernes, de 9:00 a. m. a 5:00 p. m. al _____. Después de las 5:00 p. m., durante el fin de semana y los días feriados, llame al _____. Si no se indica ningún número o si no sabe a cuál llamar, llame al (212) 639-2000..

Esomeprazole
Printed on July 29, 2014, 12:53 pm [L-6133-es]