



PATIENT & CAREGIVER EDUCATION

Kanamycin

Advertencia

- Este medicamento puede causar problemas renales, daño nervioso y una pérdida prolongada de la audición, aun con dosis normales. El riesgo puede ser más alto en personas mayores o personas con pérdida de líquidos. La pérdida de la audición puede aparecer incluso después de interrumpir la administración de este medicamento. Si su hijo ya tiene problemas renales o de audición, dígaselo al médico. Es posible que el médico deba interrumpir este medicamento si su hijo presenta problemas renales o de audición. El médico controlará a su hijo cuidadosamente y puede pedirle pruebas de audición o de los riñones. No administre a su hijo este medicamento junto con otros medicamentos que pudieran causar problemas nerviosos, renales o auditivos. Existen muchos medicamentos que pueden hacer esto. Pregúntele al médico o al farmacéutico si no está seguro.

¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar distintos tipos de infecciones bacterianas.

¿Puede mi niño tomar este medicamento sin riesgo?

- No si el niño es alérgico a la kanamicina o cualquier otro componente de este medicamento.
- No olvide indicar a su médico si el niño es alérgico o reacciona a algún medicamento, conservante de alimentos o colorantes. No olvide informarle de su alergia y la forma en que la misma ha afectado al niño. Entre otras, algunas afecciones que debe mencionar son: sarpullido; urticaria; comezón; falta de aire; silbido en el pecho; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma que haya ocurrido.

¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija toma este medicamento?

- Si el niño tiene pérdida del oído, consulte al médico.
- Si el niño tiene enfermedad renal, consulte al médico.
- Infórmele al médico acerca de todos los medicamentos que el niño esté tomando. Es posible que este medicamento no vaya bien con algunos otros medicamentos.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos que el niño toma (recetados, productos naturales, vitaminas, medicamentos que obtuvo sin receta). Entregue esta lista al médico del niño.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?

- Si cualquier parte de esta información le preocupa, si aparece alguno de los efectos secundarios indeseados o si niño no se mejora después de tomar este medicamento.
- Si el niño presenta signos de una muy mala reacción, llame al doctor o a Urgencias de inmediato.

Entre otros: silbido; tensión en el pecho; fiebre, comezón; tos fuerte; piel de color azulado; ataques; inflamación de la cara, los labios, la lengua, o la garganta; o si el niño presenta algún otro comportamiento fuera de lo común.

- Si el niño demuestra un cambio significativo en el equilibrio.
- Si el niño se siente extremadamente cansado o adormecido.
- Si el niño se siente muy nervioso o excitable.
- Si el niño tiene náuseas o vómitos severos.
- Si el niño tiene heces muy blandas (diarrea), incluso después de dejar de tomar el medicamento.
- Si el niño demuestra una modificación auditiva.
- Si aparece un sarpullido en el niño.
- Si el problema de salud de su hijo no mejora o si usted cree que empeora.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

- Dolor de cabeza.
- Diarrea o materia fecal blanda.
- Rara vez se puede producir una modificación auditiva.
- Rara vez se puede producir daño en los riñones.
- Se siente cansado o débil.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea y siga al pie de la letra la dosificación que se indica en la etiqueta.

- Este medicamento se administra por inyección intramuscular o intravenosa.

Afirmaciones generales

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos de su hijo (recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas). Entregue esta lista al médico del niño.
- Hable con el médico de su hijo antes de administrarle cualquier medicamento nuevo, ya sea uno recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento consulte al médico de su hijo, el farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro.

Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright

Registrados todos los derechos © 2014 Clinical Drug Information, LLC y Lexi-Comp, Inc.

Si tiene preguntas o inquietudes, consulte a su médico, enfermero/a u otro integrante de su equipo de atención médica. Puede encontrarlos de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 en el _____ . Después de las 17:00, los fines de semana y días festivos, llame al _____ . Si no figura ningún número, o si no está seguro, llame al (212) 639-2000.

Kanamycin

Printed on January 27, 2015, 2:57 pm [P-6418-es]