



PATIENT & CAREGIVER EDUCATION

Lisdexamfetamine

Marcas estadounidenses

Vyvanse

Marcas canadienses

Vyvanse

Advertencia

- Este medicamento puede producir dependencia; evite el uso prolongado. Administre este medicamento al niño según lo indicado por el médico. Informe al médico si el niño ha abusado alguna vez de las drogas o el alcohol. El uso indebido de este medicamento puede provocar efectos secundarios perjudiciales para el corazón o incluso muerte súbita. Informe al médico si el niño tiene alguna enfermedad del corazón.

¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar el trastorno de hiperactividad con déficit de atención (ADD en inglés).
- Se le puede recetar este medicamento al niño por otras razones. Consulte al médico.

¿Qué debo informar al médico ANTES de que mi hijo/hija tome este medicamento?

- Si su hijo tiene alergia a este medicamento o a alguno de sus componentes.
- Si su hijo es alérgico a algún medicamento como este o a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe al médico acerca de la alergia y qué síntomas presentó su hijo, tales como sarpullido; urticaria; picazón; falta de aire; sibilancias; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.
- Si el niño o algún familiar tiene alguno de los trastornos siguientes: enfermedad de los vasos sanguíneos; glaucoma; presión arterial alta; estado de nerviosismo, ansiedad o tensión; hiperactividad de la tiroides; problemas en la estructura del corazón u otros problemas de corazón o síndrome de Tourette o tics.
- Si el niño ha tenido alguna vez alguno de los trastornos siguientes: abuso de drogas o accidente cerebrovascular.
- Si su hijo ha tomado ciertos medicamentos para la falta de ánimo (depresión) como isocarboxazida, fenelzina o tranilcipromina, o medicamentos para tratar otros problemas de salud en los últimos 14 días. Tomar este medicamento dentro de los 14 días de haber tomado esos otros medicamentos puede hacer que su presión arterial aumente demasiado. Hable con el médico de su hijo.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este

medicamento.

Informe al médico y al farmacéutico acerca de todos los medicamentos que use su hijo (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales o vitaminas) y los problemas de salud que padezca. Debe verificar que sea seguro que su hijo tome este medicamento con todos sus otros medicamentos y problemas de salud. No empiece, interrumpa ni modifique la dosis de ningún medicamento que tome su hijo sin consultar antes al médico.

¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija toma este medicamento?

- Informe al dentista, cirujano u otro personal médico que el niño usa este medicamento.
- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.
- Si el niño ha estado tomando este medicamento durante un período largo o en dosis altas, es posible que no surta efecto y que deba tomar dosis más altas para lograr el mismo efecto. Esto se conoce como tolerancia. Llame al médico si este medicamento deja de surtir efecto. No administre más de lo que se le indicó.
- Este medicamento puede producir dependencia con el uso prolongado.
- Si el niño ha estado tomando este medicamento durante varias semanas, consulte al médico antes de suspenderlo. Es posible que deba suspenderlo en forma gradual.
- El niño puede tener varias pruebas del corazón antes de comenzar con este medicamento. Comuníquese con el proveedor de salud médica.
- Este medicamento puede causar presión alta.
- Pida que le controlen la presión sanguínea y el pulso con regularidad al niño. Hable con el médico del niño.
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Asegúrese de que el médico y los bioquímicos sepan que su hijo toma este medicamento.
- Consulte con el proveedor de atención médica antes de entregar productos de venta libre que puedan aumentar la presión arterial. Algunos de ellos son los siguientes: remedios para la tos y el resfriado, pastillas para dieta, estimulantes, ibuprofeno o productos similares y ciertos productos naturales o suplementos.
- Este medicamento puede afectar el crecimiento de niños y adolescentes en algunos casos. Es posible que necesiten controles de crecimiento periódicos. Consulte al médico.

Si su hija está embarazada o amamantando a un bebé:

- Consulte al médico si su hija está embarazada, queda embarazada o está amamantando a un bebé. Tendrá que hablar acerca de los beneficios y los riesgos de utilizar este medicamento.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: *A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, y en ocasiones mortales, al tomar un medicamento. Si su hijo*

presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que pueden estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo al médico de su hijo o busque ayuda médica de inmediato:

- Síntomas de una reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; comezón; piel inflamada, con ampollas o descamada con o sin fiebre; silbido en el pecho; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Severo dolor de cabeza.
- Latido cardíaco acelerado.
- Pulso que no se siente normal.
- Agitación.
- Temblor.
- Cambios en el color de las manos o los pies, de pálido a azul o rojo.
- Entumecimiento, dolor, hormigueo o sensación de frío en las manos o los pies.
- Llagas o heridas en los dedos de las manos o los pies.
- Se han producido muertes súbitas con este medicamento en personas con problemas de corazón o defectos cardíacos. También se han producido accidente cerebrovascular y ataque cardíaco en adultos que toman este medicamento. Llame al médico de inmediato si el niño tiene un cambio en la fuerza (más fuerza en 1 lado que en el otro), dificultad para pensar o hablar, modificaciones en el equilibrio, cambio en la visión, dolor o presión en el pecho, falta de aire o mareos muy intensos o pérdida de la conciencia.
- Se han producido cambios de estado de ánimo o de comportamiento como dificultades para pensar, enojo y alucinaciones o estos han empeorado con este medicamento. Llame al médico si el niño o un familiar tienen problemas mentales o de estado de ánimo como falta de ánimo (depresión) o trastorno bipolar o si algún familiar se ha suicidado. Llame al médico de inmediato si el niño tiene alucinaciones; cambia el modo en que actúa; o presenta signos de falta de ánimo (depresión), ideas de suicidio, nervios, irregularidades emocionales, pensamiento anormal, ansiedad, falta de interés en la vida.

Si su hijo es sexualmente activo o puede serlo:

- Modificación en la capacidad sexual.
- Disminución del interés sexual.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no padecen ningún efecto secundario o padecen solamente efectos secundarios menores. Llame al médico de su hijo o busque ayuda médica si al niño le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Dolor abdominal.
- Náusea o vómito.
- No tiene apetito.

- Pérdida de peso.
- Incapacidad para dormir.
- Ansiedad.
- Diarrea o materia fecal blanda.
- Boca seca.
- Mareos.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico de su hijo. Llame al médico de su hijo para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea y siga al pie de la letra la dosificación que se indica en la etiqueta.

- Administre este medicamento aproximadamente a la misma hora del día.
- Para sacar el mayor provecho de este medicamento, no permita que el niño se salte ninguna dosis.
- Administre este medicamento durante las primeras horas del día para ayudar a evitar problemas de sueño.
- Administre este medicamento con o sin alimentos.
- El niño debe tragarla entera. Anime al niño a no masticar, romper o triturarla.
- Puede mezclar el contenido de la cápsula con yogur, agua o jugo de naranja. Si fuera necesario, puede utilizarse una cuchara para separar el polvo que se pegó. Mezcle bien.
- Si lo mezcla, trague el medicamento mezclado de inmediato. No almacene para utilizar más tarde.

¿Qué hago si mi hijo/hija olvida tomar una dosis?

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.
- No administre 2 dosis simultáneamente ni administre dosis adicionales

¿Cómo debo guardar y/o desechar este medicamento?

- Conserve a temperatura ambiente.
- Proteja de la luz.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Pregunte al farmacéutico cómo se deben desechar los medicamentos no utilizados.

Afirmaciones generales

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.

- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos de su hijo (recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas). Entregue esta lista al médico del niño.
- Hable con el médico de su hijo antes de administrarle cualquier medicamento nuevo, ya sea uno recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento consulte al médico de su hijo, el farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright

Registrados todos los derechos © 2014 Clinical Drug Information, LLC y Lexi-Comp, Inc.

Si tiene preguntas o inquietudes, consulte a su médico, enfermero/a u otro integrante de su equipo de atención médica. Puede encontrarlos de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 en el _____ . Después de las 17:00, los fines de semana y días festivos, llame al _____ . Si no figura ningún número, o si no está seguro, llame al (212) 639-2000.

Lisdexamfetamine

Printed on January 26, 2015, 4:03 pm [P-321396-es]