



PATIENT & CAREGIVER EDUCATION

# Penicillin G Benzathine and Penicillin G Procaine

## Marcas estadounidenses

Bicillin® C-R; Bicillin® C-R 900/300

### ¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar distintos tipos de infecciones bacterianas.

### ¿Puede mi niño tomar este medicamento sin riesgo?

- No si el niño es alérgico a la penicilina o a algún otro componente de este medicamento.
- No olvide indicar a su médico si el niño es alérgico o reacciona a algún medicamento, conservante de alimentos o colorantes. No olvide informarle de su alergia y la forma en que la misma ha afectado al niño. Entre otras, algunas afecciones que debe mencionar son: sarpullido; urticaria; comezón; falta de aire; silbido en el pecho; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma que haya ocurrido.

### ¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija toma este medicamento?

- Si el niño tiene enfermedad renal, consulte al médico.
- Infórmele al médico acerca de todos los medicamentos que el niño esté tomando. Es posible que este medicamento no vaya bien con algunos otros medicamentos.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos que el niño toma (recetados, productos naturales, vitaminas, medicamentos que obtuvo sin receta). Entregue esta lista al médico del niño.

### ¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?

- Si cualquier parte de esta información le preocupa, si aparece alguno de los efectos secundarios indeseados o si el niño no se mejora después de tomar este medicamento.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.
- Si el niño presenta signos de una muy mala reacción, llame al doctor o a Urgencias de inmediato. Entre otros: silbido; tensión en el pecho; fiebre, comezón; tos fuerte; piel de color azulado; ataques; inflamación de la cara, los labios, la lengua, o la garganta; o si el niño presenta algún otro comportamiento fuera de lo común.
- Si el niño presenta signos serios de mareo o se desmaya.
- Si el niño tiene náuseas o vómitos severos.
- Si el niño tiene heces muy blandas (diarrea).
- Si el niño tiene moretones o hemorragia fuera de lo común.
- Si aparece un sarpullido en el niño.

- Si el problema de salud de su hijo no mejora o si usted cree que empeora.

### **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

- Náusea o vómito. Hacer comidas pequeñas y frecuentes y enjuagarle la boca con frecuencia pueden ayudar. Los niños mayores pueden chupar dulces duros sin azúcar.
- Heces blandas (diarrea). El yogurt o los probióticos pueden servirle de ayuda. Estos productos se pueden conseguir en tiendas de comida naturista o en algunas farmacias.

### **¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?**

*Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea y siga al pie de la letra la dosificación que se indica en la etiqueta.*

- Este medicamento se administra en forma de inyección intramuscular.

### **Afirmaciones generales**

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos de su hijo (recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas). Entregue esta lista al médico del niño.
- Hable con el médico de su hijo antes de administrarle cualquier medicamento nuevo, ya sea uno recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento consulte al médico de su hijo, el farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

### **Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor**

*No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.*

### **Copyright**

*Registrados todos los derechos © 2014 Clinical Drug Information, LLC y Lexi-Comp, Inc.*

Si tiene preguntas o inquietudes, consulte a su médico, enfermero/a u otro integrante de su equipo de atención médica. Puede encontrarlos de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 en el \_\_\_\_\_ . Después de las 17:00, los fines de semana y días festivos, llame al \_\_\_\_\_ . Si no figura ningún número, o si no está seguro, llame al (212) 639-2000.

---

Penicillin G Benzathine and Penicillin G Procaine  
Printed on January 26, 2015, 3:44 pm [P-6744-es]