Memorial Sloan Kettering Cancer Center

PATIENT & CAREGIVER EDUCATION

Primidone

Marcas estadounidenses

Mysoline

Marcas canadienses

Apo-Primidone®

Advertencia

- A veces los medicamentos no son seguros si el niño los toma junto con otros medicamentos. El tomarlos juntos puede producir efectos secundarios graves. Este es uno de esos medicamentos. Asegúrese de consultar al médico acerca de todos los otros medicamentos que el niño esté tomando.
- Este medicamento viene con una hoja de información adicional para el paciente llamada Guía de medicación. Leer con cuidado. Léalo de nuevo cada vez que tenga que resurtirlo.

¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para ayudar a controlar ciertos tipos de convulsiones.

¿Puede mi niño tomar este medicamento sin riesgo?

- No si el niño es alérgico a la primidona, el fenobarbital o a algún otro componente de este medicamento.
- No olvide indicar a su médico si el niño es alérgico o reacciona a algún medicamento, conservante de alimentos o colorantes. No olvide informarle de su alergia y la forma en que la misma ha afectado al niño. Entre otras, algunas afecciones que debe mencionar son: sarpullido; urticaria; comezón; falta de aire; silbido en el pecho; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma que haya ocurrido.
- No si el niño tiene porfiria.

¿Hay algo que deba saber o hacer mientras mi hijo/hija toma este medicamento?

- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos que el niño toma (recetados, productos naturales, vitaminas, medicamentos que obtuvo sin receta). Entregue esta lista al médico del niño.
- No deje que se le acabe este medicamento.
- Este medicamento puede producir dependencia con el uso prolongado.
- Que el niño lleve identificación de alerta médica indicando la enfermedad.
- Si el niño ha estado tomando este medicamento durante varias semanas, consulte al médico antes de suspenderlo. Es posible que deba suspenderlo en forma gradual.

- Evite darle al niño otros medicamentos y productos naturales que retarden sus reacciones.
- Si el niño tiene enfermedad renal, consulte al médico.
- Si el niño tiene enfermedad hepática, consulte al médico.
- Si el niño tiene enfermedad pulmonar, consulte al médico. Es posible que sea más sensible a este medicamento.
- Si el niño tiene una enfermedad mental, hable con un proveedor de salud médica.
- Pida que le hagan análisis de sangre de control con frecuencia al niño. Hable con el médico del niño.
- Infórmele al médico acerca de todos los medicamentos que el niño esté tomando. Es posible que este medicamento no vaya bien bien con algunos otros medicamentos.
- El niño debe evitar las tareas o las acciones que requieren un estado de alerta hasta que usted observe cómo este medicamento afecta a su hijo. Estas son actividades como andar en bicicleta, practicar deportes o usar elementos como tijeras, podadoras de césped, motocicletas eléctricas, automóviles de juguete o vehículos motorizados.

¿Cuáles son los efectos secundarios por los que debo llamar al médico de mi hijo/hija de inmediato?

- Si cualquier parte de esta información le preocupa, si aparece alguno de los efectos secundarios indeseados o si niño no se mejora después de tomar este medicamento.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.
- Si el niño presenta signos de una muy mala reacción, llame al doctor o a Urgencias de inmediato. Entre otros: silbido; tensión en el pecho; fiebre, comezón; tos fuerte; piel de color azulado; ataques; inflamación de la cara, los labios, la lengua, o la garganta; o si el niño presenta algún otro comportamiento fuera de lo común.
- Si el niño presenta signos o síntomas de depresión, ideas de suicidio, nervios, irregularidades emocionales, pensamiento anormal, ansiedad, falta de interés en la vida.
- Si el niño tiene dificultad para respirar.
- Si el niño presenta signos serios de mareo o se desmaya.
- Si el niño demuestra un cambio significativo en la capacidad de pensar clara y lógicamente.
- Si el niño demuestra un cambio significativo en el equilibrio.
- Si las convulsiones del niño empeoran o son diferentes luego de comenzar a usar este medicamento.
- Si el niño se siente extremadamente cansado o adormecido.
- Si el niño se siente muy nervioso o excitable.
- Si el niño tiene moretones o hemorragia fuera de lo común.
- Si aparece un sarpullido en el niño.
- Si el problema de salud de su hijo no mejora o si usted cree que empeora.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

- Mareos, adormecimiento, visión borrosa o incapacidad para pensar claramente. El niño debe evitar

las tareas o actividades que requieran un buen estado de vigilancia o una visión clara hasta que vea como lo afecta este medicamento.

- Para reducir la probabilidad de sentirse mareado o perder la conciencia, procure que su hijo se levante lentamente después de unos pocos minutos cuando se siente o se recueste. Los niños deben tener mayor cuidado al subir las escaleras.
- Náusea o vómito. Hacer comidas pequeñas y frecuentes y enjuagarle la boca con frecuencia pueden ayudar. Los niños mayores pueden chupar dulces duros sin azúcar.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?

Administre este medicamento según las instrucciones del médico de su hijo. Lea y siga al pie de la letra la dosificación que se indica en la etiqueta.

- Adminístrelo según las indicaciones de la receta, aun cuando su hijo se sienta bien.
- Administre este medicamento con o sin alimentos. Se debe administrar con alimentos si produce malestar estomacal.
- El niño debe seguir el plan de alimentación y el programa de ejercicio según las recomendaciones de su médico.

¿Qué hago si mi hijo/hija olvida tomar una dosis?

- Administre la dosis que olvidó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sáltese la dosis faltante y continúe con el horario habitual del niño.
- No le de doble dosis ni dosis adicionales.
- No modifique la dosis ni suspenda el medicamento del niño. Consulte al médico

¿Cómo debo guardar y/o desechar este medicamento?

- Conserve a temperatura ambiente.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.

Afirmaciones generales

- Si los síntomas o trastornos de su hijo no mejoran o si empeoran, llame al médico de su hijo.
- No comparta el medicamento del niño con otras personas ni le de al niño el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos de su hijo (recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas). Entregue esta lista al médico del niño.
- Hable con el médico de su hijo antes de administrarle cualquier medicamento nuevo, ya sea uno recetado o de venta libre, productos naturales o vitaminas.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento consulte al médico de su hijo, el farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riegos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright

Registrados todos los derechos © 2014 Clinical Drug Information, LLC y Lexi-Comp, Inc.

Si tiene preguntas o inquietudes, consulte a su médico, enfermero/a u otro integrante de su equipo de atención médica. Puede encontrarlos de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 en el _____. Después de las 17:00, los fines de semana y días festivos, llame al _____. Si no figura ningún número, o si no está seguro, llame al (212) 639-2000.

Primidone
Printed on December 21, 2014, 5:38 pm [P-6838-es]