



## PATIENT & CAREGIVER EDUCATION

# Toremifene

### Marcas estadounidenses

Fareston

### Marcas canadienses

Fareston®

#### Advertencia

- Este medicamento puede ocasionar una frecuencia cardíaca anormal que, en ocasiones, puede ser mortal. Esto puede provocar desmayos y convulsiones. No tome este medicamento si tiene niveles de potasio o magnesio bajos, o un QT largo en el ECG. Se controlará su frecuencia cardíaca a menudo por medio de un ECG. Hable con su médico.
- No tome este medicamento si está tomando medicamentos que pueden elevar las probabilidades de que la frecuencia cardíaca sea anormal. Hay muchos medicamentos que pueden hacer esto. Pregunte al médico o farmacéutico si no está seguro.

#### ¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para tratar el cáncer de mama en mujeres que se encuentran en la postmenopausia.
- Este medicamento se le puede administrar por otras razones. Comuníquese con el proveedor de salud médica.

#### ¿Qué debo informar al médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico al toremifeno o cualquier otro componente de este medicamento.
- Si es alérgico a algún medicamento como este, a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado, tales como, sarpullido; urticaria; comezón; falta de aire; sibilancia; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.

*Este medicamento puede interactuar con otros medicamentos o trastornos.*

*Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.*

#### ¿Qué debo tener en cuenta al usar este medicamento?

- Informe al dentista, cirujano u otro personal médico que usa este medicamento.

- Pida que le hagan análisis de sangre con frecuencia. Hable con su médico.
- Los exámenes periódicos de las mamas (auto examen mensual) y los exámenes ginecológicos anuales son muy importantes.
- Evite la toronja (pomelo) y el jugo de toronja.
- Este medicamento no está aprobado para utilizarse en niños. Hable con el médico.
- Este medicamento puede dañar al feto si se toma durante el embarazo.
- Utilice un método anticonceptivo que no tenga hormonas en su composición, como los condones. Haga esto durante todo el tratamiento con este medicamento.
- Informe a su médico si está embarazada o tiene intención de embarazarse. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios de utilizar este medicamento mientras esté embarazada.
- Informe a su médico si está amamantando a su bebé. Tendrá que hablar acerca de si hay riesgos para el bebé.

### **Razones por las que debe llamar a su médico de inmediato.**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** *A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:*

- Síntomas de una reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; comezón; piel inflamada, con ampollas o descamada con o sin fiebre; silbido en el pecho; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Elevado nivel de calcio. Entre otros algunos de los síntomas son: debilidad, confusión, cansancio, dolor de cabeza, náusea y vómito, estreñimiento o dolor de huesos.
- Dolor o presión en el pecho.
- Latido cardíaco acelerado.
- Pulso que no se siente normal.
- Mareos severos o desmayos.
- Inflamación, calor, entumecimiento, cambio de color o dolor en una pierna o un brazo.
- Toser sangre.
- Las náuseas y los vómitos severos.
- Cambio en la fuerza (más fuerza en un lado y menos en el otro), dificultad para pensar o hablar, modificaciones en el equilibrio, visión borrosa.
- Cambio en la vista.
- Modificación del equilibrio.
- Depresión.
- Fiebre o escalofríos.
- Dolor de garganta.

- Alucinaciones.
- Dolor muscular.
- Convulsiones.
- Falta de aire.
- Temblor.
- Contusión o hemorragia fuera de lo común.
- Hemorragia vaginal que no es normal.

### **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

*Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:*

- Mareos.
- Sofocos o bochornos.
- No tiene apetito.
- Náusea o vómito.
- Sudoración excesiva.
- Flujo vaginal.

*Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.*

*Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.*

### **¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?**

*Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea y siga al pie de la letra la dosificación que se indica en la etiqueta.*

- Tome este medicamento con o sin comida.

### **¿Qué hago si se me olvida tomar una dosis?**

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si ya casi es hora de la dosis siguiente, sátese la dosis faltante y continúe con el horario habitual.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

### **¿Cómo debo conservar este medicamento?**

- Conserve a temperatura ambiente.
- Proteja de la luz.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Pregunte al farmacéutico cómo se deben desechar los medicamentos no utilizados.

## Afirmaciones generales

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos que toma (recetados, productos naturales, suplementos, vitaminas, medicamentos que obtuvo sin receta). Entregue esta lista al médico.
- Hable con su médico antes de comenzar a tomar cualquier medicamento, ya sea uno recetado o sin receta, productos naturales o vitaminas.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor

*No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.*

## Copyright

*Registrados todos los derechos © 2014 Clinical Drug Information, LLC y Lexi-Comp, Inc.*

Si tiene preguntas o inquietudes, consulte a su médico, enfermero/a u otro integrante de su equipo de atención médica. Puede encontrarlos de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 en el \_\_\_\_\_ . Después de las 17:00, los fines de semana y días festivos, llame al \_\_\_\_\_ . Si no figura ningún número, o si no está seguro, llame al (212) 639-2000.

Toremifene

Printed on February 1, 2015, 8:35 pm [L-7076-es]