



PATIENT & CAREGIVER EDUCATION

Ulipristal

Marcas estadounidenses

Ella

Marcas canadienses

Fibrystal

Advertencia

Ella:

- Este medicamento no detiene la propagación de enfermedades como el VIH o la hepatitis que se contagian a través de la sangre o las relaciones sexuales. No tenga relaciones sexuales de ningún tipo sin usar un condón de látex o poliuretano. No comparta agujas u otros objetos como cepillos de dientes o afeitadoras. Consulte al médico.

¿Para qué se usa este medicamento?

- Este medicamento se utiliza para evitar un embarazo.
- Este medicamento se utiliza para tratar fibrosis del útero.

¿Qué debo informar al médico ANTES de tomar este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Si es alérgico al ulipristal o a cualquier otro componente de este medicamento.
- Si es alérgico a algún medicamento como este, a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado, tales como, sarpullido; urticaria; comezón; falta de aire; sibilancia; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.
- Si está o podría estar embarazada. No tome este medicamento si está embarazada.

Ella:

- Si ha tomado la dosis de este medicamento dentro del mismo período (menstrual).
- Si toma medicamentos que hagan que este no surta tan buen efecto. Estos incluyen, bosentan, carbamazepina, felbamato, griseofulvina, oxcarbazepina, fenobarbital, fenitoína, rifampina, hierba de San Juan y topiramato. Existen muchos medicamentos que pueden hacer esto. Pregúntele al médico o al farmacéutico si no está seguro.
- Si está amamantando. No tome este medicamento si está amamantando.

Fibrystal:

- Si tiene alguno de los trastornos siguientes: Cáncer de mama, cáncer de cuello de útero, cáncer de ovario, cáncer de útero, o sangrado vaginal sin causa.
- Si está amamantando. No amamante mientras toma este medicamento.
- Si toma cualquier medicamento (ya sea uno recetado o sin receta, productos naturales o vitaminas) que no debe tomarse junto con este medicamento, como ciertos medicamentos que se utilizan para tratar el VIH, las infecciones o las convulsiones. Hay muchos medicamentos que no deben tomarse con este medicamento.
- No tome hierba de San Juan con este medicamento. Puede disminuir la eficacia de este medicamento.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo tener en cuenta al usar este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Informe al dentista, cirujano u otro personal médico que usa este medicamento.
- Utilice un método anticonceptivo que considere confiable para evitar un embarazo.
- Las pastillas anticonceptivas y otros métodos anticonceptivos a base de hormonas pueden dejar de prevenir el embarazo. Utilice también otro método anticonceptivo, como un condón, mientras toma este medicamento.

Ella:

- Este medicamento no terminará un embarazo.
- Este medicamento no debe usarse de manera regular para evitar un embarazo.
- Si su período se atrasa por más de 7 días, hable con su médico.

Fibrystal:

- No tome este medicamento durante más tiempo del que le indicó su médico.
- La mayoría de la veces, este medicamento causará menos sangrado durante los períodos mensuales o sin período dentro de los 10 días de haber comenzado su uso. El revestimiento del útero también se puede espesar o alterar mientras se está tomando el medicamento. La mayoría de las veces, estos cambios se revierten y vuelven a la normalidad cuando se suspende el uso del medicamento. Hable con su médico.
- No administre este medicamento a un niño menor de 18 años de edad.
- Antes de comenzar el tratamiento con este medicamento se realizará una prueba de embarazo para demostrar que NO está embarazada. Si queda embarazada mientras toma este medicamento, llame al

médico de inmediato.

Razones por las que debe llamar a su médico de inmediato.

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: *A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:*

Todas las presentaciones:

- Síntomas de una reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; comezón; piel inflamada, con ampollas o descamada con o sin fiebre; silbido en el pecho; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

Ella:

- Dolor severo de panza.

Fibrystal:

- Hemorragia vaginal que no es normal.
- Dolor o inflamación pélvica o en la ingle:

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

Todas las presentaciones:

- Dolor de cabeza.

Ella:

- Mareos.
- Náuseas.
- Dolor abdominal.
- Se siente cansado o débil.
- Dolores menstruales.
- Cambios menstruales. Entre otros: la sangramiento excesivo, sangramiento ligero o goteo, o el sangramiento entre ciclos.

Fibrystal:

- Sofocos o bochornos.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea y siga al pie de la letra la dosificación que se indica en la etiqueta.

Todas las presentaciones:

- Tome este medicamento con o sin comida.

Ella:

- Este medicamento debe tomarse dentro de un período de 5 días después de haber tenido relaciones sexuales sin protección.
- Si vomita durante las 3 horas después de haber tomado este medicamento, comuníquese con el proveedor de salud médica.

Fibrystal:

- Tome este medicamento con un vaso de agua.
- Comience a tomar el medicamento durante los primeros 7 días de su período (menstrual) ciclo.

¿Qué hago si se me olvida tomar una dosis?

Ella:

- Solamente se necesita 1 dosis de este medicamento. Si omite una dosis, tómela tan pronto como lo recuerde.

Fibrystal:

- Tome la dosis que se saltó lo antes posible.
- Si ya casi es la hora de la próxima dosis, salte la dosis que perdió y vuelva a retomar el horario habitual

Todas las presentaciones:

- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.

¿Cómo debo conservar este medicamento?

- Conserve a temperatura ambiente.
- Proteja de la luz.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Pregunte al farmacéutico cómo se deben desechar los medicamentos no utilizados.

Afirmaciones generales

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.

- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos que toma (recetados, productos naturales, suplementos, vitaminas, medicamentos que obtuvo sin receta). Entregue esta lista al médico.
- Hable con su médico antes de comenzar a tomar cualquier medicamento, ya sea uno recetado o sin receta, productos naturales o vitaminas.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright

Registrados todos los derechos © 2014 Clinical Drug Information, LLC y Lexi-Comp, Inc.

Si tiene preguntas o inquietudes, consulte a su médico, enfermero/a u otro integrante de su equipo de atención médica. Puede encontrarlos de lunes a viernes de 9:00 a 17:00 en el _____ . Después de las 17:00, los fines de semana y días festivos, llame al _____ . Si no figura ningún número, o si no está seguro, llame al (212) 639-2000.

Ulipristal

Printed on January 28, 2015, 4:26 am [L-427390-es]