Прием спиртных напитков и хирургическая операция

Количество принимаемого вами спиртного может оказать на вас влияние во время операции и после нее. Важно, чтобы вы поговорили с обслуживающим вас медицинским персоналом об употреблении вами спиртного, чтобы мы могли запланировать уход за вами.

- Внезапное прекращение употребления спиртного может привести к судорогам, расстройству сознания и смерти. Если нам известно, что вы подвергаетесь риску возникновения этих осложнений, мы можем прописать вам лекарства, которые помогут их предотвратить.
- Если вы регулярно употребляете спиртное, у вас может быть риск возникновения других осложнений во время и после хирургической операции. К ним относятся:
  – Кровотечение
  – Инфекции
  – Проблемы с сердцем
  – Повышенная зависимость от сестринского ухода
  – Более длительное пребывание в госпитале

Что сделаем мы:

Мы говорим со всеми пациентами о их употреблении спиртного. Обслуживающие вас медицинские работники спросят у вас о том, какое количество спиртного вы принимаете в день. Сюда относится также пиво и вино. Вас также попросят ответить на указанные ниже вопросы, которые представляют собой анкету CAGE.

За последний год:

- ☐ Возникало ли у вас когда-либо ощущение того, что вам следует сократить употребление спиртных напитков?
- ☐ Возникало ли у вас чувство раздражения, если кто-либо из окружающих критиковал вас в отношении вашего употребления спиртных напитков?
- ☐ Испытывали ли вы когда-либо чувство вины, связанное с употреблением спиртных напитков?
- ☐ Выпивали ли вы когда-либо спиртное, как только просыпались утром, с целью успокоить нервы или опохмелиться (глоток спиртного с утра)?

Что можете сделать вы:

- Честно сообщите обслуживающему вас медицинскому работнику о том, в каком количестве вы употребляете спиртное.
- Постарайтесь прекратить употребление спиртного, как только вам будет назначена хирургическая операция. Если после того, как вы прекратите пить, у вас возникнет головная боль, тошнота, повышенная тревожность или вы не сможете спать, сразу же сообщите об этом вашему врачу. Это ранние признаки алкогольной абстиненции, и это состояние поддается лечению.
- Если не сможете прекратить употребление спиртного, сообщите об этом обслуживающему вас медицинскому работнику.
- Обращайтесь к нам со всеми возникающими у вас вопросами по поводу употребления спиртного и хирургических операций. Как и во всех случаях, вся информация о вашем лечении будет оставаться конфиденциальной.

Memorial Sloan-Kettering Cancer Center

©2012 Мемориальный онкологический центр Слоан-Кеттеринг
1275 York Avenue, New York, New York 10065
C-703