



كيف تعطي نفسك حقنة تحت الجلد باستخدام محقن مُعبأ مسبقاً

تساعدك هذه المعلومات في تعلم كيفية إعطاء نفسك حقنة تحت الجلد باستخدام محقن مُعبأ مسبقاً. تُعطى هذه الحقنة تحت الجلد. المحقن المُعبأ مسبقاً هو عبارة عن محقن يحتوي بداخله على الدواء.

سيوضح لك مقدم الرعاية الصحية كيفية إعطاء نفسك حقنة تحت الجلد. يمكنك استخدام المعلومات الواردة في هذا المصدر لتتذكر طريقة تلقي الحقنة أثناء تواجدك في المنزل.

معلومات عن دوائك

- اسم الدواء: _____
- مواعيد الدواء: _____
- الجرعة: _____

كيفية تخزين المحقن المُعبأ مسبقاً

تعتمد كيفية تخزين المحقن المُعبأ مسبقاً على الأدوية التي تحتوي عليها. يتم تخزين أغلب الأدوية في درجة حرارة الغرفة، ولكن قد يتعين الاحتفاظ ببعض الأدوية في الثلاجة. سيخبرك مقدم الرعاية الصحية بكيفية تخزين المحقن. تجنب تخزين المحقن المُعبأ مسبقاً في المُجمد أو تركه تحت أشعة الشمس المباشرة.

ضع علامة على أحد المربعات التالية لمساعدتك على تذكر كيفية تخزين المحقن الخاصة بك.

تخزين المحقن المُعبأ مسبقاً في درجة حرارة الغرفة.

تخزين المحقن المُعبأ مسبقاً في الثلاجة.

إذا كانت لديك أسئلة بشأن كيفية تخزين أو حمل المحقن المُعبأ مسبقاً أثناء السفر، فاستشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

ما الذي يجب فعله إذا تجمّد الدواء

إذا تجمد الدواء بداخل المحقن، فضع المحقن بالقرب من الجزء الأمامي داخل الثلاجة أو على أحد أرفف باب الثلاجة حتى يذوب. إذا تجمد الدواء أكثر من مرة، فلا تستخدمه. اتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك للحصول على المزيد من التعليمات.

كيف تعطي نفسك حقنة تحت الجلد

اجمع المستلزمات

ضع مستلزماتك على سطح نظيف ومستوى (مثل طاولة أو منضدة). ستحتاج إلى:

- مسحة كحولية واحدة
- ضمادة شاش أو كرة قطنية واحدة، إلا إذا كنت ستحقن نفسك بعقار إينوكسابارين (Lovenox®) أو هيبارين
- ضمادة واحدة (مثل Band-Aid®)

- > وية صلبة للتخلص من المحقن والإبرة (مثل زجاجة مُنظف الغسيل ذات الغطاء المصنوعة من البلاستيك الثقيل)
- اقرأ www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-store-and-dispose-your-home-medical-sharps (How To Store and Get Rid of Your Home Medical Sharps) للاطلاع على التعليمات الخاصة باختيار > وية الأدوات الحادة.
- مقحن مُعبأ مسبقًا واحد مع غطاء إبرة
- إذا قمت بتخزين المحقن المُعبأ مسبقًا في الثلاجة، فأخرج واحدًا قبل 30 دقيقة من تلقي الحقنة. يجب أن يكون الدواء بنفس درجة حرارة الغرفة عند حقنه.
- تجنب رج المحقن. فقد يؤدي ذلك إلى تلف الدواء الموجود بداخله.

افحص المحقن المُعبأ مسبقًا

افحص الدواء:


- الاسم. تأكد أنه مطابق للدواء الذي وصفه لك مقدم الرعاية الصحية.
 - الجرعة. تأكد أنه مطابق للدواء الذي وصفه لك مقدم الرعاية الصحية.
 - تاريخ انتهاء الصلاحية. تأكد أن تاريخ انتهاء الصلاحية لم يمر بعد.
 - اللون. تأكد أن الدواء في المحقن شفاف وعديم اللون. ولا تستخدمه إن كان يبدو رغويًا أو > ثل اللون أو غائمًا أو به بلورات.
- إذا كان اسم الدواء أو جرعته غير مطابقة لم وصفه مقدم الرعاية الصحية، أو كان منتهي الصلاحية، أو كان رغويًا أو > ثل اللون أو غائمًا أو به بلورات، فلا تستخدم المحقن. واستخدم محقن آخر بدلاً منه إذا كان متوفرًا لديك. ثم اتصل بمقدم الرعاية الصحية أو الصيدلي لإخباره بذلك. قد يتسنى لك إحضار المحقن الكامل إلى الصيدلية حتى يمكنهم استبداله.

قم بإعداد موضع الحقن.

اختر موضع الحقن الذي يتيح لك ضم بوصة إلى بوصتين (2.5 إلى 5 سنتيمترات) من الجلد لطيه. يُفضل استخدام أحد المواضع التالية (انظر الشكل 1):

- بطنك، باستثناء الجزء المحيط بالسرة على بُعد بوصتين (5 سنتيمترات)
- الجزء الأمامي الأوسط أو خارجي الأوسط للخصدين
- الجزء العلوي من المؤخرة (المقعدة)
- الجزء الخلفي من أعلى الذراعين، إذا كان شخص آخر سيعطيك الحقنة

إذا طلب منك مقدم الرعاية الصحية استخدام موضع آخر للحقن، فاتبع تعليماته. يكون تأثير بعض الأدوية أفضل إذا تم حقنها في مواضع معينة. تجنب الحقن في موضع مؤلم أو أحمر اللون أو به كدمة أو صلبًا أو به ندبات أو علامات تمدد.



الشكل 1. مواضع الحقن

احقن الدواء في موضع مختلف كل مرة. من المفيد استخدام دفتر ملاحظات أو تقويم لتتبع المواضع. حيث يؤدي الحقن في نفس الموضع كل مرة لتكوّن تندب في الأنسجة. وقد يعوق ذلك فاعلية الدواء وعمله على النحو المرجو. كما سيجعل من الصعب إدخال الإبرة في الجلد.


بمجرد اختيار موضع الحقن، اتبع التعليمات التالية.

1. اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون أو استخدم معقم يدين كحوليًا.
 - إذا كنت ستغسل يديك بالماء والصابون، فبلل يديك، ثم ضع الصابون، وافركهما معًا لمدة جيدًا 20 ثانية على الأقل، ثم اشطفهما.
 - جفف يديك بمنشفة واستخدم نفس المنشفة لإغلاق الصنبور.
 - إذا كنت تستخدم معقمًا كحوليًا لليدين، فاحرص على تغطية يديك بالكامل به، وافركهما معًا حتى يجفان.
2. قم بطي أي ملابس تغطي موضع الحقن.
3. افتح المسحة الكحولية. قم بتنظيف الجلد في موضع الحقن بالضغط عليه برفق. ابدأ من منتصف الموضع وتحرك للخارج في حركة دائرية.
4. دع بشرتك تجف بالهواء. وتجنب تهويتها أو نفخها.

إعطاء نفسك الحقنة


1. أخرج المحقن من عبوته.

- إذا كنت تحقن عقار Lovenox، فتتحقق من وجود فقاعة هوائية في المحقن. وإن لم تظهر لك واحدة، فضع المحقن جانبًا واستخدام محقنًا آخر مختلفًا. اتصل بمقدم الرعاية الصحية أو الصيدلي بعد إعطاء نفسك الحقنة لإخباره بذلك. قد يتسنى لك إحضار المحقن الكامل إلى الصيدلية حتى يمكنهم استبداله.
- 2. استخدم يدك المهيمنة (التي تكتب بها) واحمل المحقن من الجزء الأوسط، مثل القلم أو السهم.
- 3. اسحب غطاء الإبرة برفق بشكل مستقيم (انظر الشكل 2). بمجرد رفع غطاء الإبرة، لا توجه المحقن للأسفل. لا تسمح لأي شيء، بما في ذلك أصابعك، بلمس الإبرة. وإذا لمس أي شيء الإبرة، فضع المحقن في حاوية الأدوات الحادة. وابدأ استخدام آخر جديد. اتصل بمقدم الرعاية الصحية بعد إعطاء نفسك الحقنة لإخباره بذلك.




الشكل 2. انزع غطاء الإبرة

4. إذا كنت تعطي نفسك حقنة لأي دواء آخر إلى جانب Lovenox، فافحص المحقن للكشف عن الفقاعات الهوائية. وإذا كانت هناك فقاعة هوائية، فأحمل المحقن بحيث يتم توجيه الإبرة للأعلى. اطرق برفق على المحقن بأصبعك حتى ترتفع الفقاعات الهوائية إلى الأعلى بالقرب من الإبرة. اضغط على المكبس ببطء للأعلى لدفع الفقاعات الهوائية للخارج. لا تفعل ذلك إذا كنت تحقن عقار Lovenox.
5. تأكد أنك لا تزال تحمل المحقن من الجزء الأوسط، مثل القلم أو السهم. استخدم يدك الحرة لضم طية من الجلد في موضع الحقن.
6. ادفع الإبرة بأكملها للأسفل في اتجاه مستقيم في الجلد بحركة واحدة سريعة وخفيفة (انظر الشكل 3). لا تضع الإبهام على المكبس في هذا الوقت.



الشكل 3. أدخل الإبرة في الجلد

7. توقف عن ضم الجلد بأصبعك. استخدم إبهامك لدفع المكبس ببطء للأسفل حتى آخر المسافة حتى يتم حقن كمية الدواء بالكامل (انظر الشكل 4). يمكنك استخدام إصبع الإبهام في أية من اليدين بما يحقق لك الراحة.



الشكل 4. اضغط على المكبس للأسفل حتى آخر المسافة


8.

عندما يفرغ المحقن، أخرجه من الجلد بشكل مستقيم.

- إذا أعطيت نفسك حقنة لعقار Lovenox أو هيبارين، فلا تضغط على موضع الحقن. ضع ضمادة فوق موضع الحقن عند اللزوم.
 - إذا أعطيت نفسك حقنة لأي دواء إلى جانب Lovenox أو هيبارين، فضع كرة قطنية أو ضمادة شاش على موضع الحقن واضغط للأسفل لبضع ثوانٍ. ضع ضمادة فوق موضع الحقن عند اللزوم.
- لا تضع غطاء الإبرة مجددًا على المحقن. احرص على عدم وخز نفسك بالإبرة.

9. قم بتغطية الإبرة باستخدام واقي الإبرة.

- إذا أعطيت نفسك حقنة لعقار Lovenox، فاضغط على المكبس للأسفل بقوة. يجب أن يتحرك واقي الإبرة إلى مكانه من تلقاء نفسه.
- إذا أعطيت نفسك حقنة لأي دواء إلى جانب Lovenox، فأمسك موضع قبضات الأصابع البلاستيكية الشفافة على جانبي المحقن بإحدى يديك. احمل واقي الإبرة بيدك الأخرى (انظر الشكل 5). حرّك واقي الإبرة فوق الإبرة حتى تتم تغطية الإبرة بالكامل (انظر الشكل 6). ستسمع صوت استقرار واقي الإبرة في مكانه.



الشكل 5. أمسك واقي الإبرة



الشكل 6. حرك واقي الإبرة

10. ضع المحقن في >وية الأدوات الحادة. لا تستخدم المحقن المُعبأ مسبقاً أكثر من مرة واحدة.

اقرأ المورد www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-store-and-dispose-your-home-medical-sharps (How To Store and Get Rid of Your Home Medical Sharps) للاطلاع على معلومات حول اختيار >وية الأدوات الحادة والتخلص من المحقن المستعملة والأدوات الحادة الطبية المنزلية الأخرى.

متى يجب الاتصال بمقدم الرعاية الصحية

اتصل بمقدم الرعاية الصحية في الحالات التالية:

- إذا لم يتوقف النزيف في موضع الحقن.
- إذا شعرت بألم >د.
- إذا حقنت الدواء في موضع غير صحيح.
- إذا أُصبت بحمى وارتفعت درجة حرارتك إلى 100.4 فهرنهايت (38 مئوية) أو أعلى
- إذا ظهرت عليك علامات على تفاعل الحساسية، مثل التورم أو الاحمرار أو الحكّة أو الطفح الجلدي.
- إذا لم يكن بوسعك استخدام المحقن لأن الدواء منتهي الصلاحية أو رغووي أو >ائل اللون أو غائم أو به بلورات.
- إذا لم يكن بوسعك استخدام المحقن بسبب لمس الإبرة قبل الحقن.
- إذا لم يكن بوسعك استخدام محقن مُعبأ مسبقاً بعقار Lovenox لأنه لا يحتوي على فقاعة هوائية.
- إذا وجدت صعوبة في تلقي الحقنة.

إذا كانت لديك أسئلة أو شواغل، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك. سيرد عليك أحد أعضاء فريق الرعاية الصحية الخاص بك أيام الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 صباحًا حتى الساعة 5 مساءً وبخلاف هذه الأوقات، يمكنك ترك رسالة أو التحدث مع أحد مقدمي الرعاية الآخرين في مركز MSK. يتواجد دومًا طبيب مُناوب أو ممرضة مُناوبة. إذا لم تكن متأكدًا بشأن كيفية الوصول إلى مقدم الرعاية الصحية الخاص بك، فاتصل بهاتف رقم 212-639-2000.

لمزيد من الموارد، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mskcc.org/pe للبحث في مكتبتنا الإلكترونية.

How to Give Yourself a Subcutaneous Injection Using a Prefilled Syringe - Last updated on December 7, 2023

جميع الحقوق مملوكة ومحفوظة لمركز Memorial Sloan Kettering لعلاج السرطان

آخر تحديث

ديسمبر 7, 2023

.Learn about our [Health Information Policy](#)

أخبرنا بآرائك

أخبرنا بآرائك

تساعدنا ملاحظاتك وآراؤك على تحسين المعلومات التثقيفية التي نقدمها. لن يتمكن فريق الرعاية الخاص بك من مشاهدة أي شيء تكتبه في نموذج الملاحظات والآراء هذا. يُرجى عدم استخدامه لتوجيه أية أسئلة بخصوص الرعاية الصحية التي تتلقاها. إذا كانت لديك أسئلة بشأن الرعاية، فاتصل بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك.

على الرغم من قراءتنا لجميع الملاحظات والآراء، فإننا لا نستطيع الإجابة على أي أسئلة. يُرجى عدم كتابة اسمك أو معلوماتك الشخصية على نموذج الملاحظات والآراء.

هل كان من السهل عليك فهم هذه المعلومات؟

نعم

لا

إلى حدٍ ما

لا

لا

ما الذي كان يمكننا توضيحه بشكل أفضل؟

يُرجى عدم كتابة اسمك أو أي معلومات شخصية أخرى.

إرسال