

كيفية تفرغ الأمعاء قبل الجراحة في مركز ميموريال سلون كيترينج (MSK) للأطفال

توضح هذه المعلومات كيفية تفرغ الأمعاء قبل الجراحة في مركز ميموريال سلون كيترينج (MSK) للأطفال. يساعد تفرغ الأمعاء على إخراج البراز من الجسم.

مفردات المخاطب وضمائر المخاطب في هذا المستند تعني أنتم وأطفالكم.

مستلزمات تفرغ الأمعاء

ويمكنك شرائها من الصيدلية المحلية دون الحاجة إلى وصفة طبية.

- مسحوق بولي إيثيلين غليكول (MiraLAX®).
- السوائل الصافية غير الحمراء أو البرتقالية أو القرمزية

اقرأ القسم "تحضير خليط MiraLAX" لمعرفة الكمية التي ستحتاجها. احرص على تناول القدر الكافي من السوائل الصافية أثناء اتباع نظام غذائي بالسوائل الصافية.

سيعطيك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك أيضًا وصفة للأدوية التالية. تأكد من الحصول عليها قبل بدء تفرغ الأمعاء.

- ميترونيدازول
- نيوميسين

تعليمات تفرغ الأمعاء

ابدأ تفرغ أمعائك في اليوم السابق للجراحة.

تحضير خليط MiraLAX

اخلط ___ جرام من مسحوق MiraLAX مع ___ أونصات من السائل الصافي صباح اليوم التالي للجراحة. قلب الخليط حتى يذوب مسحوق MiraLAX. وبمجرد ذوبان المسحوق، يمكنك وضع الخليط في الثلجة.

ابدأ اتباع نظام غذائي بالسوائل الصافية في وقت الظهيرة (الساعة 12 ظهرًا)

ابدأ اتباع نظام غذائي بالسوائل الصافية في وقت الظهيرة (الساعة 12 ظهرًا) في اليوم السابق للجراحة.

يشمل النظام الغذائي بالسوائل الصافية السوائل الشفافة فقط. يمكنك العثور على أمثلة في جدول "النظام الغذائي بالسوائل الصافية". تجنب السوائل الصافية الحمراء أو البرتقالية أو القرمزية.

أثناء الالتزام بالنظام الغذائي بالسوائل الصافية:

- لا تناول أي أطعمة صلبة.
- تناول أنواعًا مختلفة من السوائل الصافية. ولا تكتفي بشرب الماء والقهوة والشاي. حيث إن ذلك يساعد في حصولك على السعرات الحرارية الكافية كما أنه جزء مهم من عملية تفريغ الأمعاء.
- لا تناول أي سوائل غير شفافة، مثل الحليب أو عصائر الفاكهة المثلجة.
- لا تناول السوائل الخالية من السكر ما لم تكن مصابًا بالسكري وسمح لك مقدم الرعاية الصحية بذلك.

النظام الغذائي بالسوائل الصافية

لا يمكن تناولها	يمكن تناولها	
● أي شئٍ يحتوي على أجزاء من الأطعمة أو التوابل.	● مرق الدجاج أو مرق لحم البقر أو حساء السمك الصافي.	الحساء
● أي سوائل حمراء أو برتقالية أو قرمزية. ● جميع الحلويات الأخرى.	● الجيلاتين، مثل Jell-O®. ● الثلج ذو النكهة. ● السكاكر الصلبة، مثل Life Savers® ● وحلوى الليمون والنعناع.	الحلويات
● أي سوائل حمراء أو برتقالية أو قرمزية ● العصائر ذات اللب. ● النكتار. ● عصائر الفاكهة المثلجة أو المشروبات المخفوقة. ● الحليب والكريمة وأي منتجات ألبان أخرى. ● حليب المكسرات والحليب النباتي	● عصائر الفاكهة الصافية، مثل عصائر الليمونادة والتفاح والتوت البري الأبيض والعنب الأبيض. ● الصودا، مثل الزنجبيل وسفن أب® وسبرايت® والمياه المكرينة. ● المشروبات الرياضية، مثل Gatorade® وPowerade®.	المشروبات

<ul style="list-style-type: none"> • ومُبيضات القهوة غير الألبان، وغيرها من بدائل منتجات الألبان الأخرى. • المشروبات الكحولية. 	<ul style="list-style-type: none"> • القهوة بدون حليب أو مُبيض قهوة. • الشاي بدون حليب أو مُبيض قهوة. • الماء، ويشمل المياه الغازية (الفوارة) والمنكهة. • المشروبات الغذائية الصافية، مثل Boost® Breeze وEnsure Clear™ وPedialyte® وDiabetishield®. 	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

ابدأ تناول خليط MiraLAX الساعة 2 مساءً.

ابدأ تناول خليط MiraLAX الساعة 2 مساءً في اليوم السابق للجراحة.

اشرب خليط MiraLAX خلال الساعات الثلاث أو الأربع التالية. احرص على إنهاء الكمية بين الساعة 5 مساءً و6 مساءً.

سيسبب MiraLAX حركة الأمعاء بشكل متكرر. فاحرص على التواجد بالقرب من حمام بمجرد البدء في تناول الخليط.

قد تؤدي كثرة التبرز لتهيُّج الشرج. ويساعدك وضع جيل سائل/فازلين (Vaseline®) أو مرهم A&D® على الجلد المحيط بفتحة الشرج كل مرة بعد التبرز في تجنب هذه المشكلة.

تناول نيوميسين وميترونيدازول الساعة 6 مساءً و10 مساءً.

تناول _____ (جرعة واحدة) من نيوميسين و _____ (جرعة واحدة) من ميترونيدازول الساعة 6 مساءً في الليلة السابقة للجراحة.

تناول _____ (جرعة واحدة) أخرى من نيوميسين و _____ (جرعة واحدة) من ميترونيدازول الساعة 10 مساءً في الليلة السابقة للجراحة.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000

لمزيد من الموارد، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mskcc.org/pe للبحث في مكتبتنا الإلكترونية.

How To Do Bowel Prep Before Your Surgery at MSK Kids - Last updated on February 21, 2024

جميع الحقوق مملوكة ومحفوظة لمركز Sloan Kettering لعلاج السرطان



Memorial Sloan Kettering
Cancer Center