تعليم المريض/ مقدم الرعاية

كيفية نزع الإبرة من المنفذ الوريدي المغروس

توضح هذه المعلومات كيفية نزع الإبرة من المنفذ الوريدي المغروس.

بعد تلقي العلاج، ستحتاج إلى نزع الإبرة من المنفذ الوريدي المغروس. وتُعرف هذه العملية بإزالة التركيب.

خطوات نزع الإبرة من المنفذ الوريدي المغروس

اتبع هذه الخطوات لنزع الإبرة من المنفذ الوريدي المغروس.

استعد

1. نظِّف المنطقة المخصصة لإعداد مستلزماتك، مثل طاولة المطبخ. لا تفصل مضخة CADD-Solis VIP في الحمام.
2. اجمع المستلزمات. ستحتاج إلى:
   - حاوية بلاستيكية صلبة ذات غطاء محكم، مثل حاوية قهوة بلاستيكية. اكتب "الأدوات الحادة للعلاج الكيماوي" على الحاوية.
     - تحقق من أن الحاوية صلبة بما يكفي بحيث لا يمكن للإبر اختراق الجوانب.
     - لا تستخدم الأكياس البلاستيكية أو الورقية أو دورق الحليب.
   - 1 محقنة (10 مل) مملوءة مسبقًا بمحلول ملحي عادي.
   - 1 محقنة (3 مل) مملوءة مسبقًا بمحلول ملحي بالهيبارين.

- 1 زوج قفازات طبية.
- 1 ضمادة (Band-Aid®).
- 2 مسحة كحولية.
- 1 ضمادة شاش.

3. اغسل يديك جيدًا بالماء والصابون أو استخدم معقم يدين كحوليًا.
   - إذا كنت تغسل يديك بالماء والصابون، بلل يديك واستخدم الصابون. افرك يديك جيدًا معًا لمدة 20 ثانية على الأقل، ثم اشطفهما. جفف يديك بمنديل ورقي. واستخدم نفس المنديل لإغلاق الصنبور.
   - إذا كنت تستخدم معقم يدين كحوليًا، فاحرص على أن يغطي يديك بالكامل. افرك يديك معًا حتى يجفا.
4. ارتدي قفازات.
5. اشبك الأنبوب. إذا كانت الإبرة تحتوي على مشبكين، فاشبك الأنبوب في أبعد موضع عن صدرك.
6. جهِّز محقنة المحلول الملحي. للقيام بذلك:
   - التقط محقنة المحلول الملحي. أمسكها بحيث يتجه الطرف للأعلى.
   - قم بإرخاء الغطاء ولكن لا تنزعه.
   - اضغط على المكبس برفق لإخراج أي هواء من المحقنة.
   - أعد ربط الغطاء بإحكام.
   - ضع المحقنة على منطقة نظيفة.

شطف الأنبوب

7. قم بتنظيف الموصل عديم الإبر بالضمادة الكحولية لمدة 15 ثانية. اتركها


تجف لمدة 15 ثانية.

8. انزع غطاء محقنة المحلول الملحي بتدويره عكس اتجاه عقارب الساعة (إلى اليسار).
9. أدخل محقنة المحلول الملحي في الموصل عديم الإبر واضغط عليها مع تدويرها في اتجاه عقارب الساعة (إلى اليمين).
10. اشطف القسطرة بمقدار 10 مل من المحلول الملحي. اضغط لضخ 1 مل في كل مرة مع التوقف لمدة قصيرة بين مرات الضخ.
    - **إذا كنت طفلاً مريضًا:** اشطف الأنبوب بمقدار 5 مل من المحلول الملحي العادي. اضغط لضخ 1 مل في كل مرة مع التوقف لمدة قصيرة بين مرات الضخ.
11. قم بلف المحقنة عكس اتجاه عقارب الساعة لإزالتها من الموصل عديم الإبر.
12. قم بتنظيف الموصل عديم الإبر بالضمادة الكحولية لمدة 15 ثانية. اتركها تجف لمدة 15 ثانية.
    - **إذا كنت طفلاً مريضًا:** قم بتوصيل محقنة الهيبارين 3 مل المملوءة مسبقًا. اضغط لضخ 1 مل في كل مرة مع التوقف لمدة قصيرة بين مرات الضخ.
13. أغلق المشبك الثاني (الأقرب إلى جسمك) حتى يُطبق على الأنبوب الشفاف.


نزع الإبرة للخارج من موضع الإبرة

14. انزع الضمادة من المنفذ الوريدي المغروس. اسحب الشريط من على الجلد.

1. انزع الإبرة للخارج من موضع الإبرة. للقيام بذلك:
   - قم بتثبيت القاعدة بإصبعين من يدك غير المهيمنة (اليد التي لا تستخدمها في الكتابة).
   - ضع قاعدة مفصل الأمان على جلدك واضغط عليها برفق.
1. اجذب المقبض المتحبب (أو جناحي إبرة المنفذ) للأعلى بقوة حتى تشعر بتوقفه وثباته، أو صدور صوت يدل على ذلك، أو حدوث كلا الأمرين (انظر الشكل 1). ويعني هذا أن الإبرة أصبحت ثابتة في موضع آمن (انظر الشكل 2).



الشكل 1. جذب المقبض المتحبب للأعلى



الشكل 2. أمثلة على ثبات الإبرة في موضع الأمان

1. قم بتثبيت ضمادة الشاش على موضع الإبرة واضغط عليها للأسفل حتى يتوقف النزيف. ضع ضمادة (Band-Aid®) على موضع وجود الإبرة.

التنظيف

1. ضع الإبرة على الفور في الحاوية البلاستيكية.
1. ضع جميع المستلزمات المستخدمة بداخل الحاوية البلاستيكية. وهي تشمل المحاقن الفارغة والقفازات الطبية والضمادات الكحولية والشاش المستعمل. أغلق الغطاء بإحكام.
2. أحضر الحاوية إلى الممرضة خلال الزيارة التالية. ولا تتخلص منها بإلقائها في سلة القمامة.

معلومات الاتصال

خدمة الأطفال: إذا كانت لديك أي أسئلة، فيُرجى التواصل مع أحد أعضاء فريق الرعاية الصحية مباشرة. يمكنك التواصل مع أحد أعضاء الفريق أيام الاثنين إلى الجمعة من الساعة 7 صباحًا إلى 7 مساءً. وبعد الساعة 7 مساءً، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفي أيام الإجازات، اتصل بالرقم 212-639-2000. واطلب التحدث إلى طبيب الأطفال المناوب لطبيبك. اتصل بخدمة InfuSystem على رقم 800-315-3287 لطرح أي استفسارات بشأن المضخة.

خدمة البالغين: إذا كانت لديك أي أسئلة، فيُرجى التواصل مع أحد أعضاء فريق الرعاية الصحية مباشرة. يمكنك التواصل مع أحد أعضاء الفريق أيام الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 صباحًا إلى 5 مساءً. وبعد الساعة 5 مساءً، خلال عطلة نهاية الأسبوع، وفي أيام الإجازات، اتصل بالرقم 212-639-2000. واطلب التحدث إلى الطبيب المناوب لطبيبك. اتصل بخدمة InfuSystem على رقم 800-315-3287 لطرح أي استفسارات بشأن المضخة.

لمزيد من الموارد، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mskcc.org/pe للبحث في مكتبتنا الإلكترونية.

جميع الحقوق مملوكة ومحفوظة لمركز Memorial Sloan Kettering لعلاج السرطان