



تعليم المريض / مقدم الرعاية

نبذة عن المنفذ الوريدي المغروس

توضح هذه المعلومات طبيعة المنفذ الوريدي المغروسة لديك، وتركيب المنفذ الوريدي، وكيفية العناية به. يُطلق على المنفذ الوريدي المغروس غالباً اسم port-a-cath أو mediport. وهو يحمي أوردتك أثناء تلقي علاج السرطان.

ما هو المنفذ الوريدي المغروس؟

المنفذ الوريدي المغروس هو أحد أنواع القسطرة الوريدية المركزية (CVC). والقسطرة الوريدية المركزية هي أنبوب مرن يتم إدخاله في أحد أوردتك.

قد تحتاج أحياناً لتلقي الدواء في وريد أكبر من تلك الأوردة الموجودة في ذراعيك. يسمح المنفذ بدخول الدواء إلى مجراه الدم من خلال الوريد. ويمكن استخدامه لإعطاءك الدواء لعدة أيام متتالية.


يحمي المنفذ أوردتك من الضرر الناتج عن تكرار الوصول إليها. يُسهل المنفذ الوريدي على فريق الرعاية الصحية:

- سحب عينات الدم.
- إعطاءك الأدوية الوريدية. يتم إدخال هذا الدواء عبر أحد أوردتك. فهناك بعض الأدوية الوريدية، مثل أدوية التخدير وبعض أنواع العلاج الكيماوي، التي يجب إدخالها إلى مجراه الدم من خلال وريد كبير.
- إعطاءك السوائل الوريدية.

- إعطاءك منتجات الدم عبر الوريد، مثل الصفائح الدموية والبلازما.
- إعطاءك سائل التباین الوريدي. وهو عبارة عن صبغة خاصة تساعد مقدم الرعاية الصحية على رؤية أعضائك بوضوح أكبر.

سيخبرك مقدم الرعاية الصحية إذا كان تركيب المنفذ الوريدي هو الحل الأنسب لك ولعلاجك.

يتم عادةً تركيب المنفذ الوريدي في الصدر على مسافة بوصة واحدة تقريباً (2.5 سم) أسفل مركز الترقوة اليمنى لديك (انظر الشكل 1). فهذه هي أكثر طريقة مباشرة للوصول إلى الوريد. إذا كنتِ ترتدين حمالة صدر، فسيكون المنفذ الوريدي على بعد حوالي 1 بوصة من موضع حزام حمالة الصدر.



الشكل 1. منظر أمامي للمنفذ (اليسار) ومنظر جانبي للمنفذ (اليمين)

قد يتسبب المنفذ الوريدي لديك في رفع جلدك حوالي $\frac{1}{2}$ بوصة (1.2 سم). وقد يكون بوسنك الإحساس به تحت جلدك. ولن يشعر أغلب المرضى بوجود المنفذ الوريدي لديهم. لن تكتشف أجهزة الكشف عن المعادن المنفذ الوريدي.

يمكن إبقاء المنفذ في مكانه لسنوات. سيقوم مقدم الرعاية الصحية بإزالة

المنفذ الوريدي الخاص بك عندما لا تعود بك حاجة إليه. وسيزيله أيضًا إذا أُصيب بعده. ويمكن تركيب منفذ آخر لك في وقت لاحق إن كنت بحاجة إليه.

أجزاء المنفذ الوريدي المغروس

أجزاء المنفذ الوريدي المغروس هي المنفذ الوريدي، وال حاجز والقسطرة (انظر الشكل 2).


المنفذ الوريدي وال حاجز

المنفذ الوريدي هو نقطة البداية لتدفق السوائل عبر القسطرة. وهو يستقر تحت جلدك وله مركز مرتفع يسمى حاجز. وهذا هو جزء المنفذ الوريدي حيث سيتم تركيب الإبر. وهو يسمى أيضًا بنقطة الوصول.

هذا الحاجز مصنوع من مادة مطاطية ذاتية الغلق. ولا يمكن دخول أي شيء عبر المنفذ الوريدي من دون وجود الإبرة. يُغلق الحاجز بمجرد نزع الإبرة.

القسطرة

القسطرة عبارة عن أنبوب بلاستيكي رفيع ومرن. يكون أحد طرفيها متصلًا بالمنفذ الوريدي. فيما يستقر الطرف الآخر في الوريد.



الشكل 2. مكونات
المنفذ الوريدي لديك

أمثلة على المنافذ الوريدية المغروسة


قد تتخذ المنافذ الوريدية شكلًا دائريًا أو بيضاوياً أو مثلثاً. وقد يُطلق على المنفذ الوريدي اسم Mediport® أو BardPort® أو PowerPort® أو Port-A-Cath®. وقد تكون المنافذ أحادية التجويف أو مزدوجة التجويف (انظر الشكل 3). وسيختار مقدم الرعاية الصحية الأفضل من بينها لك ولعلاجاتك.

المنفذ الوريدي أحادي التجويف

يضم المنفذ الوريدي أحادي التجويف نقطة وصول واحدة. يتم تركيب منفذ وريدي أحادي التجويف لمعظم المرضى.

المنفذ الوريدي مزدوج التجويف

يضم المنفذ الوريدي مزدوج التجويف نقطتي وصول. ويمكنك تركيب إبرة في كل نقطة وصول. وقد يتم تركيب منفذ وريدي مزدوج التركيب لك إذا كنت تحتاج عادةً أكثر من نقطة وصول واحدة للعلاج.



الشكل 3. منافذ وريدية أحادية (اليسار) ومزدوجة (اليمين) التجويف

المنافذ الوريدية القابلة للحقن آليًا

تُصنع معظم المنافذ الوريدية المغروسة لاستخدامها أثناء اختبارات التصوير بالأشعة. وهي تشمل التصوير المقطعي المحوض (CT) أو التصوير بالرنين

المغناطيسي (MRI)، وتسمح بالحقن السريع لصبغة التباين. ويُطلق عليها اسم المنافذ الوريدية القابلة للحقن آلياً (انظر الشكل 4).

سيخبرك مقدم الرعاية الصحية إذا ما كان المنفذ الوريدي لديك من النوع القابل للحقن آلياً. وسيمنحك أيضاً بطاقة محفظة تحتوي على معلومات حول المنفذ الوريدي لديك. ونوصيك بحمل هذه البطاقة معك في كل الأوقات.



الشكل 4. منافذ وريدية أحادية التجويف (اليسار) ومزدوجة التجويف (اليمين) قابلة للحقن آلياً

ما الذي يجب القيام به قبل إجراء تركيب المنفذ الوريدي المغروس

قبل الإجراء بأسبوع واحد تقريرياً، ستلتقي بفريق الإجراء خلال الزيارة السابقة للخضوع له. وخلال هذه الزيارة، سيقدم لك أعضاء الفريق المزيد من المعلومات عن المنفذ الوريدي الجديد وكيفية الاعتناء به. ويجب أن يرافقك أيضاً أحد أفراد العائلة أو الأصدقاء لتعلم ذلك معك.

استفسر عن الأدوية الخاصة بك

قد تحتاج إلى التوقف عن تناول بعض أدوتيك قبل الخضوع للإجراء، وهي تشمل:

- فيتامين هـ.
- عقار أسبرين.
- مضادات التخثر (مضادات تجلط الدم)
- الإنسولين، أو أي أدوية أخرى لعلاج السكري.

تحدث مع طبيبك بشأن الأدوية التي يجب عليك التوقف عن تناولها لسلامتك.

إذا كنت تتناول أية أدوية أخرى، فاسأله الطبيب الذي وصف الأدوية عما إذا كان يجب عليك التوقف عن تناولها قبل الإجراء.

إذا كنت تتناول أية أدوية في الصباح، فتحدث مع طبيبك حول الأدوية التي يجب أن تتناولها قبل الإجراء. قد يوصيتك طبيبك بالانتظار حتى بعد الإجراء لتناول بعض الأدوية الخاصة بك.

ملاحظة وقت الإجراء

سيتصل بك أحد أعضاء الفريق بين الساعة 2 ظهراً و4 عصراً في اليوم السابق للإجراء. إذا تقرر موعد إجرائك يوم الاثنين، فسوف يتصل بك يوم الجمعة السابق له. إذا لم تتلق أي مكالمة بحلول الساعة 4 عصراً، فاتصل برقم 5948-639-212.

سيخبرك أحد أفراد فريق العمل بموعده وصولك إلى المستشفى لإجراء عمليةتك. وسوف يذكّرك أيضاً بالمكان الذي ستتوجه إليه.

كيف تستعد لإجراء تركيب المنفذ الوريدي المغروس

ستخضع لإجراء تركيب المنفذ الوريدي لديك في غرفة العمليات. وسيناقش

معك مقدم الرعاية الصحية الخاص بك كيفية الاستعداد للإجراء.

إزالة الأجهزة من الجلد

ربما يتم تثبيت أجهزة معينة على جلدك. قبل الفحص أو الإجراء، يوصي صانعو الأجهزة بإزالتها:

- جهاز المراقبة المستمرة للغلوکوز (CGM)
- مضخة الإنسولين

تحدث مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك حول تحديد موعد أقرب إلى التاريخ الذي تحتاجه لتغيير جهازك. تأكد من وجود جهاز إضافي معك لتضعيه بعد الفحص أو الإجراء.

ربما لا تكون على دراية بكيفية التحكم في مستوى الغلوکوز لديك أثناء عدم استخدام الجهاز. وفي هذه الحالة، وقبل الموعد الخاص بك، تحدث مع مقدم الرعاية الصحية المسؤول عن علاج السكري لديك.

الاتفاق مع أحد الأشخاص لإعادتك إلى منزلك

يجب أن يكون لديك شريك رعاية مسؤول عن إعادتك إلى منزلك بعد الإجراء. ويُقصد بشريك الرعاية المسؤول شخص يُمكنه مساعدتك في العودة إلى المنزل بأمان. ويجب أن يكون قادرًا على الاتصال بفريق الرعاية الخاص بك في حالة وجود أي شواغل. ويمكنك الترتيب لذلك قبل الإجراء بيوم واحد.

إذا لم يكن لديك شريك رعاية مسؤول ليُعيديك إلى منزلك، في يمكنك الاتصال بأي من الوكالات الواردة أدناه. وسوف يرسلون لك أحد الأشخاص لاصطحابك إلى منزلك. تتوفّر هذه الخدمة نظير رسوم وسيتوجب عليك توفير وسيلة انتقال. ولا بأس باستخدام سيارة أجرة أو خدمة سيارات، ولكنك لا تزال بحاجة إلى شريك رعاية مسؤول لمرافقتك.

الوكالات الموجودة في نيو جيرسي
مختصو الرعاية: 877-227-4649

الوكالات الموجودة في نيويورك
مؤسسة VNS Health: 888-735-8913

مختصو الرعاية: 877-227-4649

ما الذي يجب القيام به في اليوم السابق لإجراء تركيب المنفذ الوريدي

تعليمات تناول الطعام المشروبات: قبل 8 ساعات من موعد وصولك المحدد

● توقف عن تناول الطعام قبل 8 ساعات من موعد وصولك المحدد، إذا لم تكن قد فعلت ذلك.



○ قد يطلب منك مقدم الرعاية الصحية التوقف عن تناول الطعام قبل هذا الوقت. وفي هذه الحالة، يتعين عليك اتباع تعليماته.

● لا تتناول أي طعام أو مشروبات فيما عدا السوائل الصافية التالية قبل 8 ساعات من موعد وصولك:

○ الماء.

○ الصودا.

○ العصائر الصافية، مثل عصائر الليموناده والتفاح والتوت البري. تجنب تناول عصير البرتقال أو العصائر ذات اللب.

○ القهوة السوداء أو الشاي (بدون أي نوع من الحليب أو

مبixin القهوة).


- المشروبات الرياضية، مثل Gatorade®.
- مشروب ClearFast CF(Preop®) أو مشروب Ensure® Pre-Surgery الكربوهيدرات الصافي.
- الجيلاتين، مثل O-Jell®.

يمكنك تناولها حتى ساعتين قبل موعد وصولك.

ما الذي يجب القيام به في اليوم السابق لإجراء تركيب المنفذ الوريدي

تعليمات تناول المشروبات: قبل ساعتين من موعد وصولك المحدد

توقف عن تناول المشروبات قبل ساعتين من موعد وصولك المحدد. وهذا يشمل الماء.



تعليمات الأدوية

تناول فقط الأدوية التي أخبرك طبيبك أن تتناولها في صباح يوم الإجراء. تناولها برشفة صغيرة من الماء.

نقاط يجب تذكرها

- يمكنك الاستحمام على النحو المعتاد بعد الإجراء. قد يوصيوك مقدم الرعاية الصحية بالاستحمام بنوع معين من الصابون يُعرف باسم هيبكلينس [Hibiclens] في الليلة السابقة للإجراء. وفي هذه الحالة، اقرأ قسم "الاستحمام بمُطهر ومنظف الجلد (مثل محلول هيبكلينس"

[Hibiclens]) بهذا المورد.

- لا تضع أي غسول أو كريم أو بودرة أو مزيل عرق أو مكياج أو مسحوق أو عطر أو كولونيا.
- إذا كنت ترتدين عدسات لاصقة، فارتدي نظارتك بدلاً منها. قد يؤدي ارتداء العدسات الاصقة أثناء العملية إلى الإضرار بعينيك.
- لا ترتدي أية أشياء معدنية. انزع جميع المجوهرات، بما في ذلك أقراط الجسم. يمكن أن تسبب المعدات المستخدمة أثناء الإجراء في إصابتك بحرق إذا لامست المعدن.
- اترك الأشياء الثمينة (مثل بطاقات الائتمان والمجوهرات) في المنزل.
- سيتعين عليك نزع أشياء معينة قبل دخول غرفة العمليات. وهي تشمل النظارات وسماعات الأذن الطبية، وأطقم الأسنان، والأجهزة التعويضية، والشعر المستعار، والمتعلقات الدينية.

ما ينبغي إحضاره

- حافظة لنظاراتك إن كنت تستخدمها.
- ملابس فضفاضة ومرحة لارتدائها بعد العملية.
- وسادة صغيرة أو منشفة، إذا كنت ستنتقل إلى المنزل بالسيارة. يمكن استخدام هذه الوسادة لحماية الشق (القطع الجراحي) من حزام الأمان.
- نموذج وكيل الرعاية الصحية الخاص بك والتوجيهات المسبقة الأخرى، إذا قمت بإكمالها.
- الأدوية الخاصة بك، إن كنت تتناولها.

أين تقع ساحة انتظار السيارات

يقع مرآب وقوف السيارات بمركز ميموريال سلون كيترینج (MSK) في شارع East 66th بين جادة York Avenue وجادة 1st Avenue. للاستفسار عن الأسعار، يمكنك الاتصال على الرقم 212-639-2338.

.York Avenue، توجه إلى شارع East 66th من جادة York Avenue على الجانب الأيمن (الشمالي) من الشارع. وهناك ستتجد نفقاً يربط بين المرآب والمستشفى يمكنك السير منه.

هناك مراائب أخرى يمكن إيقاف السيارات فيها في:

- شارع 2nd Avenue بين جادة 1st Avenue وجادة East 69th.
- شارع 1st Avenue بين جادة York Avenue وجادة East 67th.
- شارع 2nd Avenue بين جادة 1st Avenue وجادة East 65th.

الأمور المتوقعة عند وصولك

سيطلب منك العديد من أعضاء فريق الرعاية الصحية ذكر اسمك وتاريخ ميلادك وتهجي حروفهما. وهذا الأمر حفاظاً على سلامتك. علماً بأنه قد يخضع الأشخاص ذوي أسماء مماثلة أو مشابهة لإجراءات في نفس اليوم.

ستملأ بيانات استبيان موجز إن لم تكن فعلت ذلك عن طريق بوابة المرضى MyMSK.

ستتلقي دواءً مهدئاً يساعدك على الشعور بالاسترخاء عن طريق قسطرة. وقد تكون القسطرة وريدية يتم تركيبها في ذراعك أو يدك. ويمكن أن تكون أيضاً قسطرة وريدية مركبة، مثل القسطرة المركزية الوريدية الطرفية (PICC) إذا كان قد تم تركيب واحدة لك بالفعل. سيناقش معك أحد أعضاء فريق الرعاية

الصحية هذا الأمر قبل الإجراء.

وسيصطحبك أحد أعضاء الفريق لغرفة الإجراء عندما يحين وقت تركيب المنفذ الوريدي.

مقابلة الممرضة

ستلتقي بإحدى الممرضات قبل الخضوع للإجراء. أخبرها بجرعة أي أدوية تناولتها بعد منتصف الليل (الساعة 12 منتصف الليل) والوقت الذي تناولتها فيه. واحرص على ذكر الأدوية الموصوفة وتلك التي تُصرف بدون وصفة طبية، إلى جانب أي لصقات وكريمات.

قد تُدخل الممرضة قُنِيَّة وريدية (IV) في أحد أوردة ذراعك أو يدك غالباً. وإذا لم تدخل الممرضة قُنِيَّة وريدية، فسيتولى طبيب التخدير فعل ذلك في غرفة الإجراء.

مقابلة طبيب التخدير

ستلتقي أيضاً بطبيب التخدير. وهو طبيب تلقى التدريب الخاص على التخدير. سيتولى طبيب التخدير إعطاءك دواءً مُخدراً خلال الإجراء. وسيقوم أيضاً بما يلي:


- مراجعة سجلك الطبي معك.
- سؤالك عما إذا كنت قد واجهت أية مشكلات بخصوص التخدير فيما مضى. وهذا يشمل الغثيان (الشعور بالرغبة في القيء) أو الألم.
- التحدث معك بشأن راحتك وسلامتك أثناء الإجراء.
- التحدث معك بشأن نوع التخدير الذي ستتلقاها.
- الرد على أسئلتك بشأن التخدير.

داخل غرفة العمليات

بمجرد دخولك غرفة العمليات، سيحقنك مقدم الرعاية الصحية بمخدر موضعي. والمخدر الموضعي هو دواء يعمل على تخدير موضع معين في الجسم. سيحقنك مقدم الرعاية الصحية بالمخدر في رقبتك وصدرك.

وقد تحتاج أيضاً إلى التخدير العام لتركيب المنفذ الوريدي. والتخدير العام هو دواء يجعلك تنام أثناء الإجراء.

سيحدث الطبيب شقاً جراحيّاً (قطعاً جراحيّاً) صغيراً في قاعدة رقبتك (انظر الشكل 5). وسيبلغ طوله ما يقرب من 1 إلى 1.5 بوصة (2.5 إلى 4 سم). وسيحدث الطبيب شقاً جراحيّاً صغيراً ثانياً على مسافة 0.5 بوصة (1 سم) تقريباً على صدرك تحت عظمة الترقوة. وسيصنع جيّداً جراحيّاً تحت جلدك. ووظيفته تثبيت المنفذ الوريدي في مكانه.



الشكل 5. مواضع الشقوق الجراحية لتركيب المنفذ الوريدي

سيقوم مقدم الرعاية الصحية بإدخال القسطرة في الشق الجراحي الثاني وتوصيلها بوريدك.

وسيغلق فريق الرعاية الصحية الشقوق بالغرز الجراحية (الخياطة) أو بصمغ جراحي يُسمى Dermabond®. وفي حالة غلقها بالغرز، ستزول الغرز من

تلقاء نفسها، ولن تكون هناك حاجة لإزالتها. وقد يستخدم أيضًا Steri-Strips™. وهي قطع قصيرة ورفيعة من شريط طبي تعد أقوى من الضمادة العادية.

يستغرق هذا الإجراء ساعة واحدة تقريبًا.

ما الذي يجب القيام به بعد إجراء تركيب المنفذ الوريدي

في وحدة رعاية ما بعد التخدير (PACU)

سيتم نقلك إلى وحدة رعاية ما بعد التخدير عند إفاقتك بعد الإجراء. وستراقب ممرضة درجة حرارتك ونبضك وضغط دمك ومستويات الأكسجين لديك. قد تحصل على الأكسجين عن طريق أنبوب يستقر أسفل أنفك أو قناع يغطي أنفك وفمك. وسترتدي أيضًا حذاءين طويلين ضاغطين أسفل ساقيك.

أبلغ الممرضة إن شعرت بأي ألم. فربما تعطيك دواءً لتسكين الألم.

اسأل ممرضتك عن المدة المتوقعة التي ستبقى خلالها داخل وحدة رعاية ما بعد التخدير (PACU). سيخبرك فريق الرعاية متى يمكنك العودة بأمان إلى منزلك. وستكون بحاجة لشريك مسؤول عن رعايتك لاصطحابك إلى المنزل.

ستزيل الممرضة القسطرة الوريدية لديك قبل أن تغادر المستشفى. وستوضح لك كيفية تغيير الضمادة والاعتناء بنفسك في المنزل.

كيفية العناية بموضع الشق الجراحي

ستجد لديك ضمادة تغطي الشق الجراحي الصغير في صدرك. يمكنك نزع هذه الضمادة بعد مرور 48 ساعة (يومين) على الإجراء.

قد تشعر ببعض الألم في موضع الشقوق الجراحية وحيث تم تمرير القسطرة

تحت الجلد. وهذا الألم يتحسن على الأرجح في غضون يوم إلى يومين. يمكنك تناول مسكنات الألم التي لا تستلزم وصفة طبية (الأدوية التي تحصل عليها بدون وصفة طبية) إذا كنت بحاجة إليها. وقد تلاحظ أيضًا بعض الكدمات.

قد يؤدي ارتداء حزام الأمان إلى الضغط على الشقين الجراحيين لديك. يمكنك وضع وسادة صغيرة أو منشفة مطوية بين الحزام وجسمك للمساعدة في تجنب ذلك.

إغلاق الشقوق الجراحية بالغرز الجراحية

إذا تم إغلاق الشقين الجراحيين لديك بالغرز الجراحية:

- سيتم وضع ضمادتين صغيرتين على الشق الجراحي لديك.
- اترك الضمادتين في مكانهما لمدة 48 ساعة، أو طالما يخبرك مقدم الرعاية الصحية بذلك.
- تجنب تعريض الضمادتين إلى البلل. يمكنك الاستحمام بمجرد إزالة الضمادتين.

إغلاق الشقوق الجراحية باستخدام الصمغ الجراحي

إذا تم إغلاق الشقين الجراحيين لديك بالغرز الجراحية:

- ستجد لديك قطعًا صغيرة من شريط أو ضمادة لاصقة تغطي الشقين الجراحيين.
- لا تدهن أي غسول أو تضع أي مادة لاصقة أعلى الشريط أو الضمادة.
- تجنب نزع أو خدش الصمغ الجراحي (Dermabond). فسوف يسقط من تلقاء نفسه بعد حوالي 7 إلى 10 أيام.

- سيقدم لك فريق الرعاية الصحية تعليمات بشأن كيفية الاستحمام بشكل آمن حتى تلتئم الشقوق الجراحية لديك.

لا يحتاج الجلد فوق المنفذ الوريدي لديك إلى أي رعاية خاصة. يمكنك غسله كما تفعل في المعتاد. وإذا استخدم فريق الرعاية الصحية Steri-Strips، فستسقط من تلقاء نفسها في غضون 7 إلى 10 أيام.

لن تكتشف أجهزة الكشف عن المعادن المنفذ الوريدي.

الاستحمام والاغتسال

- خلال الـ 24 ساعة الأولى بعد الإجراء، حافظ على الضمادة جافة. يمكنك الاستحمام بإسفنج طالما لم يصل البول إلى الضمادة وظللت جافة.
- يمكنك الاستحمام بعد مرور 48 ساعة (يومين) من العملية. لا تغمر جسمك في بانيو الاستحمام أو المسبح. يمكنك البدء في الاستحمام بعد مرور أسبوع إلى أسبوعين من الإجراء. سيخبرك طبيبك متى يكون ذلك آمناً. يمكنك الغوص بجسمك كاملاً تحت الماء في حوض الاستحمام أو المسبح طالما لم يتم تركيب إبرة الوصول إلى المنفذ الوريدي لديك.
- إذا تم الوصول إلى المنفذ الوريدي لديك أثناء وجودك في المنزل:
 - قم بتغطية الضمادة الشفافة فوق المنفذ الوريدي بضمادة مقاومة للماء (مثل ضمادة Aquaguard®). وستخبرك ممرضتك بإرشادات حول كيفية استخدامها.
 - استحم بمُطهر Hibiclens كل يوم للحماية ضد العدوى. اتبع تعليمات "الاستحمام بمُطهر ومنظف للجلد (مثل محلول هيبيكلينس Hibiclens)" و"الاستحمام بمحلول غلوكونات الكلورهيكسيدين 4%" في نهاية هذا المورد.

- عند الغسيل، تعامل بلطف ورفق مع الجلد المحيط بموضع المنفذ الوريدي. يُمكنك أن تغسله بالصابون برفق، لكن لا تستخدم منشفة أو فرشاة. اشطف جلدك جيداً وجففه بمنشفة ناعمة.
- يمكنك البدء باستخدام منشفة قماشية أثناء الاستحمام والاغتسال بعد أسبوعين من الإجراء. تجنب فرك المنطقة حتى تلتئم تماماً. ويتم ذلك عادة بعد مرور حوالي 6 أسابيع من الإجراء.

النشاط البدني بعد الإجراء


سيقدم لك مقدم الرعاية الصحية تعليمات حول التمارين والحركات التي يُمكنك القيام بها أثناء التئام الشق الجراحي. استشر مقدم الرعاية الصحية الخاص بك قبل البدء في ممارسة أي تمارين، مثل:

- الجري.
- تمارين الإطالة.
- رفع أي شيء يزيد وزنه عن 10 أرطال (4.5 كغم).
- ممارسة الرياضات الجماعية التي تتضمن الاحتكاك، مثل كرة القدم.

الوصول إلى المنفذ الوريدي المغروس

سيتعامل مقدم الرعاية الصحية مع المنفذ الوريدي عندما تكون بحاجة إلى سوائل أو أدوية وريدية. وسيتم ذلك بوضع إبرة في نقطة الوصول (انظر الشكل 6). وسينتقل السائل أو الدواء من المنفذ الوريدي عبر القسطرة إلى مجرى الدم.


يجب على مقدمي الرعاية الصحية المدربين على العناية بالمنافذ الوريدية فقط التعامل مع المنفذ الوريدي لديك.



الشكل 6. الوصول إلى المنفذ الوريدي لديك

قد يحتاج فريق الرعاية الصحية الخاص بك للوصول إلى المنفذ الوريدي في يوم تركيبه. وفي هذه الحالة، سيتم إدخال إبرة الوصول في الحاجز عند تركيب المنفذ الوريدي.

ستتم تغطية الإبرة والمنفذ الوريدي بضمادة خاصة في أثناء الوصول إلى المنفذ الوريدي (انظر الشكل 7). وتساعد الضمادة في تثبيت الإبرة في مكانتها. وقد يتم كذلك وضع ضمادة صغيرة فوق الشق الجراحي العلوي. لن تحتاج إلى ضمادة فوق المنفذ الوريدي لديك عندما لا يكون قيد الاستخدام.



الشكل 7. الضمادة الموجودة
على المنفذ الوريدي

تنظيف المنفذ الوريدي المغروس لديك

يتم تنظيف المنفذ الوريدي بشكل ذاتي خلال استخدامه. ويجب تنظيفه كل 12 أسبوعاً على الأقل في أوقات عدم استخدامه. ستتولى ممرضة شطف المنفذ لديك أكثر من ذلك حسب مواعيدهك. للقيام بذلك، سُتدخل الممرضة إبرة في المنفذ الوريدي. ثم تحقن محلولاً ملحيًا (ماء مالح معقم) في القسطرة لديك. ويتم ذلك لضمان ألا يحدث انسداد في القسطرة. فقد لا تؤدي القسطرة وظيفتها إذا حدث انسداد لها. وفي هذه الحالة، قد تقتضي الضرورة إزالة المنفذ الوريدي.

إزالة المنفذ الوريدي

ربما يزيل مقدم الرعاية الصحية المنفذ الوريدي عندما لا تعود بك حاجة إليه، أو إذا أصيب ببعدي. تحدث مع مقدم الرعاية الصحية للحصول على المزيد من المعلومات بشأن إزالة المنفذ الوريدي.

متى يجب الاتصال بمقدم الرعاية الصحية

- إذا شعرت بألم مستجد أو متفاصل في موضع المنفذ الوريدي لديك.
- إذا ظهر تورم أو تقدم متزايد في موضع المنفذ الوريدي لديك.
- إذا لاحظت خروج صديد أو سائل من الشقوق الجراحية.
- إذا لاحظت أن الشقوق الجراحية ساخنة أو مؤلمة أو حمراء أو متهيجه أو مفتوحة.
- إذا أصبت بحمى تبلغ درجة الحرارة فيها 100.4 فهرنهايت (38 مئوية) أو أعلى.
- إذا أصبت برعشة.

معلومات الاتصال

إذا كانت لديك أي أسئلة، فيرجى التواصل مع أحد أعضاء فريق الرعاية الصحية مباشرة. إذا كنت مريضاً في مركز ميموريال سلون كيترینج (MSK) وتحتاج إلى التواصل مع أحد مقدمي الرعاية بعد الساعة 5 مساءً، أو في أثناء عطلة نهاية الأسبوع أو خلال عطلة رسمية، فيرجى الاتصال على الهاتف 212-2000-639. وسائل عن الزميل المناوب بقسم الأشعة التداخلية.

الاستحمام بمُطهر ومنظف للجلد (مثل محلول هيبكلينس [Hibiclens])

اتبع هذه التعليمات للاستحمام بمحلول غلوكونات الكلورهيكسيدين 4% المُطهر والمنظف للجلد. يقضي المُطهر على الجراثيم التي قد تسبب الأمراض.

1. اغسل شعرك باستخدام الشامبو والمُنعم المعتادين. اشطف رأسك جيداً.
2. اغسل وجهك ومنطقة الأعضاء التناسلية (الأربية) بالصابون المعتاد.

- اشطف جسمك جيداً بالماء الدافئ.
3. افتح زجاجة محلول غلوكونات الكلورهيكسيدين 4%. صب القليل منه في يدك أو في قطعة قماش نظيفة.
 4. ابتعد عن تيار الدش. افرك محلول غلوكونات الكلورهيكسيدين 4% برفق على جسمك من رقبتك إلى قدميك. تجنب وضعه على وجهك أو منطقتك التناسلية.
 5. عد إلى تيار الدش لشطف محلول غلوكونات الكلورهيكسيدين 4%. استخدم الماء الدافئ.
 6. جفف نفسك بمنشفة نظيفة.
- لا تضع أي غسول أو كريم أو مزيل عرق أو مكياج أو بودرة أو عطر أو كولونيا بعد الاستحمام.

لمزيد من الموارد، يُرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.mskcc.org/pe للبحث في مكتبتنا الإلكترونية.

About Your Implanted Port - Last updated on August 2, 2023
جميع الحقوق مملوكة ومحفوظة لمركز Sloan Kettering لعلاج السرطان