



রোগী এবং শূশরুযাকারীর শিক্ষা

আপনার নমনীয় সিগ্‌ময়ডোস্কপি সম্পর্কিত।

এই তথ্যগুলো আপনাকে নমনীয় সিগ্‌ময়ডোস্কপির পরস্তুতি নিতে সাহায্য করবে। আপনার মলদবার ও নিম্ন কোলোনের পরীক্ষাকে নমনীয় সিগ্‌ময়ডোস্কপি বলা হয়।

নমনীয় সিগ্‌ময়ডোস্কপি চলাকালীন, আপনার সবস্বথ্যসেবা পরদানকারী এন্ডোস্কোপ নামের একটি নমনীয় টিউব ব্যবহার করবেন, তিনি আপনার মলদবার ও নিম্ন কোলোনের ভিতরের অংশ ভিডিও স্ক্রিনে দেখবেন। তারা আপনার বায়োপসিও (টিস্যুয় নমুনা) করতে পারেন বা পরীক্ষা চলাকালীন পলিপ (বৃদ্ধিপরাপ্ত টিসুয়) অপসারণও করতে পারেন।

আপনার পর্কির্যাটি শুরুর 1 সপ্তাহ আগে

আপনার ওষুধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন

পর্কির্যাটির আগে আপনাকে আপনার কিছু ওষুধ খাওয়া বন্ধ করতে হতে পারে। কোন ওষুধগুলো বন্ধ করলে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না সে সম্পর্কে আপনার সবস্বথ্যসেবা পরদানকারীর সাথে কথা বলুন। নিচে আমরা কিছু সাধারণ উদাহরণ তালিকাভুক্ত করেছি।

অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্টস (রক্ত পাতলা করে)

যদি আপনি রক্ত পাতলা করার ওষুধ (যে ওষুধ আপনার রক্ত জমাট বাঁধার পর্কির্যাকে পরভাবিত করে) গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার পর্কির্যা সম্পন্নকারী সবস্বথ্যসেবা দলের কাছে কী করতে হবে তা জিজ্ঞাসা করুন। আপনি ওষুধ বন্ধ করার পরামর্শ পাবেন কি না, তা নিভর করে আপনি কোন ধরনের পর্কির্যা করাচ্ছেন এবং আপনি কেন রক্ত পাতলা করার ওষুধ নিচ্ছেন তার উপর।

এখানে কিছু রক্ত পাতলা করার ওষুধের উদাহরণ দেওয়া হলো। আরও কিছু আছে, তাই নিশ্চিত করুন যে আপনার সেবাদানকারী দল আপনার গ্রহণ করা সমস্ত ওষুধ সম্পর্কে জানে। আপনার কেয়ার টিমের কোনো সদস্যের সাথে কথা না বলে রক্ত পাতলা করা গ্রহণ বন্ধ করবেন না।

<ul style="list-style-type: none"> • এপিক্সাবান (Eliquis®) • অয়াসপিরিন • সেলেককিসব (Celebrex®) • সিলোস্টাজল (Pletal®) • ক্লপিডগরেল (Plavix®) • দবিগাতরান (Pradaxa®) • ডালেটপারিন (Fragmin®) • ডিপাইরিডামোল (Persantine®) • এডোক্সাবান (Savaysa®) • এনোক্সাপারিন (Lovenox®) • ফন্ডাপারিনাক্স (Arixtra®) • হেপারিন ইনজেকশন (শট) 	<ul style="list-style-type: none"> • মেলোক্সিকাম (Mobic®) • ননস্টেরয়েডাল অ্যানিট-ইনফেলমেটরি ড্রাগস (NSAID), যেমন আইবুপেরাফেন (Advil®, Motrin®) এবং নয়াপেরাক্সেন (Aleve®) • পেন্টকিসফাইলাইন (Trental®) • পরসুগেরল (Effient®) • রিভারোক্সাবান (Xarelto®) • সালফাসালাজিন (Azulfidine®, Sulfazine®) • টিকাগেরল (Brilinta®) • টিঞ্জাপারিন (Innohep®) • ওয়ারফারিন (Jantoven®, Coumadin®)
--	--

ডায়াবেটিসের ওষুধ

যদি আপনি ইনসুলিন বা ডায়াবেটিসের অন্য কোনো ওষুধ গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার পরিক্রমার সকালে কী করতে হবে তা আপনার ওষুধ যিনি পেরসকরাইব করেন সেই স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর কাছে জিজ্ঞাসা করুন। আপনার পরিক্রমার আগে আপনাকে ডোজ পরিবর্তন করতে হতে পারে।

যদি আপনি মেটফর্মিন (যেমন Glucophage® বা Glumetza®) অথবা মেটফর্মিন রয়েছে এমন কোনো ওষুধ (যেমন Janumet®) গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার পরিক্রমার আগের দিন এবং পরিক্রমার দিন এটি নেবেন না।

যদি আপনি ডায়াবেটিসের জন্য অন্য কোনো মুখে খাওয়ার ওষুধ (যে ওষুধ আপনি গিলে খান) গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার পরিক্রমার আগের দিন এবং পরিক্রমার দিন সেগুলো নেবেন না।

ওজন কমানোর জন্য GLP-1 ওষুধ।

আপনি যদি GLP-1 ওষুধ গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে জানানো গুরুত্বপূর্ণ। আপনার অস্বস্তি বা পরিক্রমার আগে বিশেষ খাবার ও পানীয় সংক্রান্ত নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। এই নির্দেশাবলী অনুসরণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি এগুলো মেনে চলেন না, তাহলে আপনার অস্বস্তি বা পরিক্রমা বিলম্বিত বা বাতিল হতে পারে।

- আপনার অস্বস্তি বা পরিক্রমার আগের দিন পরিষ্কার তরল খাবারের ডায়েট অনুসরণ করুন। কোনো ধরনের শক্ত বা কঠিন খাবার গ্রহণ করবেন না। আরও তথ্য জানার জন্য [bXNrLW5vZGUtbGluazogMjAyNDg=] পড়ুন।
- আপনার আগমনের সময়ের ৮ ঘণ্টা আগে পানীয় পান বন্ধ করুন। এই সময়ের পরে কিছুই খাওয়া বা পান করা যাবে না, এমনকি পরিষ্কার তরলও। আপনি আপনার ওষুধের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে পানি পান করতে পারেন।

আরও তথ্য জানার জন্য [bXNrLW5vZGUtbGluazogMzE4MDM2] পড়ুন।

নিচে GLP-1 ওষুধের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। আরও কিছু আছে, তাই নিশ্চিত করুন যে আপনার সেবাদানকারী দল আপনার গ্রহণ করা সমস্ত ওষুধ সম্পর্কে জানে। কখনও কখনও, এগুলি ডায়াবেটিস বা অন্যান্য অবস্থার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করার জন্য নিধারিত হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে, এগুলি ওজন কমানোর জন্য নিধারিত হয়।

<ul style="list-style-type: none">• Semaglutide (Wegovy®, Ozempic®, Rybelsus®)• Dulaglutide (Trulicity®)	<ul style="list-style-type: none">• Tirzepatide (Zepbound®, Mounjaro®)• Liraglutide (Saxenda®, Victoza®)
---	---

আপনার AICD থাকলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে বলুন

আপনি সব্যংকির্য ইমপ্লান্টেবল কার্ডিওভাটার-ডিফিব্রিলেটর (AICD) ব্যবহার করলে, সেটা আপনার MSK স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে অবহিত করুন।

পর্যোজন হলে, আপনার ডাক্তারের থেকে একটি চিঠি করিয়ে নিন

- আপনার একটি অটোমেটিক ইমপ্লান্টেবল কার্ডিওভাটার-ডিফিব্রিলেটর (AICD) থাকলে, পরিক্রমার আগে আপনাকে আপনার কার্ডিওলজিস্টের (হাটের ডাক্তার) থেকে একটি ছাড়পত্র নিতে হবে। ছাড়পত্র হল একটি পত্র যাতে লেখা থাকে যে আপনি নিরাপদে পরিক্রমা করতে পারবেন।
- আপনার কোনো বুক ব্যথা, মাথা ঘোরা, শ্বাসকষ্ট হলে অথবা গত 6 সপ্তাহের মধ্যে আপনি অজ্ঞান হয়ে থাকলে, আপনাকে আপনার ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে এবং আপনার পরিক্রমার আগে আপনার ডাক্তারের কাছ থেকে একটি ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হবে।

আপনার MSK ডাক্তারের অফিসে আপনার পরিক্রমার অন্তত 1 দিন আগে এই ছাড়পত্রটি পৌঁছে যেতে হবে।

আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কাউকে ঠিক করে রাখুন

আপনার পরিক্রমার পরে আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সঙ্গে অবশ্যই একজন দায়িত্ববান পরিচর্যা সহযোগী থাকতে হবে। দায়িত্ববান পরিচর্যা সহযোগী হলেন এমন ব্যক্তি যিনি আপনাকে নিরাপদে বাসায় নিয়ে যেতে সহায়তা করতে পারেন। তাদের কোনো উদ্বেগ থাকলে তারা যেন আপনার পরিচর্যাকারী দলের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার পরিক্রমার আগের দিন নিশ্চিতভাবে বিষয়টির পরিকল্পনা করে রাখুন।

আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার যদি দায়িত্ববান পরিচর্যা সহযোগী না থাকে তবে

নিচের একটি এজেন্সিকে কল করুন। আপনাকে সঙ্গ করে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জনয়্ তারা কাউকে পাঠাবে। এই পরিষেবার জনয়্ চাজর্ করা হয় এবং আপনাকে যাতায়াতের বয়্স্থ করা করতে হবে। টয়্াকিস বা গাড়ি পরিষেবা বয়্স্থ করা যেতে পারে, কিন্তু তবুও আপনার সাথে কোনো দায়বদ্ধ পরিচয়র্ সহযোগীকে থাকতে হবে।

নিউ ইয়র্ক্ এজেন্সিসমূহ

VNS হেলথ: 888-735-8913

পরিচয়র্কারী বয়্কিত্বগর্: 877-227-4649

নিউ জার্সিতে এজেন্সিসমূহ

পরিচয়র্কারী বয়্কিত্বগর্: 877-227-4649

সামগরীগুলি কিনুন

- ১ (১০ আউন্স) বোতল সাইটের্ট অব ময়্গনেশিয়া (ময়্গনেশিয়াম সাইটের্ট)
- ১ সয়্লাইন এনিমা (যেমন Fleet® এনিমা)
- সবচ্ছ তরলসমূহ
- পেটের্লিয়াম জেলি (Vaseline®) বা A & D® মলম

আপনার পর্কিরয়্টি শুরুর 5 দিন আগে

আয়রন সাপিলমেন্ট নেওয়া বন্ধ করুন

আপনি কোনো আয়রন সাপিলমেন্ট নিলে, আপনার পর্কিরয়্টির 5 দিন আগে থেকে সেটি নেওয়া বন্ধ করুন। আয়রন সাপিলমেন্ট আপনার মলের রঙ পরিবর্তন করতে পারে। এর ফলে আপনার মলাশয় স্পষ্টভাবে দেখতে ডাক্তারদের অসুবিধা হতে পারে।

আপনার পর্কিরয়্টি শুরুর 3 দিন আগে

একজন এন্ডাসেকাপি নাসর্ আপনার পর্কিরয়্টির 3 দিন আগে সকাল 8টা থেকে সন্ধ্যা 6টার মধ্যে আপনাকে কল করবেন। তারা এই গাইডের নিদের্শাবলী আপনার সাথে পয়র্লোচনা করবেন এবং আপনার চিকিৎসার ইতিহাস নিয়ে পরশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। নাসর্ আপনার ওষুধগুলোও পয়র্লোচনা করবেন এবং আপনাকে জানাবেন আপনার পর্কিরয়্টির সকালে কোন কোন ওষুধ নিতে হবে।

সেগুলি লিখে রাখতে নিচের জায়গাটি বয়্স্থ করুন।

আপনার পরিকর্যাটি শুরুর আগের দিন



পরীক্ষা শুরুর আগের দিন থেকে কোনো কিছু খাবেন না। সবচ্ছ তরল খাবারের নিয়ম মেনে চলুন।

পরে একটি সবচ্ছ তরল খাবার খান

সবচ্ছ একটি তরল খাবারের মধ্যে শুধুমাত্র এমন তরল থাকে যা আপনি দেখতে পারেন।

উদাহরণগুলো “সবচ্ছ তরল খাবার” টেবিলে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এই খাবারের নিয়ম মেনে চলাকালীন:

- কোনো শক্ত খাবার খাবেন না।
- পানি, কফি এবং চা পান ছাড়াও অন্যান্য পানীয় পরচুর পরিমাণে পান করা নিশ্চিত করুন। এটি নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে আপনি পর্যাপ্ত ক্যালরি পাচ্ছেন এবং এটি আপনার পরিকর্যার পরস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আপনি জেগে থাকা অবস্থায় পর্তি ঘণ্টায় অন্তত ১ (৮ আউন্স) গ্লাস তরল পান করার চেষ্টা করুন।
- লাল, বেগুনী বা কমলা রঙের কিছু পান করবেন না।

আপনার ডায়াবেটিস থাকলে শুধুমাত্র চিনি মুক্ত সবচ্ছ তরল পান করুন এবং মাঝে মাঝে ব্লাড-সুগার পরিমাপ করুন। আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে, আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে কথা বলুন।

সব্চ্ছ তরল পানীয়		
	পানীয়	পান করবেন না
সু্য্প	<ul style="list-style-type: none"> • সব্চ্ছ বরথ, বুলন বা কনসোমি 	<ul style="list-style-type: none"> • শুকনো খাবার বা মশলার ফোডন দেওয়া যেকোনো সামগরী
মিষ্টি	<ul style="list-style-type: none"> • জিলেটিন, যেমন Jell-O® • সুসবাদু বরফ • শক্ত ক্যান্ডি, যেমন Life Savers® 	<ul style="list-style-type: none"> • লাল, বেগুনী বা কমলা রঙের যে কোনো কিছু
পানীয়সমূহ	<ul style="list-style-type: none"> • আপেল, সাদা কর্য়ানবেরি, লেমোনেড বা সাদা আঙুরের মতো সব্চ্ছ ফলের রস • 7-Up®, Sprite®, আদা মিশির্ত পানীয় বা সেল্টিজারে মতো সোডা • Gatorade® • ব্ল্যাক কফি • চা • জল 	<ul style="list-style-type: none"> • শাস থাকা জুস • নেক্টির • দুধ বা কির্ম • অ্যালকোহল যুক্ত পানীয় • লাল, বেগুনী বা কমলা রঙের যে কোনো কিছু

আপনার পর্কির্য়ার সময়টি নোট করুন

আপনার পর্কির্য়ার আগের দিন দুপুর 12টার পরে একজন কমরী সদসয্ আপনাকে ফোন করবেন। আপনার পর্কির্য়টির জনয্ আপনাকে কখন আসতে হবে তা সেই কমরী সদসয্ আপনাকে বলে দেবেন। কোনো সোমবার আপনার পর্কির্য়টির দিন সিথর হলে, তারা আপনাকে তার আগের শুকরবার ফোন করবেন। আপনি কল না পেয়ে থাকলে, আপনার সব্স্থয্সেবা পরদানকারীর অফিসে ফোন করুন।

পরীক্শা বাতিলের পরযোজন হলে জিআই সিডিউল অফিসে কল করুন 212-639-5020।

আপনার অন্তের পরস্তুতি নিন।

বিকাল ৪টা থেকে ৬টার মধ্যে, সাইটের্টি অব ময্গনেসিয়ার ১০-আউন্সের বোতলটি পান করুন। এর জনয্ ঘন ঘন আপনার মলতয্গ এবং ডাইরিয়া (পাতলা পায়খানা) হবে। সাধারণত ৩০ মিনিটের মধ্যেই এটা কাজ করে, তবে ৩ ঘন্টাও লাগতে পারে।

অন্তর্ পরস্তুত করার পর, আপনারনিধরিত আগমনের সময়ের ৪ ঘন্টা আগ পযরন্ত আপনি সব্চ্ছ তরল পান করতে পারেন।

আপনার পর্কির্য়টি শুরুর দিন



আপনার নিধরারিত আগমনের সময়ের ৪ ঘন্টা আগে থেকে কোনোকিছু খাবেন না বা পান করবেন না। এর মধ্যে রয়েছে পানি, শক্ত চকলেট এবং চুইংগাম।

নিজেকে একটি এনিমা দিন।

আপনার নিধরারিত আগমনের সময়ের ৪ ঘন্টা পূর্বে এনিমা শুরু করুন। এটা হয়তো খুব ভোরে হতে পারে। নিম্নের ধাপগুলি অনুসরণ করুন।

1. আপনার মলদ্বারের আশেপাশে ভয়সলিন বা A & D মলম ব্যবহার করুন। এটা জ্বালাপোড়া থেকে রক্ষা করে।
2. আপনার ডান হাঁটু ভাজ করে বুকের কাছে নিয়ে বাম পাশ হয়ে শুয়ে থাকুন।
3. এনিমার বোতলে সুরক্ষা ক্যাপটি খুলে ফেলুন। ডগাটি আপনার মলদ্বারে পরবেশ করান।
4. খালি না হওয়া পর্যন্ত বোতলটি চাপতে থাকুন।
5. আপনার মলদ্বার থেকে ডগাটি সরিয়ে ফেলুন। বাম পাশ হয়ে শুয়ে থাকুন। পায়খানা না আসা পর্যন্ত তরলটি আপনার মলদ্বারে ধরে রাখুন। এতে সাধারণত ৫ থেকে ১০ মিনিট সময় লাগে।
6. তরলটি আপনার মলদ্বার থেকে বের করে ফেলতে বাথরুমে যান।

আপনি যদি টয়লেটে কোনো মল দেখতে পান, তবে এনিমার বোতলটি সর্বাভাবিক তাপমাত্রার পানি দিয়ে ভর্তি করে উপরের ধাপটি আবার অনুসরণ করুন। যতক্ষণ মল দেখতে পাবেন না ততক্ষণ এনিমা চালিয়ে যেতে থাকুন। এনিমায় ব্যবহৃত তরলের রঙ পরিবর্তন না হলেও সমস্যা নেই।

যে জিনিসগুলি মনে রাখতে হবে

- আপনার পরকির্যার সকালে কেবলমাত্র সেই ওষুধগুলোই নিন যেগুলো নিতে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী আপনাকে বলেছেন। কয়েক চুমুক জল দিয়ে সেগুলি খান।
- কোনো ধরনের লোশন, কিরম, পাউডার, মেকআপ, পারফিউম বা কোলোন ব্যবহার করবেন না।
- শরীরে ফুটো করে পরা যে কোনো গহনা সহ সমস্ত গহনা খুলে রাখুন।
- মূল্যবান বস্তু (যেমন - কেবডিট কাডর্ এবং গহনা) বাড়িতে রেখে যান।
- আপনি যদি কন্ট্যাক্ট লেন্স পরেন তাহলে তার পরিবর্তে চশমা পরুন।

কী আনতে হবে

- আপনি বাড়িতে যে ওষুধগুলো ব্যবহার করেন তার একটি তালিকা, যার মধ্যে প্যাচ এবং কিরমও অন্তর্ভুক্ত।

- আপনার যদি কোনো রেসকিউ ইনহেলার (যেমন- হাঁপানির জনয্ আলবুটেরল) থাকে তাহলে সেটি।
- আপনার চশমার জনয্ একটি কেস।
- আপনার হেলথ কেয়ার পরক্সি ফরম, যদি আপনার পূরণ করা থাকে।

কোথায় যাবেন

আপনার পরক্সিয়ারটি এই কেন্দ্রগুলির যেকোনো একটিতে হবে:

- ডেভিড এইচ. কোচ সেন্টার
530 East 74th Street
New York, NY 10021
লিফট দিয়ে, 8ম তলায় যান।
- মেমোরিয়াল হাসপাতাল (MSK-এর মূল হাসপাতাল)-এ এনেডাস্কাপি সুয়্ট
1275 York Avenue (ইস্ট 67তম এবং ইস্ট 68তম সিট্রটের মধ্যে)
নিউ ইয়র্ক, NY 10065
2য় তলায় যেতে B লিফট ব্যবহার করুন। ডানে বাঁক নিন এবং কাঁচের দরজা ঠেলে এনেডাস্কাপি/সাজিরক্যাল ডে হাসপাতাল সুইটে ঢুকুন।
- MSK মনমাউথ
480 রেডহিল রোড মিডলটাউন
মিডলটাউন, NJ 07748

সমস্ত MSK অবস্থানে পাকিং বিষয়ক তথ্য এবং দিকনির্দেশনা পেতে www.msk.org/parking ভিজিট করুন।

কী আশা করতে পারেন

আপনি পৌঁছলে

আপনি পৌঁছে গেলে, আপনাকে আপনার নাম, নামের বানান এবং জন্ম তারিখ অনেকবার বলতে বলা হবে। এটি আপনার নিরাপত্তার জনয্। একই নামের বা অনুরূপ নামের ব্যক্তিবর্গের সেই একই দিনে পরক্সিয়া থাকতে পারে।

হাসপাতালের গাউন পরিধান করার পর, আপনি আপনার নাসের্ সাথে দেখা করবেন। তারা আপনার শিরায় একটি ইন্টারভেনাস (IV) ক্যাথেটার লাগাতে পারে, সাধারণত আপনার হাতে বা বাহুতে। আপনার পরক্সিয়ার সময় আপনাকে অয়নেস্খশিয়া (ঘুমানোর জনয্ ব্যবহৃত ওষুধ) দেওয়ার জনয্ IV ব্যবহার করা হবে। আপনার পরক্সিয়ারটির আগে আপনি IV এর মাধ্যমে তরলও পেতে পারেন।

আপনার পরিক্রমার আগে আপনার ডাক্তারের সাথে আপনি কথা বলবেন। তারা পরিক্রমাটি বখাখা করবেন এবং আপনার পরশনের উত্তর দেবেন।

আপনার পরিক্রমাটির সময়

আপনার পরিক্রমার সময় হলে, আপনি পরিক্রমা কক্ষে যাবেন এবং পরীক্ষার টেবিলের উপর শোয়ানো হবে। আপনার সবাস্থ্যসেবা পরদানকারী আপনার হাটর, শবাসপরশবাস এবং রক্তচাপ মনিটর করার জনয় সরঞ্জাম সেট আপ করবেন। আপনি আপনার নাকের নিচে অবস্থিত একটি পাতলা নলের মাধ্যমে অক্সিজেন পাবেন।

আপনাকে আপনার IV এর মাধ্যমে অয়নেসেথসিয়া দেওয়া হবে, যা আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। আপনি ঘুমিয়ে গেলে, ডাক্তার আপনার মলদবার পরীক্ষা করবেন, এরপর তিনি আপনার মলদবারের ভেতরের অংশ ও কোলনের শেষ অংশ দেখার জনয় একটি নমনীয় স্কাপ ব্যবহার করবেন। পরয়োজন হলে ডাক্তার আপনার বায়োপসিও করতে পারেন।

আপনার পরিক্রমাটির পরে

আপনার নাসর্ কর্মাগত আপনার হাটর, শবাসপরশবাস এবং রক্তচাপ মনিটর করে যাবেন। আপনি পুরোপুরি জেগে ওঠার পরে, আপনার নাসর্ আপনার IV খুলে দেবেন। আপনি বাড়িতে যাওয়ার আগে আপনার নাসর্ আপনাকে আপনার ডিসচাজেরর নিদের্শাবলী বুঝিয়ে দেবেন।

বাড়িতে

- পরীক্ষার পর ২৪ ঘন্টা (১ দিন) কোনো ধরনের অয়ালকোহোল জাতীয় পানীয় পান করবেন না।
- মলতয়গের সাথে সামানয় রক্ত আসতে পারে। এটা আপনার পরীক্ষার পর ২৪ ঘন্টা পযরন্ত হতে পারে।

আপনার স্বাস্থ্যসেবা পরদানকারীকে যখন ফোন করবেন

আপনার নিম্নলিখিত কোনো সমস্যা হলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা পরদানকারীকে ফোন করুন:

- 101 °ফা (38.3 °সে) বা তার বেশি জ্বর
- বুক বয়থা বা শ্বাসকষ্ট (শ্বাস নিতে অসুবিধা হওয়া)
- আপনার তলপেটে (পেট) গুরুতর বয়থা, কঠোরতা বা ফোলাভাব
- 24 ঘণ্টার বেশি সময় ধরে মলদবার থেকে রক্তক্ষরণ
- দুর্বলতা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া অথবা উভয়ই
- অন্য কোনো প্রশ্ন বা উদ্বেগ

আপনার কোনো প্রশ্ন বা উদ্বেগ থাকলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা পরদানকারীর সাথে যোগাযোগ করুন। আপনার পরিচর্যা দলের একজন সদস্য সোমবার থেকে শুরুর পযন্ত উত্তর দেবেন সকাল 9:00 টা থেকে বিকেল 5:00 টার পর এই সময়ের বাইরে, আপনি একটি বাতর্ রেখে যেতে পারেন বা অন্য একজন MSK পরদানকারীর সাথে কথা বলতে পারেন। কলে সবর্দা একজন ডাক্তার বা নাসর্কে পাবেন। আপনি যদি আপনার স্বাস্থ্যসেবা পরদানকারীর সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করবেন তা নিশ্চিত না হন, তাহলে ফোন করুন। ২১২-৬৩৯-২০০০.

আরো রিসোসের জনয় www.mskcc.org/pe-এ ভিজিট করে আমাদের ভাচুর্য়াল লাইবেররি দেখুন।

About Your Flexible Sigmoidoscopy - Last updated on November 24, 2025

Memorial Sloan Kettering Cancer Center কতর্ক সবর্সব্তব্ সংর্কিষত