



রোগী এবং শুশুরুষাকারীর শিক্ষা

আপনার নমনীয় সিগ্মেডোস্কপি সম্পর্কিত।

এই তথ্যগুলো আপনাকে নমনীয় সিগ্মেডোস্কপির পরস্তুতি নিতে সাহায্য করবে। আপনার মলদব্রার ও নিম্ন কোলোনের পরীক্ষাকে নমনীয় সিগ্মেডোস্কপি বলা হয়।

নমনীয় সিগ্মেডোস্কপি চলাকালীন, আপনার সবস্থিতিসেবা পর্দানকারী এন্ডোস্কাপ নামের একটি নমনীয় টিউব ব্যবহার করবেন, তিনি আপনার মলদব্রার ও নিম্ন কোলোনের ভিতরের অংশ ভিডিও সিক্রনে দেখবেন। তারা আপনার বায়োপসিও (চিসুয়্র নমুনা) করতে পারেন বা পরীক্ষা চলাকালীন পলিপ (বৃদ্ধিপরাপ্ত চিসুয়) অপসারণও করতে পারেন।

আপনার পর্কিয়াটি শুরুর 1 সপ্তাহ আগে

আপনার ওষুধগুলি সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন

পর্কিয়াটির আগে আপনাকে আপনার কিছু ওষুধ খাওয়া বন্ধ করতে হতে পারে। কোন ওষুধগুলো বন্ধ করলে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না সে সম্পর্কে আপনার সবস্থিতিসেবা পর্দানকারীর সাথে কথা বলুন। নিচে আমরা কিছু সাধারণ উদাহরণ তালিকাভুক্ত করেছি।

অ্যানিটকোয়াগুলফ্যান্টস (রক্ত পাতলা করে)

আপনি যদি রক্ত পাতলা করার ওষুধ (যেসব ঔষধ আপনার রক্ত জমাট বাধতে বাধা দেয়) ব্যবহার করে থাকেন, তবে করণীয় কাজ সম্পর্কের

আপনার পরীক্ষাকারী সবস্থিয়েবীকে জিজ্ঞাসা করুন। তারা আপনাকে ওষধ সেবনে নিষেধ করবেন কিনা সেটা আপনার পরীক্ষার ধরন এবং আপনি রক্ত পাতলা করার কারণের উপর।

আমরা নিচে কিছু সাধারণ রক্ত পাতলা করার উদাহরণ তালিকাভুক্ত করেছি। আরও কিছু আছে, তাই নিশ্চিত করুন যে আপনার সেবাদানকারী দল আপনার গর্হণ করা সমস্ত ওষুধ সম্পর্কের জানে। আপনার কেয়ার টিমের কোনো সদসেয়ের সাথে কথা না বলে রক্ত পাতল করা গর্হণ বন্ধ করবেন না।

- এপিক্সাবান (Eliquis®)
- অয়স্পিরিন
- সেলেকক্সিব (Celebrex®)
- সিলোস্টাজল (Pletal®)
- ক্লপিডগ্রেল (Plavix®)
- দবিগাতর্ন (Pradaxa®)
- ডালেটপারিন (Fragmin®)
- ডিপাইরিডামোল (Persantine®)
- এডোক্সাবান (Savaysa®)
- এনোক্সাপারিন (Lovenox®)
- ফন্ডাপারিনাক্স (Arixtra®)
- হেপারিন ইনজেকশন (শট)
- মেলোক্সিকাম (Mobic®)
- ননসেট্রয়েডাল অয়ানিট-ইনফেলমেটেরি ডরাগ্স (NSAID), যেমন আইবুপেরাফেন (Advil®, Motrin®) এবং নয়াপেরাকেক্সন (Aleve®)
- পেন্টক্সিফাইলাইন (Trental®)
- পর্সুগের্ল (Effient®)
- রিভারোক্সাবান (Xarelto®)
- সালফাসালাজিন (Azulfidine®, Sulfazine®)
- টিকাগের্লর (Brilinta®)
- টিএঞ্জাপারিন (Innohep®)
- ওয়ারফারিন (Jantoven®, Coumadin®)

ডায়াবেটিসের জন্য ওষুধ

ডায়াবেটিস এর জন্য আপনি ইনসুলিন বা অন্য কোনো ঔষধ সেবন করে থাকলে, যিনি আপনাকে ঔষধ দিয়েছেন সেই সব্স্থিয়্সেবা পর্দানকারীকে পরীক্ষার দিন সকালে কী করতে হবে সেটা জিজ্ঞাসা করুন। আপনার পর্কির্যাটির আগে আপনাকে ডোজ পরিবর্তন করতে হতে পারে।

আপনি মেটফমির্ন (যেমন Glucophage® বা Glumetza®) বা মেটফমির্ন থাকা কোনো ওষুধ নিলে (যেমন Janumet®), আপনার

পর্কিৰয়াটিৰ আগেৱ দিন বা পৰ্কিৰয়াটিৰ দিন সেটি নেবেন না।

ডায়াবেটিসেৱ জনয় আপনি অনয় কোনো মৌখিক ঔষধ (যেগুলো আপনি গিলে খান) সেবন কৱে থাকলে, সেই ঔষধ আগেৱ দিন বা সেইদিন গৱহন কৱবেন না।

ওজন হ্ৰাস কৱাৰ ওষুধ

যদি আপনি ওজন কমানোৱ জনয় ওষুধ খান (যেমন GLP-1 ওষুধ), তাহলে আপনার পদ্ধতি নিধৰাণকাৰী সব্স্থয়সেবা পৱ্দানকাৰীৰ সাথে কথা বলুন। আপনার পদ্ধতিৰ আগে তাদেৱ কী কৱতে হবে তা জিজ্ঞাসা কৱুন। আপনার পদ্ধতিৰ আগে এটি গৱহণ বন্ধ কৱতে হতে পাৱে, বিভিন্ন খাওয়া-দাওয়াৰ নিদেৱশাবলী অনুসৱণ কৱতে হতে পাৱে, অথবা উভয়ই। আপনার সব্স্থয়সেবা পৱ্দানকাৰীৰ নিদেৱশাবলি মেনে চলুন।

ওজন কমানোৱ কিছু ওষুধেৱ উদাহৱণ আমৱা নিচে তালিকাৰ ভুক্ত কৱেছি। আৱও কিছু আছে, তাই নিশ্চিত কৱুন যে আপনার সেবাদানকাৰী দল আপনার গৱহণ কৱা সমস্ত ওষুধ সম্পকেৱ জানে। এৱ মধ্যে কিছু ডায়াবেটিস নিয়ন্ত্ৰণে সাহায্য কৱাৰ জনয় ব্যবহাৰ কৱা হয় কিন্তু কখনও কখনও শুধুমাত্ৰ ওজন কমানোৱ জনয় নিধৰণিত হয়।

- Semaglutide (Wegovy®, Ozempic®, Rybelsus®)
- Dulaglutide (Trulicity®)
- Tirzepatide (Zepbound®, Mounjaro®)
- Liraglutide (Saxenda®, Victoza®)

আপনার AICD থাকলে আপনার সব্স্থয়সেবা পৱ্দানকাৰীকে বলুন আপনি সব্যংকিৱ্য ইমপ্লান্টবল কাডিৱ-ওভাটৱাৰ-ডিফাইবিলেটৱ

(AICD) বয়বহার করলে, সেটা আপনার MSK স্বাস্থ্যসেবা পর্দানকারীকে অবহিত করুন।

পর্যোজন হলে, আপনার ডাক্তারের থেকে একটি চিঠি করিয়ে নিন

- আপনার একটি অটোমেটিক ইমপ্লানেটবেল কার্ডিওভাটরার-ডিফিবিরল্লেটর (AICD) থাকলে, পর্কির্যাটির আগে আপনাকে আপনার কার্ডিওলজিস্টের (হাটের ডাক্তার) থেকে একটি ছাড়পত্র নিতে হবে। ছাড়পত্র হল একটি পত্র যাতে লেখা থাকে যে আপনি নিরাপদে পর্কির্যাটি করতে পারবেন।
- আপনার কোনো বুকে বয়াথা, মাথা ঘোরা, শব্দসকষ্ট হলে অথবা গত 6 সপ্তাহের মধ্যে আপনি অজ্ঞান হয়ে থাকলে, আপনাকে আপনার ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে এবং আপনার পর্কির্যার আগে আপনার ডাক্তারের কাছ থেকে একটি ছাড়পত্র সংগরহ করতে হবে।

আপনার MSK ডাক্তারের অফিসে আপনার পর্কির্যার অন্তত 1 দিন আগে এই ছাড়পত্রটি পৌঁছে যেতে হবে।

আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কাউকে ঠিক করে রাখুন

আপনার পর্কির্যার পরে আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সঙ্গে অবশ্যই একজন দায়িতব্বান পরিচয়রা সহযোগীকে থাকতে হবে। দায়িতব্বান পরিচয়রা সহযোগী হলেন এমন ব্যক্তি যিনি আপনাকে নিরাপদে বাসায় নিয়ে যেতে সহায়তা করতে পারেন। তাদের কোনো উদেব্গ থাকলে তারা যেন আপনার পরিচয়রাকারী দলের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার পর্কির্যার আগের দিন নিশ্চিতভাবে বিষয়টির পরিকল্পনা করে রাখুন।

আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার যদি দায়িতব্বান পরিচয়রা সহযোগী না থাকে তবে নিচের একটি এজেন্সিকে কল করুন। আপনাকে সঙ্গে করে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা কাউকে পাঠাবে। এই পরিষেবার জন্য চাজর করা হয় এবং আপনাকে যাতায়াতের বয়স্থা করতে হবে। ট্যাক্সি বা গাড়ি পরিষেবা বয়স্থার করা যেতে পারে, কিন্তু তবুও আপনার সাথে কোনো দায়বদ্ধ পরিচয়রা সহযোগীকে থাকতে হবে।

নিউ ইয়েকের এজেন্সিসমূহ

VNS হেলথ: 888-735-8913

পরিচয়রাকারী বয়ক্তিবগর: 877-
227-4649

নিউ জাসিরতে এজেন্সিসমূহ

পরিচয়রাকারী বয়ক্তিবগর: 877-
227-4649

সামগরীগুলি কিনুন

- সাইটের্ট অব ম্যাগনেসিয়ার (ম্যাগনেসিয়াম সাইটের্ট) ১ (১০-আউন্স) বোতল
- ১ স্যালাইন এনিমা (যেমন Fleet® এনিমা)
- সব্চ্ছ তরলসমূহ
- পেটেরালিয়াম জেলি (Vaseline®) বা A &D® মলম

আপনার পর্কির্যাটি শুরুর ৫ দিন আগে

আয়রন সাপিলমেন্ট নেওয়া বন্ধ করুন

আপনি কোনো আয়রন সাপিলমেন্ট নিলে, আপনার পর্কির্যার ৫ দিন আগে থেকে সেটি নেওয়া বন্ধ করুন। আয়রন সাপিলমেন্ট আপনার মলের

রঙ পরিবর্তন করতে পারে। এর ফলে আপনার মলাশয় স্পষ্টভাবে দেখতে ডাক্তারদের অসুবিধা হতে পারে।

আপনার পর্কির্যাটি শুরুর 3 দিন আগে

একজন এন্ডোস্কোপি নাসর আপনার পর্কির্যার 3 দিন আগে সকাল 8টা থেকে সন্ধিয়া 6টার মধ্যে আপনাকে কল করবেন। তারা এই গাইডের নির্দেশাবলী আপনার সাথে পয়র্যালোচনা করবেন এবং আপনার চিকিৎসার ইতিহাস নিয়ে পর্শন জিজ্ঞাসা করবেন। পর্কির্যার দিন সকালে আপনি কোন ঔষধ সেবন করবেন, আপনার ঔষধ দেখে নাসর সেটা আপনাকে জানাবেন।

সেগুলি লিখে রাখতে নিচের জায়গাটি ব্যবহার করুন।

আপনার পর্কির্যাটি শুরুর আগের দিন



পরীক্ষা শুরুর আগের দিন থেকে কোনো কিছু খাবেন না।
সবচ্ছ তরল খাবারের নিয়ম মেনে চলুন।

পরে একটি সবচ্ছ তরল খাবার খান

সবচ্ছ একটি তরল খাবারের মধ্যে শুধুমাত্র এমন তরল থাকে যা আপনি দেখতে পারেন। উদাহরণগুলো “সবচ্ছ তরল খাবার” টেবিলে তালিকাভুক্ত

করা হয়েছে। এই খাবারের নিয়ম মেনে চলাকালীন:

- কোনো শক্ত খাবার খাবেন না।
- পানি, কফি এবং চা পান ছাড়াও অন্যান্য পানীয় পরচুর পরিমাণে পান করা নিশ্চিত করুন। এর দ্বারা আপনি পরিমিত কষালির পাচেছন এটা নিশ্চিত হবেন এবং এটা আপনার পদ্ধতির পরস্তুতি গর্হণের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ঘুম থেকে ওঠার পর পর্তি ঘন্টায় অন্ততপক্ষে ১ (৮-আউন্স) গ্লাস তরল পান করার চেষ্টা করুন।
- লাল, বেগুনী, বা কমলা রঙের কিছু পান করবেন না।

আপনার ডায়াবেটিস থাকলে শুধুমাত্র চিনি মুক্ত সবচ্ছ তরল পান করুন এবং মাঝে মাঝে ব্লাড-সুগার পরিমাপ করুন। আপনার কোনো পরশ্ন থাকলে, আপনার সবস্থিসেবা পর্দানকারীর সাথে কথা বলুন।

সবচ্ছ তরল পানীয়		
	পানীয়	পান করবেন না
সুয়প	<ul style="list-style-type: none">• সবচ্ছ বরখ, বুলন বা কনসোমি	<ul style="list-style-type: none">• শুকনো খাবার বা মশলার ফোড়ন দেওয়া যেকোনো সামগরী
মিষ্টি	<ul style="list-style-type: none">• জিলেটিন, যেমন Jell-O®• সুসবাদু বরফ• শক্ত কষান্ড, যেমন Life Savers®	<ul style="list-style-type: none">• লাল, বেগুনী বা কমলা রঙের যে কোনো কিছু

<p>পানীয়সমূহ</p> <ul style="list-style-type: none"> • আপেল, সাদা কর্যানবেরি, লেমনেড বা সাদা আঙুরের মতো সবচ্ছ ফলের রস • 7-Up®, Sprite®, আদা মিশির্ত পানীয় বা সেল্টজারে মতো সোডা • Gatorade® • ব্লয়াক কফি • চা • জল 	<ul style="list-style-type: none"> • শাস থাকা জুস • নেক্টর • দুধ বা কির্ম • অ্যালকোহল যুক্ত পানীয় • লাল, বেগুনী বা কমলা রঙের যে কোনো কিছু
---	---

আপনার পর্কিরয়ার সময়টি নোট করুন

আপনার পর্কিরয়ার আগের দিন দুপুর 12টার পরে একজন কমরী সদস্য আপনাকে ফোন করবেন। আপনার পর্কিরয়াটির জন্য আপনাকে কখন আসতে হবে তা সেই কমরী সদস্য আপনাকে বলে দেবেন। কোনো সোমবার আপনার পর্কিরয়াটির দিন স্থির হলে, তারা আপনাকে তার আগের শুক্ৰবাৰ ফোন করবেন। আপনি কল না পেয়ে থাকলে, আপনার স্বাস্থ্যসেবা পর্দানকারীর অফিসে ফোন করুন।

পরীক্ষা বাতিলের পর্যোজন হলে জিআই সিডিউল অফিসে কল করুন
212-639-5020।

আপনার অন্তর্র পর্স্তুতি নিন।

বিকাল ৪টা থেকে ৬টার মধ্যে, সাইটের্ট অব ম্যাগনেসিয়ার ১০-আউন্সের বোতলটি পান করুন। এর জন্য ঘন ঘন আপনার মলতয়াগ এবং ডাইরিয়া (পাতলা পায়খানা) হবে। সাধারণত ৩০ মিনিটের মধ্যেই এটা কাজ করে, তবে ৩ ঘন্টাও লাগতে পারে।

অন্তর্পর্স্তুত কৱার পর, আপনার নিধরারিত আগমনের সময়ের ৪ ঘন্টা

আগ পঘর্ন্ত আপনি সবচ্ছ তরল পান করতে পারেন।

আপনার পর্কির্যাটি শুরুর দিন



আপনার নিধর্ণিত আগমনের সময়ের ৪ ঘন্টা আগে থেকে
কোনোকিছু খাবেন না বা পান করবেন না। এর মধ্যে রয়েছে
পানি, শক্ত চকলেট এবং চুইংগাম।

নিজেকে একটি এনিমা দিন।

আপনার নিধর্ণিত আগমনের সময়ের ৪ ঘন্টা পূর্বের এনিমা শুরু করুন।
এটা হ্যাতো খুব ভোরে হতে পারে। নিম্নর ধাপগুলি অনুসরণ করুন।

1. আপনার মলদব্রারের আশেপাশে ভয়সলিন বা A & D মলম বয়বহার
করুন। এটা জব্লাপোড়া থেকে রক্ষা করে।
2. আপনার ডান হাঁটু ভাজ করে বুকের কাছে নিয়ে বাম পাশ হয়ে শুয়ে
থাকুন।
3. এনিমার বোতলে সুরক্ষা ক্যাপটি খুলে ফেলুন। ডগাটি আপনার
মলদব্রারে পর্বেশ করান।
4. খালি না হওয়া পঘর্ন্ত বোতলটি চাপতে থাকুন।
5. আপনার মলদব্রার থেকে ডগাটি সরিয়ে ফেলুন। বাম পাশ হয়ে শুয়ে
থাকুন। পায়খানা না আসা পঘর্ন্ত তরলটি আপনার মলদব্রারে ধরে
রাখুন। এতে সাধারণত ৫ থেকে ১০ মিনিট সময় লাগে।
6. তরলটি আপনার মলদব্রার থেকে বের করে ফেলতে বাথরুমে যান।

আপনি যদি টয়লেটে কোনো মল দেখতে পান, তবে এনিমার বোতলটি
সব্ভাবিক তাপমাতরার পানি দিয়ে ভরি করে উপরের ধাপটি আবার
অনুসরণ করুন। যতক্ষণ মল দেখতে পাবেন না ততক্ষণ এনিমা চালিয়ে।

যেতে থাকুন। এনিমায় ব্যবহৃত তরলের রঙ পরিবর্তন না হলেও সমস্যা নেই।

যে জিনিসগুলি মনে রাখতে হবে

- আপনার পর্কির্যার দিন সকালে আপনার সব্স্থিসেবা পর্দানকারী আপনাকে যে ওষুধগুলি খেতে বলেছে শুধু সেগুলিই খান। কয়েক চুমুক জল দিয়ে সেগুলি খান।
- কোনো ধরনের লোশন, ক্রিম, পাউডার, মেকআপ, পারফিউম বা কোলোন ব্যবহার করবেন না।
- শরীরে ফুটো করে পরা যে কোনো গহনা সহ সমস্ত গহনা খুলে রাখুন।
- মূল্যবান বস্তু (যেমন - কেরডিট কাডর এবং গহনা) বাড়িতে রেখে যান।
- আপনি যদি কন্ট্যাক্ট লেন্স পরেন তাহলে তার পরিবর্তে চশমা পরুন।

কী আনতে হবে

- প্যাচ এবং ক্রিম সহ বাড়িতে আপনি যা যা ওষুধ খান তার একটি তালিকা।
- আপনার যদি কোনো রেসকিউ ইনহেলার (যেমন- হাঁপানির জন্য আলবুটেরল) থাকে তাহলে সেটি।
- আপনার চশমার জন্য একটি কেস।
- আপনার হেলথ কেয়ার পর্কিস ফরম, যদি আপনার পূরণ করা থাকে।

কোথায় যাবেন

আপনার পর্কির্যাটি এই কেন্দ্রগুলির যেকোনো একটিতে হবে:

- ডেভিড এইচ. কোচ সেন্টার

530 East 74th Street

New York, NY 10021

লিফট দিয়ে 8ম তলায় যান।

- মেমোরিয়াল হাসপাতাল (MSK-এর মূল হাসপাতাল)-এ এন্ডাস্কাপি সুয়ট

1275 York Avenue (ইস্ট 67তম এবং ইস্ট 68তম স্ট্রিটের মধ্যে)
নিউ ইয়র্ক, NY 10065

2য় তলায় যেতে B লিফট ব্যবহার করুন। ডানে বাঁক নিন এবং কাঁচের দরজা ঠেলে এন্ডাস্কাপি/সাজির্কয়াল ডে হাসপাতাল সুইটে ঢুকুন।

- MSK মনমাউথ

480 রেডহিল রোড মিডলটাউন
মিডলটাউন, NJ 07748

সমস্ত MSK অবস্থানে পাকিরং বিষয়ক তথ্য এবং দিকনির্দেশনা পেতে www.msk.org/parking ভিজিট করুন।

কী আশা করতে পারেন

আপনি পৌঁছলে

আপনি পৌঁছে গেলে, আপনাকে আপনার নাম, নামের বানান এবং জন্ম তারিখ অনেকবার বলতে বলা হবে। এটি আপনার নিরাপত্তার জন্য। একই নামের বা অনুরূপ নামের ব্যক্তিবগের সেই একই দিনে পর্কিরয়া থাকতে পারে।

হাসপাতালের গাউন পরিধান করার পর, আপনি আপনার নাসেরুর সাথে দেখা করবেন। তারা আপনার শিরায় একটি ইন্টারভেনাস (IV) কয়েটার লাগাতে পারে, সাধারণত আপনার হাতে বা বাহুতে। আপনার পর্কিরয়া চলাকালীন আপনাকে অ্যানেস্থেসিয়া (আপনার ঘুমানোর ওষুধ) দিতে IV

বয়বহার করা হবে। আপনার পর্কির্যাটির আগে আপনি IV এর মাধ্যমে তরলও পেতে পারেন।

আপনার পর্কির্যার আগে আপনার ডাক্তারের সাথে আপনি কথা বলবেন। তারা পর্কির্যাটি ব্যাখ্যা করবেন এবং আপনার পর্শেন উত্তর দেবেন।

আপনার পর্কির্যাটির সময়

আপনার পর্কির্যার সময় হলে, আপনি পর্কির্যা কক্ষে যাবেন এবং পরীক্ষার টেবিলের উপর শোয়ানো হবে। আপনার সবস্থিতিসেবা পর্দানকারী আপনার হাটর, শব্সপর্শব্স এবং রক্তচাপ মনিটর করার জন্য সরঞ্জাম সেট আপ করবেন। আপনি আপনার নাকের নিচে অবস্থিত একটি পাতলা নলের মাধ্যমে অক্সিজেন পাবেন।

আপনাকে আপনার IV এর মাধ্যমে অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়া হবে, যা আপনাকে ঘূম পাড়িয়ে দেবে। আপনি ঘুমিয়ে গেলে, ডাক্তার আপনার মলদব্র পরীক্ষা করবেন, এরপর তিনি আপনার মলদব্রের ভেতরের অংশ ও কোলোনের শেষ অংশ দেখার জন্য একটি নমনীয় স্কাপ বয়বহার করবেন। পর্যোজন হলে ডাক্তার আপনার বায়োপসি করতে পারেন।

আপনার পর্কির্যাটির পরে

আপনার নাসর কর্মাগত আপনার হাটর, শব্সপর্শব্স এবং রক্তচাপ মনিটর করে যাবেন। আপনি পুরোপুরি জেগে ওঠার পরে, আপনার নাসর আপনার IV খুলে দেবেন। আপনি বাড়িতে যাওয়ার আগে আপনার নাসর আপনাকে আপনার ডিসচার্জের নিদেরশাবলী বুঝিয়ে দেবেন।

বাড়িতে

- পরীক্ষার পর ২৪ ঘন্টা (১ দিন) কোনো ধরনের অ্যালকোহল জাতীয় পানীয় পান করবেন না।
- মলতয়াগের সাথে সামান্য রক্ত আসতে পারে। এটা আপনার পরীক্ষার পর ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত হতে পারে।

কখন আপনার সব্স্থিতিকে ফোন করবেন

আপনার নিম্নলিখিত কোনো সমস্যা হলে আপনার সব্স্থিতিকে ফোন করুন:

- ১০১ °ফা (38.3 °সে) বা তার বেশি জব্র
- বুক বয়থা বা শব্সকষ্ট (শব্স নিতে অসুবিধা হওয়া)
- আপনার তলপেটে (পেট) গুরুতর বয়থা, কঠোরতা বা ফোলাভাব
- 24 ঘণ্টার বেশি সময় ধরে মলদব্ার থেকে রক্তক্ষরণ
- দুর্বলতা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া অথবা উভয়ই
- অন্য কোনো পর্শন বা উদ্দেব্গ

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

আরো রিসোসেৱ্ৰ জনয় www.mskcc.org/pe-এ ভিজিট কৰে আমাদেৱ
ভাচুৱ্যাল লাইবেৱ্ৰি দেখুন।

About Your Flexible Sigmoidoscopy - Last updated on November 24, 2025

Memorial Sloan Kettering Cancer Center কতৃক সৱৰ্স্বত্ব সংৱিষ্ঠত