



রোগী এবং শুরুরকারীর শিক্ষা

# আপনার নমনীয় সিগ্‌ময়ডোস্কপি সম্পর্কিত।

এই তথ্যগুলো আপনাকে নমনীয় সিগ্‌ময়ডোস্কপির পরিস্ফুটন নিতে সাহায্য করবে। আপনার মলদ্বার ও নিম্ন কোলনের পরীক্ষাকে নমনীয় সিগ্‌ময়ডোস্কপি বলা হয়।

নমনীয় সিগ্‌ময়ডোস্কপি চলাকালীন, আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী এন্ডোস্কোপ নামের একটি নমনীয় টিউব ব্যবহার করবেন, তিনি আপনার মলদ্বার ও নিম্ন কোলনের ভিতরের অংশ ভিডিও স্ক্রিনে দেখবেন। তারা আপনার বায়োপসিও (টিস্যুর নমুনা) করতে পারেন বা পরীক্ষা চলাকালীন পলিপ (বৃদ্ধিপ্রাপ্ত টিস্যু) অপসারণও করতে পারেন।

## আপনার পরিক্রমাটি শুরুর 1 সপ্তাহ আগে

আপনার ওষুধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন

পরিক্রমার আগে আপনাকে আপনার কিছু ওষুধ খাওয়া বন্ধ করতে হতে পারে। কোন ওষুধগুলো বন্ধ করলে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না সে সম্পর্কে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে কথা বলুন। নিচে আমরা কিছু সাধারণ উদাহরণ তালিকাভুক্ত করেছি।

অ্যান্টিবায়োটিকস (রক্ত পাতলা করে)

যদি আপনি রক্ত পাতলা করার ওষুধ (যে ওষুধ আপনার রক্ত জমাট বাঁধার পরিক্রমাকে প্রভাবিত করে) গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার

পর্যক্রিয়া সম্পন্নকারী স্বাস্থ্যসেবা দলের কাছে কী করতে হবে তা জিজ্ঞাসা করুন। আপনি ওষুধ বন্ধ করার পরামর্শ পাবেন কি না, তা নির্ধারণ করে আপনি কোন ধরনের পর্যক্রিয়া করাচ্ছেন এবং আপনি কেন রক্ত পাতলা করার ওষুধ নিচ্ছেন তার উপর।

এখানে কিছু রক্ত পাতলা করার ওষুধের উদাহরণ দেওয়া হলো। আরও কিছু আছে, তাই নিশ্চিত করুন যে আপনার সেবাদানকারী দল আপনার গ্রহণ করা সমস্ত ওষুধ সম্পর্কে জানে। আপনার কেয়ার টিমের কোনো সদস্যের সাথে কথা না বলে রক্ত পাতলা করা গ্রহণ বন্ধ করবেন না।

<ul style="list-style-type: none"><li>• এপিক্সাবান (Eliquis®)</li><li>• অ্যাসপিরিন</li><li>• সেলেককিক্সব (Celebrex®)</li><li>• সিলোস্টাজল (Pletal®)</li><li>• ক্লপিডগরেল (Plavix®)</li><li>• দবিগাতরান (Pradaxa®)</li><li>• ডালেটপারিন (Fragmin®)</li><li>• ডিপাইরিডামোল (Persantine®)</li><li>• এডোক্সাবান (Savaysa®)</li><li>• এনোক্সাপারিন (Lovenox®)</li><li>• ফন্ডাপারিনাক্স (Arixtra®)</li><li>• হেপারিন ইনজেকশন (শট)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• মেলোক্সিকাম (Mobic®)</li><li>• ননস্টেরয়েডাল অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ড্রাগস (NSAID), যেমন আইবুপেরোফেন (Advil®, Motrin®) এবং ন্যাপেরোক্সেন (Aleve®)</li><li>• পেন্টক্সিফাইলাইন (Trental®)</li><li>• পরসুগেরল (Effient®)</li><li>• রিভারোক্সাবান (Xarelto®)</li><li>• সালফাসালাজিন (Azulfidine®, Sulfazine®)</li><li>• টিকাগেরল (Brilinta®)</li><li>• টিঞ্জাপারিন (Innohep®)</li><li>• ওয়ারফারিন (Jantoven®, Coumadin®)</li></ul>
---	---

## ডায়াবেটিসের ওষুধ

যদি আপনি ইনসুলিন বা ডায়াবেটিসের অন্য কোনো ওষুধ গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার পর্যক্রিয়ার সকালে কী করতে হবে তা আপনার ওষুধ ঘিনি

পেরস্কাইব করেন সেই সবা্স্থয্সেবা পর্দানকারীর কাছে জিজ্ণাসা করুন। আপনার পর্কির্য়টির আগে আপনাকে ডোজ পরিবতর্ন করতে হতে পারে।

যদি আপনি মেটফমির্ন (যেমন Glucophage® বা Glumetza®) অথবা মেটফমির্ন রয়েছে এমন কোনো ওষুধ (যেমন Janumet®) গর্হণ করেন, তাহলে আপনার পর্কির্য়র আগের দিন এবং পর্কির্য়র দিন এটি নেবেন না।

যদি আপনি ডায়াবেটিসের জনয্ অনয্ কোনো মুখে খাওয়ার ওষুধ (যে ওষুধ আপনি গিলে খান) গর্হণ করেন, তাহলে আপনার পর্কির্য়র আগের দিন এবং পর্কির্য়র দিন সেগুলো নেবেন না।

### **ওজন কমানোর জনয্ GLP-1 ওষুধ।**

আপনি যদি GLP-1 ওষুধ গর্হণ করেন, তাহলে আপনার সবা্স্থয্সেবা পর্দানকারীকে জানানো গুরুতব্পূর্ণর্। আপনার অসেতর্পচার বা পর্কির্য়র আগে বিশেষ খাবার ও পানীয় সংকর্নত নিদের্শনা মেনে চলতে হবে। এই নিদের্শাবলী অনুসরণ করা খুবই গুরুতব্পূর্ণর্। আপনি যদি এগুলো মেনে চলেন না, তাহলে আপনার অসেতর্পচার বা পর্কির্য় বিলমিব্ত বা বাতিল হতে পারে।

- আপনার অসেতর্পচার বা পর্কির্য়র আগের দিন পরিষ্কার তরল খাবারের ডায়েট অনুসরণ করুন। কোনো ধরনের শক্ত বা কঠিন খাবার গর্হণ করবেন না। আরও তথয্ জানার জনয্ [bXNrLW5vZGUtbGluazogMjAyNDg=] পড়ুন।
- আপনার আগমনের সময়ের ৮ ঘণ্টা আগে পানীয় পান বন্ধ করুন। এই সময়ের পরে কিছুই খাওয়া বা পান করা যাবে না, এমনকি পরিষ্কার

তরলও। আপনি আপনার ওষুধের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে পানি পান করতে পারেন।

আরও তথ্য জানার জন্য [bXNrLW5vZGUtbGluazogMzE4MDM2] পড়ুন।

নিচে GLP-1 ওষুধের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। আরও কিছু আছে, তাই নিশ্চিত করুন যে আপনার সেবাদানকারী দল আপনার গ্রহণ করা সমস্ত ওষুধ সম্পর্কে জানে। কখনও কখনও, এগুলি ডায়াবেটিস বা অন্যান্য অবস্থার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করার জন্য নিধারিত হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে, এগুলি ওজন কমানোর জন্য নিধারিত হয়।

<ul style="list-style-type: none"><li>• Semaglutide (Wegovy®, Ozempic®, Rybelsus®)</li><li>• Dulaglutide (Trulicity®)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Tirzepatide (Zepbound®, Mounjaro®)</li><li>• Liraglutide (Saxenda®, Victoza®)</li></ul>
---	---

আপনার AICD থাকলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে বলুন আপনি সব্যংকির্য ইমপ্লান্টেবল কার্ডিওভাটার-ডিফাইব্রিলেটর (AICD) ব্যবহার করলে, সেটা আপনার MSK স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে অবহিত করুন।

পরয়োজন হলে, আপনার ডাক্তারের থেকে একটি চিঠি করিয়ে নিন

- আপনার একটি অটোমেটিক ইমপ্লান্টেবল কার্ডিওভাটার-ডিফিব্রিলেটর (AICD) থাকলে, পরিক্রিয়াটির আগে আপনাকে আপনার কার্ডিওলজিস্টের (হাটের ডাক্তার) থেকে একটি ছাড়পত্র নিতে হবে। ছাড়পত্র হল একটি পত্র যাতে লেখা থাকে যে আপনি নিরাপদে পরিক্রিয়াটি করতে পারবেন।
- আপনার কোনো বুকে ব্যথা, মাথা ঘোরা, শ্বাসকষ্ট হলে অথবা গত 6

সপ্তাহের মধ্যে আপনি অজ্ঞান হয়ে থাকলে, আপনাকে আপনার ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে এবং আপনার পরিক্রমার আগে আপনার ডাক্তারের কাছ থেকে একটি ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হবে।

আপনার MSK ডাক্তারের অফিসে আপনার পরিক্রমার অন্তত 1 দিন আগে এই ছাড়পত্রটি পৌঁছে যেতে হবে।

### **আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কাউকে ঠিক করে রাখুন**

আপনার পরিক্রমার পরে আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সঙ্গে অবশ্যই একজন দায়িত্ববান পরিচর্যা সহযোগীকে থাকতে হবে। দায়িত্ববান পরিচর্যা সহযোগী হলেন এমন ব্যক্তি যিনি আপনাকে নিরাপদে বাসায় নিয়ে যেতে সহায়তা করতে পারেন। তাদের কোনো উদ্বেগ থাকলে তারা যেন আপনার পরিচর্যাকারী দলের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার পরিক্রমার আগের দিন নিশ্চিতভাবে বিষয়টির পরিকল্পনা করে রাখুন।

আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার যদি দায়িত্ববান পরিচর্যা সহযোগী না থাকে তবে নিচের একটি এজেন্সিকে কল করুন। আপনাকে সঙ্গে করে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা কাউকে পাঠাবে। এই পরিষেবার জন্য চার্জ করা হয় এবং আপনাকে যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। ট্যাক্সি বা গাড়ি পরিষেবা ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু তবুও আপনার সাথে কোনো দায়বদ্ধ পরিচর্যা সহযোগীকে থাকতে হবে।

**নিউ ইয়র্ক এজেন্সিসমূহ**

**নিউ জার্সিতে এজেন্সিসমূহ**

VNS হেলথ: 888-735-8913

পরিচয়কারী বক্তৃত্বগর: 877-  
227-4649

পরিচয়কারী বক্তৃত্বগর: 877-  
227-4649

## সামগরীগুলা কিনুন

- ১ (১০ আউন্স) বোতল সাইটের্ট অব ময়গনেশিয়া (ময়গনেশিয়াম সাইটের্ট)
- ১ সয়লাইন এনিমা (যেমন Fleet® এনিমা)
- সবচ্ছ তরলসমূহ
- পেটেরালিয়াম জেলি (Vaseline®) বা A & D® মলম

## আপনার পর্কির্যাটি শুরুর 5 দিন আগে

### আয়রন সাপিলমেন্ট নেওয়া বন্ধ করুন

আপনি কোনো আয়রন সাপিলমেন্ট নিলে, আপনার পর্কির্যার 5 দিন আগে থেকে সেটি নেওয়া বন্ধ করুন। আয়রন সাপিলমেন্ট আপনার মলের রঙ পরিবতর্ন করতে পারে। এর ফলে আপনার মলাশয় স্পষ্টিভাবে দেখতে ডাক্তারদের অসুবিধা হতে পারে।

## আপনার পর্কির্যাটি শুরুর 3 দিন আগে

একজন এনেডাসেকাপি নাসর্ আপনার পর্কির্যার 3 দিন আগে সকাল 8টা থেকে সন্ধ্যা 6টার মধ্যে আপনাকে কল করবেন। তারা এই গাইডের নিদের্শাবলী আপনার সাথে পয়র্লোচনা করবেন এবং আপনার চিকিৎসার

ইতিহাস নিয়ে পরশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। নাসর্ আপনার ওষুধগুলোও পযর্লোচনা করবেন এবং আপনাকে জানাবেন আপনার পর্কির্যার সকালে কোন কোন ওষুধ নিতে হবে।

সেগুলি লিখে রাখতে নিচের জায়গাটি বয্বহার করুন।

---

---

---

## আপনার পর্কির্যটি শুরুর আগের দিন



পরীক্ষা শুরুর আগের দিন থেকে কোনো কিছু খাবেন না। সবচ্ছ তরল খাবারের নিয়ম মেনে চলুন।

### পরে একটি সবচ্ছ তরল খাবার খান

সবচ্ছ একটি তরল খাবারের মধ্যে শুধুমাত্র এমন তরল থাকে যা আপনি দেখতে পারেন। উদাহরণগুলো “সবচ্ছ তরল খাবার” টেবিলে তালিকাভুক্ত করা হয়েছে। এই খাবারের নিয়ম মেনে চলাকালীন:

- কোনো শক্ত খাবার খাবেন না।
- পানি, কফি এবং চা পান ছাড়াও অন্যান্য পানীয় পরচ্চুর পরিমাণে পান করা নিশ্চিত করুন। এটি নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে আপনি পযর্প্ত কয্যালরি পাচ্ছেন এবং এটি আপনার পর্কির্যার পরস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। আপনি জেগে থাকা অবস্থায় পর্তি ঘণ্টায় অন্তত ১ (৮ আউন্স) গ্লাস তরল পান করার চেষ্টা করুন।

- লাল, বেগুনী বা কমলা রঙের কিছু পান করবেন না।

আপনার ডায়াবেটিস থাকলে শুধুমাত্র চিনি মুক্ত সব্চ্ছ তরল পান করুন এবং মাঝে মাঝে ব্লাড-সুগার পরিমাপ করুন। আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে, আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে কথা বলুন।

সব্চ্ছ তরল পানীয়		
	পানীয়	পান করবেন না
সুপ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• সব্চ্ছ বর্খ, বুলন বা কনসোমি</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• শুকনো খাবার বা মশলার ফোড়ন দেওয়া যেকোনো সামগ্রী</li> </ul>
মিষ্টি	<ul style="list-style-type: none"> <li>• জিলেটিন, যেমন Jell-O®</li> <li>• সুস্বাদু বরফ</li> <li>• শক্ত ক্যান্ডি, যেমন Life Savers®</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• লাল, বেগুনী বা কমলা রঙের যে কোনো কিছু</li> </ul>
পানীয়সমূহ	<ul style="list-style-type: none"> <li>• আপেল, সাদা কর্য়ানবেরি, লেমোনেড বা সাদা আঙুরের মতো সব্চ্ছ ফলের রস</li> <li>• 7-Up®, Sprite®, আদা মিশ্রিত পানীয় বা সেল্টজারে মতো সোডা</li> <li>• Gatorade®</li> <li>• ব্ল্যাক কফি</li> <li>• চা</li> <li>• জল</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• শাস থাকা জুস</li> <li>• নেকটর</li> <li>• দুধ বা কির্ম</li> <li>• অ্যালকোহল যুক্ত পানীয়</li> <li>• লাল, বেগুনী বা কমলা রঙের যে কোনো কিছু</li> </ul>

**আপনার পরিক্রমার সময়টি নোট করুন**

আপনার পরিক্রমার আগের দিন দুপুর 12টার পরে একজন কমরী সদস্য

আপনাকে ফোন করবেন। আপনার পরকির্য়্যাটির জনয়্ আপনাকে কখন আসতে হবে তা সেই কমরী সদস্য আপনাকে বলে দেবেন। কোনো সোমবার আপনার পরকির্য়্যাটির দিন সিখর হলে, তারা আপনাকে তার আগের শুকরবার ফোন করবেন। আপনি কল না পেয়ে থাকলে, আপনার সব্স্থয়সেবা পরদানকারীর অফিসে ফোন করুন।

পরীক্ষা বাতিলের পরয়োজন হলে জিআই সিডিউল অফিসে কল করুন 212-639-5020।

## আপনার অন্তরর পরস্তুতি দিন।

বিকাল ৪টা থেকে ৬টার মধ্যে, সাইটের্ট অব ময়্গনেসিয়ার ১০-আউনেসর বোতলটি পান করুন। এর জনয়্ ঘন ঘন আপনার মলতয়্গ এবং ডাইরিয়া (পাতলা পায়খানা) হবে। সাধারণত ৩০ মিনিটের মধ্যেই এটা কাজ করে, তবে ৩ ঘন্টাও লাগতে পারে।

অন্তর পরস্তুত করার পর, আপনারনিধরারিত আগমনের সময়ের ৪ ঘন্টা আগ পযরন্ত আপনি সব্চ্ছ তরল পান করতে পারেন।

## আপনার পরকির্য়্যাটি শুরুর দিন



আপনার নিধরারিত আগমনের সময়ের ৪ ঘন্টা আগে থেকে কোনোকিছু খাবেন না বা পান করবেন না। এর মধ্যেয়্ রয়েছে পানি, শক্ত চকলেট এবং চুইংগাম।

## নিজেকে একটি এনিমা দিন।

আপনার নিধরারিত আগমনের সময়ের ৪ ঘন্টা পূবের্ এনিমা শুরু করুন। এটা হয়তো খুব ভোরে হতে পারে। নিম্নের ধাপগুলি অনুসরণ করুন।

1. আপনার মলদব্বারের আশেপাশে ভয়্‌সলিন বা A & D মলম ব্যবহার

করুন। এটা জব্বালাপোড়া থেকে রক্ষা করে।

2. আপনার ডান হাঁটু ভাজ করে বুকের কাছে নিয়ে বাম পাশ হয়ে শুয়ে থাকুন।
3. এনিমার বোতলে সুরক্ষা ক্যাপটি খুলে ফেলুন। ডগাটি আপনার মলদ্বারে পরবেশ করান।
4. খালি না হওয়া পর্যন্ত বোতলটি চাপতে থাকুন।
5. আপনার মলদ্বার থেকে ডগাটি সরিয়ে ফেলুন। বাম পাশ হয়ে শুয়ে থাকুন। পায়খানা না আসা পর্যন্ত তরলটি আপনার মলদ্বারে ধরে রাখুন। এতে সাধারণত ৫ থেকে ১০ মিনিট সময় লাগে।
6. তরলটি আপনার মলদ্বার থেকে বের করে ফেলতে বাথরুমে যান।

আপনি যদি টয়লেটে কোনো মল দেখতে পান, তবে এনিমার বোতলটি সর্বাভাবিক তাপমাত্রার পানি দিয়ে ভর্তি করে উপরের ধাপটি আবার অনুসরণ করুন। যতক্ষণ মল দেখতে পাবেন না ততক্ষণ এনিমা চালিয়ে যেতে থাকুন। এনিমায় ব্যবহৃত তরলের রঙ পরিবর্তন না হলেও সমস্যা নেই।

## যে জিনিসগুলি মনে রাখতে হবে

- আপনার পরিক্রমার সকালে কেবলমাত্র সেই ওষুধগুলোই নিন যেগুলো নিতে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী আপনাকে বলেছেন। কয়েক চুমুক জল দিয়ে সেগুলি খান।
- কোনো ধরনের লোশন, ক্রিম, পাউডার, মেকআপ, পারফিউম বা কোলোন ব্যবহার করবেন না।
- শরীরে ফুটো করে পরা যে কোনো গহনা সহ সমস্ত গহনা খুলে রাখুন।

- মূলয্ৰান বস্তু (যেমন - কেৰ্ডিট কাডৰ্ এৰং গহনা) বাড়িতে রেখে যান।
- আপনি যদি কন্ট্যাক্ট লেন্স পরেন তাহলে তার পরিবর্তে চশমা পরুন।

## কী আনতে হবে

- আপনি বাড়িতে যে ওষুধগুলো ব্যবহার করেন তার একটি তালিকা, যার মধ্যে প্যাচ এবং কিৰ্মও অন্তর্ভুক্ত।
- আপনার যদি কোনো রেসকিউ ইনহেলার (যেমন- হাঁপানির জনয়্ আলবুটেরল) থাকে তাহলে সেটি।
- আপনার চশমার জনয়্ একটি কেস।
- আপনার হেলথ কেয়ার পরক্ৰিস্ ফরম, যদি আপনার পূরণ করা থাকে।

## কোথায় যাবেন

আপনার পরক্ৰিয়াটি এই কেন্দ্রগুলির যেকোনো একটিতে হবে:

- ডেভিড এইচ. কোচ সেন্টার  
530 East 74<sup>th</sup> Street  
New York, NY 10021  
লিফট দিয়ে 8ম তলায় যান।
- মেমোরিয়াল হাসপাতাল (MSK-এর মূল হাসপাতাল)-এ এনেডাস্কাপি  
সুয়্ট  
1275 York Avenue (ইস্ট 67তম এবং ইস্ট 68তম স্ট্রিটের মধ্যে)  
নিউ ইয়র্ক, NY 10065  
2য় তলায় যেতে B লিফট ব্যবহার করুন। ডানে বাঁক নিন এবং কাঁচের  
দরজা ঠেলে এনেডাস্কাপি/সাজিরক্য়াল ডে হাসপাতাল সুইটে ঢুকুন।
- MSK মনমাউথ

480 রেডহিল রোড মিডলটাউন  
মিডলটাউন, NJ 07748

সমস্ত MSK অবস্থানে পাকিং বিষয়ক তথ্য এবং দিকনির্দেশনা পেতে  
[www.msk.org/parking](http://www.msk.org/parking) ভিজিট করুন।

## কী আশা করতে পারেন আপনি পৌঁছেলে

আপনি পৌঁছে গেলে, আপনাকে আপনার নাম, নামের বানান এবং জন্ম তারিখ অনেকবার বলতে বলা হবে। এটি আপনার নিরাপত্তার জন্য। একই নামের বা অনুরূপ নামের ব্যক্তিবর্গের সেই একই দিনে পরিকর্যা থাকতে পারে।

হাসপাতালের গাউন পরিধান করার পর, আপনি আপনার নামের সাথে দেখা করবেন। তারা আপনার শিরায় একটি ইন্টারভেনাস (IV) ক্যাথেটার লাগাতে পারে, সাধারণত আপনার হাতে বা বাহুতে। আপনার পরিকর্যার সময় আপনাকে অ্যানেসথেসিয়া (ঘুমানোর জন্য ব্যবহৃত ওষুধ) দেওয়ার জন্য IV ব্যবহার করা হবে। আপনার পরিকর্যাটির আগে আপনি IV এর মাধ্যমে তরলও পেতে পারেন।

আপনার পরিকর্যার আগে আপনার ডাক্তারের সাথে আপনি কথা বলবেন। তারা পরিকর্যাটি ব্যাখ্যা করবেন এবং আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

## আপনার পরিকর্যাটির সময়

আপনার পরিকর্যার সময় হলে, আপনি পরিকর্যা কক্ষে যাবেন এবং পরীক্ষার টেবিলের উপর শোয়ানো হবে। আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী আপনার হার্ট, শ্বাসপ্রশ্বাস এবং রক্তচাপ মনিটর করার

জনস্ সৱঞ্জাম সেট আপ করবেন। আপনি আপনার নাকের নিচে অবস্থিত একটি পাতলা নলের মাধ্যমে অক্সিজেন পাবেন।

আপনাকে আপনার IV এর মাধ্যমে অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়া হবে, যা আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। আপনি ঘুমিয়ে গেলে, ডাক্তার আপনার মলদ্বার পরীক্ষা করবেন, এরপর তিনি আপনার মলদ্বারের ভেতরের অংশ ও কোলনের শেষ অংশ দেখার জন্য একটি নমনীয় স্কেপ ব্যবহার করবেন। পরয়োজন হলে ডাক্তার আপনার বায়োপসিও করতে পারেন।

## আপনার পরিক্রমার পরে

আপনার নাসর্ কর্মাগত আপনার হাটর, শ্বাসপর্শ্বাস এবং রক্তচাপ মনিটর করে যাবেন। আপনি পুরোপুরি জেগে ওঠার পরে, আপনার নাসর্ আপনার IV খুলে দেবেন। আপনি বাড়িতে যাওয়ার আগে আপনার নাসর্ আপনাকে আপনার ডিসচার্জের নিদের্শাবলী বুঝিয়ে দেবেন।

## বাড়িতে

- পরীক্ষার পর ২৪ ঘন্টা (১ দিন) কোনো ধরনের অ্যালকোহোল জাতীয় পানীয় পান করবেন না।
- মলত্যাগের সাথে সামান্য রক্ত আসতে পারে। এটা আপনার পরীক্ষার পর ২৪ ঘন্টা পর্যন্ত হতে পারে।

## আপনার স্বাস্থ্যসেবা পর্দানকারীকে যখন ফোন করবেন

আপনার নিম্নলিখিত কোনো সমস্যা হলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা পর্দানকারীকে ফোন করুন:

- 101 °ফা (38.3 °সে) বা তার বেশি জ্বর

- বুক বয্থা বা শব্বসকষ্ট (শব্বস নিতে অসুবিধা হওয়া)
- আপনার তলপেটে (পেট) গুরুতর বয্থা, কঠোরতা বা ফোলাভাব
- 24 ঘণ্টার বেশি সময় ধরে মলদব্বর থেকে রক্তকষরণ
- দুবরলতা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া অথবা উভয়ই
- অনয্ কোনো পরশ্ন বা উদেব্গ

আপনার কোনো পরশ্ন বা উদেব্গ থাকলে আপনার সব্বস্থয্ সেবা পরদানকারীর সাথে যোগাযোগ করুন। আপনার পরিচযর্ দলের একজন সদস্য সোমবার থেকে শুব্বরবার পযরন্ত উত্তর দেবেন সকাল 9:00 টা থেকে বিকেল 5:00 টার পর এই সময়ের বাইরে, আপনি একটি বাতর্ রেখে যেতে পারেন বা অনয্ একজন MSK পরদানকারীর সাথে কথা বলতে পারেন। কলে সবর্দা একজন ডাক্তার বা নাসর্কে পাবেন। আপনি যদি আপনার সব্বস্থয্ সেবা পরদানকারীর সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করবেন তা নিশিচ্চ না হন, তাহলে ফোন করুন। ২১২-৬৩৯-২০০০.

আরো রিসোসের্ জনয্ [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe)-এ ভিজিট করে আমাদের ভাচুর্য়াল লাইবের্রি দেখুন।

About Your Flexible Sigmoidoscopy - Last updated on November 24, 2025

Memorial Sloan Kettering Cancer Center কত্ৰ্ক সব্বসব্বত্ সংরকিষত