



রোগী এবং শুরুরকারীর শিক্ষা

## আপনার লাম্পেক্টামি এবং অ্যাক্সিলারি অস্বেতরূপচার সম্পর্কিত তথ্য

এই নির্দেশিকাটি আপনাকে MSK-এ আপনার লাম্পেক্টামি এবং অ্যাক্সিলারি অস্বেতরূপচারের জন্য পরিসৃত হতে সাহায্য করবে। আপনি সুস্থ হয়ে ওঠার সময় কী হতে পারে তা জানতেও এটি আপনাকে সাহায্য করবে।

আপনার অস্বেতরূপচারের দিন পরন্ত তথ্যের সোসর্ হিসেবে এই নির্দেশিকাটি ব্যবহার করুন। আপনার অস্বেতরূপচারের দিন এটি আপনার সাথে নিয়ে আসুন। আপনি এবং আপনার পরিচরাকারী দল এটি ব্যবহার করবেন যাতে আপনার আরোগ্য লাভ করা সম্পর্কে আরো জানতে পারেন।

### আপনার অস্বেতরূপচার সম্পর্কিত তথ্য

এই গাইডে বিভিন্ন ধরনের স্তন অস্বেতরূপচার সম্পর্কে তথ্য রয়েছে।  
আপনার থাকতে পারে:

- একটি লাম্পেক্টামি এবং সেন্টিনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি।
- একটি লাম্পেক্টামি এবং সেন্টিনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি, সম্ভাব্য অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড ডিসেকশনসহ।
- একটি লাম্পেক্টামি এবং অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড ডিসেকশন।
- আরেকটি অনুরূপ অস্বেতরূপচার।

### লাম্পেক্টামি

লাম্পেক্টামি হলো আপনার স্তন থেকে ম্যালিগন্যান্ট (ক্যান্সার

সৃষ্টিকারী) টিউমার অপসারণ করার একটি অস্বেতরূপচার। কেবলমাত্র টিউমারটি এবং এর চারপাশের স্বাভাবিক টিস্যু একটি ছোট অংশ অপসারণ করা হয়। লাম্পেক্টোমি হলো স্তন সুরক্ষাকারী এমন একটি অস্বেতরূপচার যা আপনার স্তনের আকৃতি এবং সাধারণত নিম্ন স্বাভাবিক রাখতে সাহায্য করে।

আপনার অস্বেতরূপচারের সময়, আপনার সাজর্ন আপনার বগল থেকে 1 বা একাধিক লিম্ফ নোডও অপসারণ করতে পারেন। একজন প্যাথলজিস্ট লিম্ফ নোড(গুলো) পরীক্ষা করবেন যাতে দেখা যায় ক্যান্সার সেগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে কি না। অধিকাংশ ক্ষেত্রে, সেনিটনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি নামক পরীক্ষার মাধ্যমে লিম্ফ নোডের অবস্থা পরীক্ষা করা হয়।

### সেনিটনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি

সেনিটনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি হলো এমন একটি পরীক্ষা, যেখানে সেনিটনেল লিম্ফ নোড অপসারণ করা হয় এবং এতে ক্যান্সার কোষ রয়েছে কি না তা পরীক্ষা করা হয়। সেনিটনেল লিম্ফ নোড হলো আপনার বগলের প্রথম লিম্ফ নোড(গুলো) যা স্তনের টিউমার থেকে নিঃসরণ গ্রহণ করে। যদি ক্যান্সার কোষ ছড়িয়ে পড়ে, তবে সেনিটনেল লিম্ফ নোডগুলো সাধারণত প্রথম স্থান যেখানে তারা যায়। আপনার সাজর্ন আপনার স্তনে একটি বিশেষ রং ইনজেক্ট করে সেনিটনেল নোড(গুলো) শনাক্ত করবেন।

আপনার যদি সেনিটনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি করা হয়, তাহলে আপনার অস্বেতরূপচারের অংশ হিসেবে লিম্ফাটিক ম্যাপিং করা হতে পারে। এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও তথ্য এই গাইডের পরবর্তী অংশে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আপনার অস্বেতরূপচারের সময় আপনার সাজর্ন সেনিটনেল লিম্ফ নোড(গুলি) পরীক্ষার জন্য প্যাথলজিস্টের কাছে পাঠাতে পারেন। যদি প্যাথলজিস্ট কোনো ক্যান্সার কোষ দেখতে পান, তাহলে আপনার সাজর্ন তখন বগলের

লিম্ফ নোড ডিসেকশন করতে পারেন।

### বগলের লিম্ফ নোড অপসারণের অস্বেত্রাপচার.

বগলের অধিকাংশ বা সব লিম্ফ নোড (লসিকা গরুনিথ) অপসারণের অস্বেত্রাপচারকে অয়াকিসলারি লিম্ফ নোড ডিসেকশন বলা হয়। অপসারণ করা লিম্ফ নোডের সংখ্যা বয়কিত ভেদে ভিন্ হতে পারে।

### বেরস্ট সিড লোকালাইজেশন

কিছু রোগীর কেষ্টের্ বেরস্ট সিড লোকালাইজেশনের পর্যোজন হতে পারে। এটি স্তনের অসব্ভাবিক টিসুয়্ ভেতরে একটি কষুদর্ মেটাল সিড স্থাপন করার একটি চিকিৎসা পদ্ধতি। মেটাল সিডটি আপনার সাজরুকে অস্বেত্রাপচারের সময় টিসুয়্টি শনাক্ত করতে সাহায্য করবে। আপনার যদি বেরস্ট সিড লোকালাইজেশন করাতে হয়, তবে আপনার নাসর্ আপনাকে এ বিষয়ে আরো বিস্তারিত তথ্য জানিয়ে দেবেন।

### আপনার লসিকাতন্তর্ (লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম) সম্পকের্.

আপনার লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম কিভাবে কাজ করে তা বোঝা বেশ সহায়ক হতে পারে, বিশেষ করে যখন আপনার সেনিটনেল লিম্ফ নোড বায়োপস অথবা অয়াকিসলারি নোড ডিসেকশন করানো হচ্ছে। আপনার লসিকাতন্তর্ (লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমের) ২টি প্রধান কাজ রয়েছে:


- এটি সংকর্মণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে।
- এটি আপনার শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে তরল নিষ্কাশনে সাহায্য করে।

আপনার লসিকাতন্তর্ (লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম) লিম্ফ নোড, লসিকানালী (লিম্ফ্যাটিক ভেসেল) এবং লসিকা তরল (লিম্ফ ফলুইড) নিয়ে গঠিত (চিতর্ ১ দেখুন)।

- লিম্ফ নোড (লসিকা গরুনিথ). লিম্ফ নোড হলো ছোট শিমের দানার মতো আকৃতির গরুনিথ, যা আপনার লসিকানালীগুলোর (লিম্ফ্যাটিক ভেসেল)

বরাবর অবস্থিত। আপনার লিম্ফ নোডগুলো লসিকা তরলকে পরিশোধন করে এবং সেখান থেকে বয়াকটেরিয়া, ভাইরাস, ক্যান্সার কোষ ও অন্যান্য বজর্য পদার্থ দূর করে।

- **লসিকানালী (লিম্ফ্যাটিক ভেসেল).** এগুলো আপনার রক্তনালীর মতো কষুদর্নালী, যা লসিকা তরলকে লিম্ফ নোডে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে শরীরের অন্যান্য অংশে বহন করে।
- **লসিকা তরল** একটি সবচ্ছ তরল যা আপনার লসিকা তন্তুর মধ্যে প্রবাহিত হয়। এটি এমন কোষ বহন করে যা সংক্রমণ এবং অন্যান্য রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে।



চিত্র 1. আপনার স্তন ও বগলের লসিকাতন্ত্র (লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম).

## আপনার অস্বাস্থ্যের আগে

এই বিভাগটি আপনাকে আপনার অস্বাস্থ্যের জন্য প্রস্তুত হতে সহায়তা

করবে। আপনার অস্বেত্ৰপচারের সময় নিধর্রিত হলে ংটি পড়ুন। আপনার অস্বেত্ৰপচারের সময় কাছাকাছি আসার সাথে সাথে ংটি বয্বহার করুন। পরস্তুত হওয়ার জনয্ কী করতে হবে তা সম্পকের্ ংতে গুরুতব্পূণর্ তথয্ রয়েছে।

আপনি ংই বিভাগটি পড়ার সাথে সাথে আপনার সবস্থয্সেবা পরদানকারীকে জিজ্ঞাসা করার জনয্ পরশ্ণাবলী লিখুন।

### সাজর্রার জনয্ পরস্তুতি নেওয়া

আপনার অস্বেত্ৰপচারের জনয্ পরস্তুত হতে আপনি ংং আপনার কেয়ার টিম ংকসাথে কাজ করবে। ংই বিষয়গুলির কোনোটি আপনার কে্ষতের্ পর্যোজয্ কি না তা ংমাদের জানিয়ে ংপনাকে নিরাপদ রাখতে ংমাদেরকে সাহাযয্ করুন, ংমনকি ংপনি নিশ্চিত না হলেও।

- ংমি শুধু পেরস্কির্পশনের ংষধ সেবন করি। পেরস্কির্পশনের ওষুধ হলো ংমন ওষুধ যা ংপনি শুধুমাতর্ ংকজন সবস্থয্সেবা পরদানকারীর পেরস্কির্পশনের মাধয্মে পেতে পারেন। ংদাহরণ:
  - যেসব ংষধ ংপনি মুখে সেবন করেন।
  - যেসব ংষধ ংপনি ংনজেকশনের (শটের) মাধয্মে নেন।
  - যেসব ংষধ ংপনি নিশবাসের সাথে গ্রহণ করেন (শবাস গ্রহণের সময়)।
  - যেসব ংষধ ংপনি তব্কে পয্চ বা কির্মের মাধয্মে গ্রহণ করেন।
- ংমি পয্চ ংং কির্ম সহ যেকোনো ওভার-দয্-কাউন্টার ওষুধগুলি গ্রহণ করি। ওভার-দয্-কাউন্টারের ওষুধ হলো ংমন ওষুধ যা ংপনি পেরস্কির্পশন ছাড়াই কিনতে পারেন।
- ংমি যেকোনো ডায়েটারি সাপিল্মেন্ট গ্রহণ করি, যেমন- ভেষজ, ভিটামিন, খনিজ বা পর্াকৃতিক বা ঘরোয়া পর্তিষেধক।
- ংমার পেসমেকার, ংটোমেটিক ংমপ্লয্ান্টবেল কাডির্ওভার্র-

ডিফিব্রিলেটর (AICD) বা অনযানয্ হাটর্ ডিভাইস রয়েছে।

- অতীতে অযানেসেথসিয়া (A-nes-THEE-zhuh) নিয়ে আমার সমস্যা হয়েছিল। অযানেসেথসিয়া হলো অস্বেতর্পচার বা পর্কির্যার সময় আপনাকে ঘুম পাড়ানোর ওষুধ।
- লয্‌টেক্স সহ নিদির্ষ্ট কিছু ওষুধ বা উপকরণগুলিতে আমার অয্‌লাজির্ রয়েছে।
- আমি রক্‌ত সঞ্চারণ গর্হণ করতে ইচ্ছুক নই।
- আমি গাঁজার মতো বিনোদনমূলক মাদক সেবন করি।

### গভর্ধারণ পর্তিরোধ.

অস্বেতর্পচারের আগে আপনার গভর্ধারণের কোনো সম্ভাবনা থাকলে, অবশ্যই এমন একটি জন্মনিযন্তর্র্ণ (গভর্র্নিরোধ) পদ্ধতি বয্‌বহার করুন যাতে হরমোন থাকে না। উদাহরণসব্রূপ, আপনি কন্ডোম, ডায্‌ফরাম বা কপার (Paragard®) ইন্টর্‌উটেরাইন ডিভাইস (IUD) বয্‌বহার করতে পারেন।

জন্মনিযন্তর্র্ণ সম্পর্কে আপনার কোনো পর্শ্ন থাকলে বা আপনার জনয্ উপযুক্ত জন্মনিযন্তর্র্ণ পদ্ধতি বেছে নিতে সহায়তা পর্যোজন হলে, আপনার স্তর্‌রীরোগ বিশেষজ্‌ঞর (গাইনোকোলজিস্ট) সঙ্‌গে পরামশর্ করুন।

### পর্জননক্‌ষমতা সংরক্‌ষণ

চিকিৎসা চলাকালে অনেক মানুষেরই গভর্ধারণ এড়িয়ে চলা উচিত। যদি

আপনি যেসব ওষুধ এবং সাপিল্মেন্ট সেবন করেন, আপনার সবাস্থয্‌সেবা পর্দানকারীরা সেগুলো সম্পর্কে জানে এটা নিশ্চিত করুন।

আপনি যেসব ওষুধ এবং সাপিল্মেন্ট সেবন করেন, সেগুলোর ভিত্তি করে সাজর্‌রির আগে কিছু নিদির্ষ্ট নিদের্শনা আপনাকে মেনে চলতে হতে পারে। এসব নিদের্শনা না মানলে, আপনার সাজর্‌রি বিলম্বিত বা বাতিল হতে পারে।

আপনার ডাক্তার কিছু সময়ের জন্য গভর্ধারণ না করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং ভবিষ্যতে সন্তান নেওয়ার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আপনি আপনার ডিম্বাণু (এগ) সংরক্ষণ (ফিরজ করে রাখা) করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন। আরও জানতে, পড়ুন *Fertility Preservation Before Cancer Treatment: Options for People Born with Ovaries and a Uterus* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/fertility-preservation-females-starting-treatment](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/fertility-preservation-females-starting-treatment))

### ওজন কমানোর জন্য GLP-1 ওষুধ।

আপনি যদি GLP-1 ওষুধ গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে জানানো গুরুত্বপূর্ণ। আপনার অস্বাস্থ্যকর বা পরিকল্পিত আগের বিশেষ খাবার ও পানীয় সংক্রান্ত নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। এই নির্দেশাবলী অনুসরণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি এগুলো মেনে চলেন না, তাহলে আপনার অস্বাস্থ্যকর বা পরিকল্পিত বিলম্বিত বা বাতিল হতে পারে।

- আপনার অস্বাস্থ্যকর বা পরিকল্পিত আগের দিন পরিষ্কার তরল খাবারের ডায়েট অনুসরণ করুন। কোনো ধরনের শক্ত বা কঠিন খাবার গ্রহণ করবেন না। আরও তথ্য জানার জন্য [bXNrLW5vZGUtbGluazogMjAyNDg=] পড়ুন।
- আপনার আগমনের সময়ের ৮ ঘণ্টা আগে পানীয় পান বন্ধ করুন। এই সময়ের পরে কিছুই খাওয়া বা পান করা যাবে না, এমনকি পরিষ্কার তরলও। আপনি আপনার ওষুধের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে পানি পান করতে পারেন।

আরও তথ্য জানার জন্য [bXNrLW5vZGUtbGluazogMzE4MDM2] পড়ুন।

নিচে GLP-1 ওষুধের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। আরও কিছু আছে, তাই নিশ্চিত করুন যে আপনার সেবাদানকারী দল আপনার গ্রহণ করা সমস্ত ওষুধ

সম্পর্কে জানে। কখনও কখনও, এগুলি ডায়াবেটিস বা অন্যান্য অবস্থার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করার জন্য নিধারিত হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে, এগুলি ওজন কমানোর জন্য নিধারিত হয়।

|                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"><li>• Semaglutide (Wegovy®, Ozempic®, Rybelsus®)</li><li>• Dulaglutide (Trulicity®)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Tirzepatide (Zepbound®, Mounjaro®)</li><li>• Liraglutide (Saxenda®, Victoza®)</li></ul> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### মদ পান করা সম্পর্কিত তথ্য

আপনি কী পরিমাণ মদ পান করেন সে সম্পর্কে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সাথে কথা বলা গুরুত্বপূর্ণ। এটি আমাদেরকে আপনার পরিচর্যার পরিকল্পনা করতে সহায়তা করবে।

আপনি নিয়মিত মদ পান করলে আপনার অস্বস্তিপূর্ণতার সময় এবং পরবর্তীতে আপনার অন্যান্য সমস্যার ঝুঁকি থাকতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে রক্তপাত, সংকরমণ, হৃৎপিণ্ডের সমস্যা এবং দীর্ঘ সময় ধরে হাসপাতালে থাকা।

আপনি যদি নিয়মিত মদ পান করেন এবং হঠাৎ বন্ধ করে দেন, তাহলে এর কারণে খিঁচুনি, চিত্তবিভ্রম এবং মৃত্যু হতে পারে। আপনি এই সমস্যাগুলির ঝুঁকিতে রয়েছেন তা বুঝতে পারলে আমরা এগুলি প্রতিরোধে সহায়তা করার জন্য ওষুধ দিতে পারি।

আপনার অস্বস্তিপূর্ণতার আগে সমস্যাগুলি এড়িয়ে যেতে আপনি যা করতে পারেন তা এখানে উল্লেখ করা হলো।

- আপনি কী পরিমাণ মদ পান করেন সে সম্পর্কে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সাথে সৎ থাকুন।
- আপনার অস্বস্তিপূর্ণতার পরিকল্পনা করা হয়ে গেলে মদ পান করা বন্ধ করার চেষ্টা করুন। অবিলম্বে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে বলুন,

যদি আপনার:

- মাথাব্যথা হয়।
- বমি বমি ভাব (কোনো কিছু উগরে দিচ্ছেন বলে মনে হওয়া) অনুভব হয়।
- সর্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উদ্বিগ্নতা (নাভরাস বা চিন্তিত) অনুভব হয়।
- ঘুম না হয়।

এগুলি মদ্যপান বন্ধ করার প্রাথমিক লক্ষণ যার চিকিৎসা করা যেতে পারে।

- আপনি মদ্যপান বন্ধ করতে না পারলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে বলুন।
- মদ্যপান এবং অস্বাস্থ্যকর সম্পর্কে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে প্রশ্ন করুন। বরাবরের মতো, আপনার চিকিৎসার সকল তথ্য গোপন রাখা হবে।

### ধূমপান সম্পর্কিত তথ্য

আপনি যদি ধূমপান করেন বা ইলেকট্রনিক স্মোকিং ডিভাইস ব্যবহার করেন, তবে সাজরারির সময় আপনার শ্বাসকষ্ট হতে পারে। ইলেকট্রনিক স্মোকিং ডিভাইসের উদাহরণ হল ভেপ এবং ই-সিগারেটসমূহ। সাজরারির কিছুদিন আগেও ধূমপান বন্ধ করলে, তা সাজরারির সময় বা সাজরারির পরে শ্বাসকষ্টের সমস্যা প্রতিরোধে সহায়ক হতে পারে।

আপনি ধূমপান করলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী আপনাকে আমাদের [টোবাকো ট্রিটমেন্ট প্রোগ্রামে](#) পাঠাবেন। এছাড়াও আপনি 212-610-0507 নম্বরে কল করে প্রোগ্রামটিতে যুক্ত হতে পারেন।

### সিল্প অ্যাপনিয়া সম্পর্কিত তথ্য

সিল্প অ্যাপনিয়া হলো একটি সাধারণ শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাধি। আপনার যদি সিল্প অ্যাপনিয়া হয়, তাহলে আপনার ঘুমের মধ্যে কিছু সময়ের জন্য শ্বাস-

পরশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। সবচেয়ে সাধারণ ধরন হলো অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া (OSA). OSA এর ক্ষেত্রে, ঘুমানোর সময় আপনার শ্বাসনালী সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হয়ে যায়।

OSA অস্বৈরাপচারের সময় এবং পরবর্তীতে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে। আপনার স্লিপ অ্যাপনিয়া থাকলে অথবা আপনি যদি মনে করেন যে আপনার এটি হতে পারে তাহলে আমাদেরকে বলুন। স্লিপ অ্যাপনিয়ার জন্য আপনি শ্বাস পরশ্বাসের যন্ত্র যেমন CPAP মেশিন ব্যবহার করলে আপনার অস্বৈরাপচারের দিন এটি সাথে নিয়ে আসুন।

### MSK MyChart ব্যবহার করা

MSK MyChart ([mskmychart.mskcc.org](http://mskmychart.mskcc.org)) হলো MSK-র রোগীর পোর্টাল। আপনার কেয়ার টিমকে বাতর্ পাঠাতে ও পড়তে, আপনার পরীক্ষার ফলাফল দেখতে, আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টের তারিখ ও সময় দেখতে এবং আরো অনেক কিছু করতে আপনি এটি ব্যবহার করতে পারেন। আপনি আপনার পরিচয়কারীকে তার নিজস্ব অ্যাকাউন্ট তৈরি করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে পারেন যাতে তারা আপনার পরিচয় সম্পর্কিত তথ্য দেখতে পারে।

আপনার যদি MSK MyChart এ অ্যাকাউন্ট না থাকে, তবে আপনি [mskmychart.mskcc.org](http://mskmychart.mskcc.org) ওয়েবসাইটে সাইন আপ করতে পারেন। আপনার কেয়ার টিমের সদস্যকেও ইনভাইটেশন পাঠাতে বলতে পারেন।

অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত কোন সাহায্যের জন্য, MSK MyChart হেল্পডেস্কের 646-227-2593 নম্বরে কল করুন। সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল 9টা থেকে 5টা পর্যন্ত (ইস্টার্ন টাইম) তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন।

### আপনার অস্বৈরাপচারের 30 দিনের মধ্যে পিরসাজিরকাল টেস্টিং (PST)

অস্বৈরাপচারের আগে আপনার একটি PST অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকবে। আপনি

আপনার সাজরনের অফিস থেকে অযাপয়েন্টমেন্টের তারিখ, সময় এবং ঠিকানা সহ একটি রিমাইন্ডার পাবেন। সমস্ত MSK অবস্থানে পাকিং বিষয়ক তথ্য এবং দিকনির্দেশনা পেতে [www.msk.org/parking](http://www.msk.org/parking) ভিজিট করুন।

আপনার PST অযাপয়েন্টমেন্টের দিন আপনি আপনার সব্ভাবিক ওষুধ খেতে এবং নিতে পারবেন।

অযাপয়েন্টমেন্টের সময় নিম্নলিখিত জিনিসগুলি আনা সহায়ক:

- পেরস্কির্পশন এবং নিজে থেকে কেনা ওষুধ, প্যাচ এবং কির্ম সহ আপনি যে সকল ওষুধ গ্রহণ করছেন তার একটি তালিকা।
- বিগত বছরে MSK-এর বাইরে করা যেকোনো চিকিৎসা সংকরান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল, যদি আপনার কাছে থাকে। উদাহরণের মধ্যে রয়েছে কাডিরয়াক সেটর্স টেস্ট, ইকোকাডির্ওগরাম বা কয়ারোটিড ডপলার স্টাডির ফলাফল।
- আপনার সব্স্থযসেবা পরদানকারীদের নাম এবং টেলিফোন নম্বর।

আপনার PST অযাপয়েন্টমেন্টের সময় আপনি একজন অযাডভান্স পরযাকটিস পের্ভাইডারের (APP) সাথে দেখা করবেন। তারা MSK-এর অযানেসেথসিওলজি (A-nes-THEE-zee-AH-loh-jee) কমরীদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে। তারা অসেতরূপচার বা পর্কিরয়ার সময় অযানেসেথশিয়া বযবহারে বিশেষ পরশিক্ষণপরূপ্ত ডাক্তার।

আপনার APP আপনার সাথে আপনার চিকিৎসা এবং অসেতরূপচারের ইতিহাস পর্যালোচনা করবে। আপনার পরিচয়ার পরিকল্পনা করার জনয আপনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হতে পারে, যেমন:

- আপনার হৃদস্পন্দন পরীক্ষা করার জনয ইলেক্টরাকাদির্ওগরাম (EKG)।
- বুকের এক্স-রে।

- রক্ত পরীক্ষা।

আপনার APP আপনাকে অন্যান্য সর্বস্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সাথে দেখা করার পরামর্শ দিতে পারে। আপনার অসুস্থতাপ্রচারের দিন সকালে কোন ওষুধ(গুলি) গ্রহণ করতে হবে সে সম্পর্কেও তারা আপনার সাথে কথা বলবে।

## আপনার পরিচর্যাকারীকে সনাক্ত করুন

আপনার পরিচর্যায় আপনার পরিচর্যাকারীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আপনার অসুস্থতাপ্রচারের আগে, আপনি ও আপনার পরিচর্যাকারী আপনার সর্বস্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর কাছ থেকে আপনার অসুস্থতাপ্রচার সম্পর্কে জানবেন। আপনার অসুস্থতাপ্রচারের পরে, আপনার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর পরিচর্যাকারী আপনাকে বাড়িতে নিয়ে যাবেন। তারা আপনাকে বাড়িতে আপনার নিজের পরিচর্যা করতেও সাহায্য করবেন।

## পরিচর্যাকারীদের জন্য



ক্যান্সারের চিকিৎসায় থাকা একজন ব্যক্তির পরিচর্যা করায় অনেক দায়িত্ব থাকে। আপনাকে সেগুলো পরিচালনা করতে সহায়তা করার জন্য আমরা রিসোর্স ও সহায়তা প্রদান করি।

আরো জানতে [www.msk.org/caregivers](http://www.msk.org/caregivers) দেখুন বা *A Guide for Caregivers* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/guide-caregivers](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/guide-caregivers)) পড়ুন।

## একটি হেলথ কেয়ার পরক্সি ফর্ম পূরণ করুন

আপনি ইতোমধ্যে একটি হেলথ কেয়ার পরক্সি ফর্ম পূরণ না করে থাকলে আমরা আপনাকে এখনই পূরণ করার পরামর্শ দিচ্ছি। আপনি ইতোমধ্যে একটি পূরণ করে থাকলে অথবা আপনার যদি অন্য কোনো অগির্ম নির্দেশনা থাকে তাহলে সেগুলো আপনার পরবর্তী অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসবেন।

হেলথ কেয়ার পরক্সি একটি আইনি নথি। আপনি যদি নিজের জন্য যোগাযোগ করতে না পারেন তাহলে কে আপনার পক্ষে কথা বলবে তা এতে উল্লেখ

থাকে। এই বয্কিত হলো আপনার সবাস্থয্বেসবা পর্তিনিধি।

- সবাস্থয্বেসবা পর্কিস্ এবং অনযানয্ অগির্ম নিদের্শাবলী সম্পকের্ জানতে *Advance Care Planning for People With Cancer and Their Loved Ones* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/advance-care-planning](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/advance-care-planning)) পড়ুন।
- সবাস্থয্বেসবা পর্তিনিধি হওয়ার বিষয়ে জানতে *How to Be a Health Care Agent* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-be-health-care-agent](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-be-health-care-agent)) পড়ুন।

হেলথ কেয়ার পর্কিস্ ফরম পূরণ করার বিষয়ে আপনার কোনো পর্শন থাকলে আপনার কেয়ার টিমের যেকোনো সদসেয্ৰ সাথে কথা বলুন।

### আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জনয্ কাউকে ঠিক করে রাখুন

অসেত্ৰাপচারের পর আপনাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জনয্ একজন দায়িতব্শীল বয্কিত থাকতে হবে। দায়িতব্বান পরিচযর্ সাহযোগী হলেন এমন বয্কিত যিনি আপনাকে নিরাপদে বাসায় নিয়ে যেতে সহায়তা করতে পারেন। তাদের কোনো উদেব্গ থাকলে তারা যেন আপনার পরিচযর্কারী দলের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অসেত্ৰাপচারের দিনের আগে থেকেই এর বয্বস্থা করে রাখুন।

আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জনয্ আপনার যদি দায়িতব্বান পরিচযর্ সাহযোগী না থাকে তবে নিচের একটি এজেনিস্কে কল করুন। আপনাকে সঙ্গে করে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জনয্ তারা কাউকে পাঠাবে। এই পরিষেবার জনয্ চাজর্ করা হয় এবং আপনাকে যাতায়াতের বয্বস্থা করতে হবে। টয্যাকিস্ বা গাড়ি পরিষেবা বয্বহার করা যেতে পারে, কিন্তু তবুও আপনার সাথে কোনো দায়বদ্ধ পরিচযর্ সাহযোগীকে থাকতে হবে।

নিউ ইয়কের্ এজেনিস্সমূহ

নিউ জাসির্তে এজেনিস্সমূহ

VNS হেলথ: 888-735-8913

পরিচয়কারী বয়ক্তিবগর: 877-227-4649

পরিচয়কারী বয়ক্তিবগর: 877-227-4649

**4% কেলারহেক্সিডিন গ্লুকোনেট (CHG) দরবণ অযান্টিসেপটিক তব্ক পরিষ্কারক (যেমন Hibiclens®) কিনুন**

4% CHG দরবণ হলো তব্ক পরিষ্কারক যা বয়বহার করার পর 24 ঘণ্টা জীবাণু মেরে ফেলে। আপনার অসেতরূপচারের আগে এটি দিয়ে গোসল করা অসেতরূপচারের পরে আপনার সংকরমণের ঝুঁকি হরাস করতে সহায়তা করবে। আপনি পেরস্কির্পশন ছাড়াই Evelyn H. Lauder Breast Center থেকে বের হওয়ার আগে বা আপনার নিকটস্থ ওষুধের দোকান থেকে 8% CHG (কেলারহেক্সিডিন গ্লুকোনেট) জীবাণুনাশক তব্ক পরিষ্কারক কিনতে পারেন।

**৩২৫ মিলিগ্রাম অযাসিটামিনোফেন টযাবলেট কিনুন, যেমন Tylenol® Regular Strength।**

অযাসিটামিনোফেন একটি পেরস্কির্পশন ছাড়াই পাওয়া যায় এমন বয়থানাশক ওষুধ। অসেতরূপচারের পর বাড়িতে আপনার বয়থা নিয়ন্তরণে সাহায্য করার জন্য আপনি এটি বয়বহার করবেন। এটি আগে থেকেই কিনে রাখা সুবিধাজনক হবে। আপনি এটি পেরস্কির্পশন ছাড়াই আপনার নিকটস্থ ওষুধের দোকান (ফামেরসি) থেকে কিনতে পারেন। যেকোনো ওষুধ সেবনের সময় সবসময় ওষুধের পাতের দেওয়া নিদের্শনা বা আপনার সবাস্থয়সেবা পরদানকারীর পরামশর্ অনুসরণ করুন।

**আপনার অসেতরূপচারের 7 দিন আগে**

**অযাসপিরিন সেবন করা সম্পকের আপনার সবাস্থয়সেবা পরদানকারীর নিদের্শাবলি মেনে চলুন**

অযাসপিরিন রক্তক্ষণরণ ঘটতে পারে। আপনি যদি অযাসপিরিন বা এমন কোনো ওষুধ খান যাতে অযাসপিরিন থাকে তাহলে আপনার অসেতরূপচারের 7

দিন আগে থেকে ডোজ পরিবর্তন করতে হতে পারে বা এটি খাওয়া বন্ধ করতে হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর নির্দেশাবলি মেনে চলুন। তাদের পরামর্শ ছাড়া অ্যাসপিরিন খাওয়া বন্ধ করবেন না।

আরো জানতে, পড়ুন *How To Check if a Medicine or Supplement Has Aspirin, Other NSAIDs, Vitamin E, or Fish Oil*

([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids))।

**ভিটামিন ই, মাল্টিভিটামিন, ভেষজ প্রতিকার এবং অন্যান্য ডায়েটরি পরিপূরক সেবন বন্ধ করুন**

ভিটামিন ই, মাল্টিভিটামিন, ভেষজ প্রতিকার এবং অন্যান্য ডায়েটরি পরিপূরক সেবন করলে রক্তপাত হতে পারে। আপনার অস্ত্রোপচারের 7 দিন আগে থেকে এগুলো সেবন করা বন্ধ করুন। আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী যদি আপনাকে অন্যান্য নির্দেশাবলি প্রদান করেন তাহলে সেগুলো মেনে চলুন।

আরো জানতে *Herbal Remedies and Cancer Treatment*

([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/herbal-remedies-and-treatment](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/herbal-remedies-and-treatment)) পড়ুন।

**আপনার অস্ত্রোপচারের 2 দিন আগে**

**ননস্টেরয়েডাল অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ড্রাগস (NSAID) সেবন বন্ধ করুন**

আইবুপেরোফেন (Advil® ও Motrin®) এবং ন্যাপেরোক্সেন (Aleve®) এর মতো NSAID সেবন করলে রক্তপাত হতে পারে। আপনার অস্ত্রোপচারের 2 দিন আগে থেকে এগুলো সেবন করা বন্ধ করুন। আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী যদি আপনাকে অন্যান্য নির্দেশাবলি প্রদান করেন তাহলে সেগুলো মেনে চলুন।

আরো জানতে *How To Check if a Medicine or Supplement Has Aspirin, Other NSAIDs, Vitamin E, or Fish Oil*

([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids)) পড়ুন।

## আপনার অস্বেতরূপচারের 1 দিন আগে আপনার সাজরুরির সময়টি মাথায় রাখুন

একজন কমরী আপনার সাজরুরির আগের দিন দুপুর 2টার পর আপনাকে কল করবেন। যদি আপনার অস্বেতরূপচার সোমবারের জনয়্ নিধরুরিত হয়, তবে তারা আপনাকে আগের শুরুরবারে কল করবেন। আপনি যদি সন্ধ্যা 7টা পযরন্ত কল না পান তাহলে 212-639-5014 নমবুরে কল করুন।

অস্বেতরূপচারের জনয়্ আপনাকে কখন হাসপাতালে আসতে হবে তা কমরী আপনাকে জানাবেন। আপনাকে কোথায় যেতে হবে সেটিও তারা স্মরণ করিয়ে দেবেন।

সমস্ত MSK অবস্থানে পাকিরং বিষয়ক তথয়্ এবং দিকনিদেয়না পেতে [www.msk.org/parking](http://www.msk.org/parking) ভিজিট করুন।

## লিম্ফ্যাটিক ময়্যাপিং (লসিকাতনেতরুর মানচিতরায়ন).

যদি আপনার সেনিটনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি করা হয়, তবে অস্বেতরূপচারের আগের দিন অথবা অস্বেতরূপচারের দিন সকালে আপনার লিম্ফ্যাটিক ময়্যাপিং পরকিরয়া করা হতে পারে। এটি আপনার সাজরুনকে অস্বেতরূপচারের সময় সেনিটনেল লিম্ফ নোড(গুলো) শনাক্ত করতে সাহাযয় করবে। আপনার যদি বেরস্ট সিড লোকালাইজেশনও করাতে হয়, তবে তা আপনার লিম্ফ্যাটিক ময়্যাপিংয়ের আগেই নিধরুরিত হতে পারে।

আপনার যদি লিম্ফ্যাটিক ময়্যাপিং করাতে হয়, তবে আপনার নাসরু আপনাকে আপনার লসিকা ময়্যাপিং পরকিরয়া সম্পকের

([www.mskcc.org/bn/cancer-care/patient-education/about-lymphatic-mapping-procedure](http://www.mskcc.org/bn/cancer-care/patient-education/about-lymphatic-mapping-procedure)) রিসোসরুটি দেবেন।

আপনার ময়্যাপিংয়ের একই দিনে যদি আপনার সাজরাঁরি হয়, তাহলে ময়্যাপিং শেষ হওয়ার পর একজন স্টাফ সদস্য আপনাকে অপারেটিং রুমে নিয়ে যাবেন। বেশিরভাগ অনয়্যানয়্য কেষ্টের, ময়্যাপিংয়ের পর আপনি বাড়ি চলে যাবেন।

#### 4% CHG দরব্ণের অয়্যান্টিসেপটিক তব্ক পরিষ্কারক, যেমন Hibiclens দিয়ে গোসল করুন

অসেত্ৰাপচারের আগের রাতে বিছানায় যাওয়ার আগে 4% CHG দরব্ণের অয়্যান্টিসেপটিক তব্ক পরিষ্কারক, যেমন Hibiclens দিয়ে গোসল করুন।

1. আপনার নিয়মিত শয়ম্পু এবং কন্ডিশনার দিয়ে আপনার চুল ধুয়ে ফেলুন। আপনার মাথা ভালো করে ধুয়ে ফেলুন।
2. আপনার নিয়মিত বয়ব্হাযর্ সাবান দিয়ে আপনার মুখ ও যৌনাঙ্গের (কুঁচকি) আশপাশ ধুয়ে নিন। গরম জল দিয়ে শরীর ভালো করে ধুয়ে ফেলুন।
3. 4% CHG দরব্ণের বোতলটি খুলুন। সামানয়্য পরিমাণ আপনার হাতে বা পরিষ্কার একটি ধোয়া কাপড়ে ঢালুন।
4. ঝরনা ধারা থেকে দূরে রাখুন। আপনার ঘাড় থেকে পা পযর্ন্ত আপনার দেহে 4% CHG দরব্ণটি আলতোভাবে ঘষুন। আপনার মুখে বা যৌনাঙ্গ এটি দেবেন না।
5. 4% CHG দরব্ণটি ধুয়ে ফেলতে পুনরায় ঝরনা ধারার নিচে যান। গরম জল বয়ব্হার করুন।
6. একটি পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে নিজেকে মুছে নিন।

গোসলের পর কোনো পর্কার লোশন, ক্রিম, ডিওডোরেন্ট, মেকআপ, পাউডার, পারফিউম বা কোলোন লাগাবেন না।

#### খাওয়া-দাওয়ার নিদের্শনা

গুরুত্বপূর্ণ: আপনি যদি ওজন কমানোর জন্য GLP-1 ওষুধ গ্রহণ করেন, তবে এই নির্দেশাবলী অনুসরণ করবেন না। পরিবর্তে [bXNrLW5vZGUtbGluazogMzE4MDM2]-এ থাকা নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।



আপনার অসেতরাপচার বা পরিক্রিয়ার আগের রাত ১২টায় খাবার খাওয়া বন্ধ করুন। এর মধ্যে শক্ত ক্যান্ডি এবং গামও অন্তর্ভুক্ত।

কখন খাওয়া বন্ধ করবেন, সে ব্যাপারে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা অন্তর্নির্দেশনা দিয়ে থাকতে পারে। এরকম হলে, তাদের নির্দেশনা মেনে চলুন। কিছু ব্যক্তিকে তাদের অসেতরাপচার বা পরিক্রিয়ার আগে দীর্ঘ সময় ধরে উপবাস (খাবার না খাওয়া) করতে হয়।

## আপনার অসেতরাপচারের দিন পান করার নির্দেশনা

গুরুত্বপূর্ণ: যদি আপনি একটি GLP-1 ওষুধ গ্রহণ করেন, তাহলে এই নির্দেশনাগুলি অনুসরণ করবেন না। পরিবর্তে [bXNrLW5vZGUtbGluazogMzE4MDM2]-এ থাকা নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

আপনার আগমনের 2 ঘণ্টা আগে এবং মধ্যরাতের মধ্যে শুধুমাত্র নিচের তালিকাভুক্ত তরল পান করুন। আর কোনো কিছু খাবেন না বা পান করবেন না। আপনার আগমনের 2 ঘণ্টা আগে পান করবেন না।

- জল।

- আপেলের সব্চ্ছ জুস, আঙুরের সব্চ্ছ জুস বা কর্য়ানবেরির সব্চ্ছ জুস।
- Gatorade বা Powerade।
- ব্ল্যাক্ কফি বা সাধারণ চা। চিনি দিলেও কোনো সমস্যা নেই। আর কিছু দেবেন না।
  - কোনো ধরনের দুধ বা কির্মার দেবেন না। এর মধ্যে উদ্ভিজ্জ দুধ এবং কির্মার অন্তভুক্ত।
  - সব্দযুক্ত কোনো সিরাপ যোগ করবেন না।

আপনার ডায়াবেটিস থাকলে, পানীয়তে আপনার চিনির পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত রাখুন। আপনি যদি এইসব পানীয়ের চিনি-ছাড়া, কম-চিনি বা কোনো চিনি নেই এমন উপাদানগুলো পান করেন তাহলে আপনার রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হবে।

অস্েত্রাপচার বা পর্কির্যার আগে শরীরে পয়রাপ্ত পানি বজায় রাখা উপকারী, তাই আপনি তৃণাতর্ হলে পানি পান করুন। পর্যোজনের চাইতে বেশি পান করবেন না। আপনার অস্েত্রাপচার বা পর্কির্যার সময় আপনাকে শিরায (আইভি) তরল দেওয়া হবে।



আপনার আগমনের 2 ঘণ্টা আগে পান করবেন না। পানিও এতে অন্তভুক্ত।

কখন পান করা বন্ধ করবেন, সে ব্যাপারে আপনার স্বাস্থ্যসেবা পর্দানকারীরা অনয্ নির্দেশনা দিয়ে থাকতে পারে। এরকম হলে, তাদের নির্দেশনা মেনে চলুন।

### নির্দেশনা অনুযায়ী ওষুধ খান

আপনার কেয়ার টিমের একজন সদস্য আপনাকে জানাবেন যে আপনার অস্েত্রাপচারের দিন সকালে কোন ওষুধগুলি খেতে হবে। শুধু এক চুমুক পানি

দিয়ে সেই ওষুধগুলি খান। আপনি সাধারণত কী কী ওষুধ খান তার উপর নির্ভর করে, এগুলি আপনার সকালের সাধারণ ওষুধগুলির সবকয়টি বা কয়েকটি হতে পারে বা তার কোনোটিই নাও হতে পারে।

#### 4% CHG দ্রবণের অ্যান্টিসেপটিক তব্ক পরিষ্কারক, যেমন Hibiclens দিয়ে গোসল করুন

হাসপাতাল ত্যাগ করার আগে 4% CHG দ্রবণের অ্যান্টিসেপটিক তব্ক পরিষ্কারক দিয়ে গোসল করুন। আগের রাতে যেভাবে ব্যবহার করেছিলেন ঠিক সেভাবে ব্যবহার করুন।

গোসলের পর কোনো প্রকার লোশন, ক্রিম, ডিওডোরেন্ট, মেকআপ, পাউডার, পারফিউম বা কোলোন লাগাবেন না।

#### যে জিনিসগুলি মনে রাখতে হবে

- আপনি যদি কন্ট্যাক্ট লেন্স পরেন তাহলে তার পরিবর্তে চশমা পরুন। অস্ত্রোপচারের সময় কন্ট্যাক্ট লেন্স পরা থাকলে তা আপনার চোখের ক্ষতি করতে পারে।
- কোনো ধাতব বস্তু পরবেন না। শরীরে ফুটো করে পরা গহনা সহ সকল গহনা খুলে ফেলুন। আপনার অস্ত্রোপচারের সময় ব্যবহৃত সরঞ্জামগুলি ধাতুর সংস্পর্শে এলে পুড়ে যেতে পারে।
- মূল্যবান জিনিস বাড়িতে রেখে আসুন।
- আপনার ঋতুসর্ব (আপনার মাসিক পিরিয়ড) হলে টয়াম্পনের পরিবর্তে স্যানিটারি প্যাড ব্যবহার করুন। পরয়োজন হলে আমরা আপনাকে ডিসপোজেবল অন্তর্বাস এবং একটি প্যাড প্রদান করব।

#### কী আনতে হবে

- একটি বোতাম-ডাউন বা টিলেঢালা টপ।
- আপনার সাজসজ্জার পরে স্কাটার্স ব্রা মতো সাপোর্টিভ ব্রা পরতে হবে।

- সিল্প অযাপনিয়ার জনয্ আপনার শবাস পরশবাসের যন্তর্ (যেমন CPAP মেশিন), যদি আপনার থাকে।
- আপনার সবাস্থয্ সেবার পরকিস্ ফরম এবং অনযানয্ অগির্ম নিদের্শাবলী, যদি আপনি সেগুলি পূরণ করে থাকেন।
- আপনার সেল ফোন এবং চাজরার।
- ছোটখাটো কেনাকাটার জনয্ সামানয্ টাকা যদি আপনি কিনতে চান, যেমন সংবাদপতর্।
- আপনার বয্কিত্গত জিনিসপতের্ জনয্ একটি কেস, যদি আপনার থাকে। চশমা, শর্বণ সহায়ক যন্তর্, ডেঞ্চারে, কৃতির্ম যন্তর্, পরচুলা এবং ধমরীয় আনুষাঙিক হলো বয্কিত্গত সামগরীর উদাহরণ।
- এই নিদের্শিকা। অসেত্ৰাপচারের পর কিভাবে নিজের যত্ন নিতে হয় তা শিখতে আপনি এটি বয্বহার করবেন।

## আপনার অসেত্ৰাপচারের জনয্ আপনি পৌঁছেলে

অনেক কমরী আপনাকে আপনার নাম এবং জন্ম তারিখ বলতে ও বানান করতে বলবেন। এটি আপনার নিরাপত্তার জনয্। একই বা অনুরূপ নামের মানুষের একই দিনে অসেত্ৰাপচার হতে পারে।

অসেত্ৰাপচারের জনয্ আপনার পোশাক পরিবতর্ন করার সময় হলে আমরা আপনাকে একটি হসপিটাল গাউন, রোব এবং পিছল-নিরোধী মোজা পর্দান করব।

## একজন নাসের্ সাথে দেখা করুন

অসেত্ৰাপচারের আগে আপনি একজন নাসের্ সাথে দেখা করবেন।

মধ্যরাতের (রাত 12টা) পরে আপনি কোনো ওষুধ সেবন করে থাকলে সেগুলোর ডোজ এবং কখন গ্রহণ করেছেন তা তাদেরকে বলুন। ওভার-দয্-কাউন্টার এবং পের্সকির্পশনের ওষুধ, পযাচ এবং কির্ম উল্লেখ করতে ভুলবেন না।

আপনার নাসর্ আপনার একটি শিরায় একটি ইন্টারভেনাস (IV) লাইন লাগাতে পারে যা সাধারণত আপনার বাহুতে বা হাতে। আপনার নাসর্ IV স্থাপন না করলে, আপনার অয়ানেসেথসিওলজিস্ট (A-nes-THEE-zee-AH-loh-jist) অপারেটিং রুমে এটি স্থাপন করবেন।

### একজন অয়ানেসেথসিওলজিস্টের সাথে দেখা করুন

এছাড়াও অস্বেতর্পচারের আগে আপনি একজন অয়ানেসেথসিওলজিস্টের সাথে দেখা করবেন। তারা যা করবেন:

- আপনার সাথে আপনার চিকিৎসার বিস্তারিত পয়রলোচনা করবেন।
- অতীতে অয়ানেসেথসিয়া নিয়ে আপনার কোনো সমস্যা হয়েছে কি না তা জানতে চাইবেন। এর মধ্যে বমি বমি ভাব (ভিতর থেকে কোনো কিছু উগরে দিচ্ছেন বলে মনে হওয়া) অথবা বস্থা অন্তভুক্ত।
- আপনার অস্বেতর্পচারের সময় আপনার আরাম এবং সুরক্ষা সম্পকের আপনার সাথে কথা বলবেন।
- আপনি যে ধরনের অয়ানেসেথসিয়া নেবেন তা সম্পকের আপনার সাথে কথা বলবেন।
- অয়ানেসেথসিয়া সম্পকিত আপনার পরশনের উত্তর দেবেন।

### আপনার অস্বেতর্পচারের স্থান চিহ্নিত করা

আপনার নাম ও জন্মতারিখ জিজ্ঞাসা করার পাশাপাশি, কমরীরা আপনার সাজরনের নাম কী, আপনি কোন অস্বেতর্পচার করাচ্ছেন এবং কোন পাশে অস্বেতর্পচার করা হবে তাও জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আপনার সাজরন বা আপনার সাজির্কয়াল দলের অন্য কোনো সদস্য একটি মাকরার ব্যবহার করে আপনার শরীরের সেই স্থানটি চিহ্নিত করবেন যেখানে অপারেশন করা হবে। এটি আপনার নিরাপত্তার জন্য। এটি নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে আপনার সাজির্কয়াল দলের সব সদস্য আপনার অস্বেতর্পচারের পরিকল্পনা সম্পকের জানেন।

## অস্বেতৰূপচাৰেৰ জনয্ পৰস্তুতি নিন

আপনাৰ অস্বেতৰূপচাৰেৰ সময় হলে, আপনি আপনাৰ চশমা, শৰ্বণ সহায়ক যন্তৰ্, ডেঞ্চার, কৃতিৰ্ম ডিভাইস, পৰচুলা এবং ধমৰীয় আনুষাঙিক খুলে রাখবেন।

অপারেটিং রুমে আপনি হেঁটে যাবেন অথবা কোনো কমরী সদস্য স্বেটৰ্চাৰে আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবেন। অপারেটিং রুম টিমের একজন সদস্য আপনাকে অপারেটিং বেডে উঠতে সাহায্য করবেন। তারা আপনাৰ পায়েৰ নিচের অংশে কম্পেশন বুট লাগাবে। এগুলি আপনাৰ পায়ে রক্ত সঞ্চালনে সহায়তা করার জন্য আলতোভাবে ফুলে উঠে ও চুপসে যায়।

আপনি সব্চ্ছন্দ্য্ বোধ করলে, আপনাৰ অযানেস্বেথসিওলজিস্ট আপনাকে আপনাৰ আইভি (IV) লাইনের মাধ্যমে অযানেস্বেথসিয়া দিবেন এবং আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন। এছাড়াও আপনাৰ অস্বেতৰূপচাৰেৰ সময় এবং পরে আপনাকে আইভি লাইনের মাধ্যমে তরল দেওয়া হবে।

## আপনাৰ অস্বেতৰূপচাৰেৰ সময়

আপনি যদি সেনিটনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি করান, আপনাৰ সাজৰ্ন আপনাৰ নিপলের নিচে বা টিউমাৰের কাছে অল্প পরিমাণ নীল রং ইনজেক্ট করবেন। এই রঞ্জক আপনাৰ লিম্ফ্যাটিক তরলের মাধ্যমে সেনিটনেল নোড(গুলো)তে পৌঁছাবে এবং সেগুলোকে নীল রঙে রঞ্জিত করবে। যদি আপনাৰ লিম্ফ্যাটিক ম্যাপিং করা হয়ে থাকে, তাহলে আপনাৰ সাজৰ্ন একটি ছোট যন্তৰ্ও ব্যবহার করবেন যা সেই পৰ্কিৰ্য্যার সময় ইনজেক্ট করা তরল থেকে নিগৰ্ত তেজস্কিয়তা পরিমাপ করে।

একবার তারা সেনিটনেল লিম্ফ নোড(গুলো) শনাক্ত করলে, আপনাৰ সাজৰ্ন একটি ছোট কাটা (ক্ৰত করা) দেবেন এবং সেগুলো অপসারণ করবেন। তারা আপনাৰ অস্বেতৰূপচাৰেৰ সময় ক্যান্সার কোষ আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য সেগুলো প্যাথলজি বিভাগে পাঠাতে পারে। যদি প্যাথলজিস্ট ক্যান্সার

কোষ দেখেন, তাহলে আপনার সাজর্ন আরও লিম্ফ নোড অপসারণ করতে পারেন। এটিকে অয়াক্সিলারি লিম্ফ নোড ডিসেকশন বলা হয়। আপনার সাজর্ন পরয়োজনে এটি আপনার সাথে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন।

কারণ আপনার সেনিটনেল লিম্ফ নোড বায়োপসির সময় নীল রং ব্যবহার করা হয়েছিল, আপনার অস্কেতর্যপচারের পর ১ থেকে ২ দিন পরবর্ত্ত আপনার তব্ক, পরস্ৰাব (পেশাব) এবং মল (পায়খানা) নীলচে-সবুজ হতে পারে।

আপনার সাজর্ন আপনার অস্কেতর্যপচার শেষ করার পর আপনার তব্কের নিচে সেলাই (সিট্চ) দিয়ে আপনার কাটা অংশ(গুলো) বন্ধ করবেন। তারা আপনার চিরার উপর Steri-Strips™ (পাতলা সাজির্কয়াল টেপের টুকরো) বা Dermabond® (সাজির্কয়াল আঠা)ও লাগাতে পারে। তারা আপনার কাটা স্থান(গুলো) একটি বয়ান্ডেজ দিয়ে ঢেকে দিতে পারে।

## আপনার অস্কেতর্যপচারের পরে

এই বিভাগটি আপনাকে আপনার অস্কেতর্যপচারের পরে কী হতে পারে তা জানতে সহায়তা করবে। হাসপাতাল ও বাড়ি উভয় জায়গা থেকে কিভাবে নিরাপদে সুস্থ হওয়া যায় আপনি তা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

আপনি এই বিভাগটি পড়ার সাথে সাথে আপনার সব্স্থয়সেবা পরদানকারীকে জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রশ্নাবলী লিখুন।

**পোস্ট-অয়ানেসেথসিয়া কেয়ার ইউনিট (PACU) বা আপনার রিকভারি রুমে**  
আপনি আপনার অস্কেতর্যপচারের পর জেগে উঠলে PACU বা আপনার রিকভারি রুমে থাকবেন। একজন নাসর্ আপনার তাপমাত্রা, নাড়ি, রক্তচাপ এবং অক্সিজেনের মাত্রা পরব্বেক্ষণ করতে থাকবেন। আপনার নাকের নিচে লাগানো একটি পাতলা নলের মাধ্যমে আপনি অক্সিজেন পাবেন।

## টিউব ও ডেরইন

আপনার যদি অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড ডিসেকশন হয়ে থাকে, তবে আপনার বগলের ক্ಷতের কাছে জ্যাকসন-পর্যাট (JP) ডের্ন নামক একটি নরম ক্যাথেটার (নমনীয় নল) স্থাপন করা হবে। এটি ঐ জায়গা থেকে অতিরিক্ত তরল বের করে দেবে এবং হাসপাতাল থেকে আপনাকে ছেড়ে দেওয়ার সময়ও এটি যথাস্থানে লাগানো থাকবে। বাড়িতে এটির সঠিক যত্ন নেওয়ার জন্য আপনার নাসর্ আপনাকে পরয়োজনীয় দিকনির্দেশনা দেবেন।

## আপনার বয়খা থেকে উপশম পাওয়া

আমরা আপনাকে পর্যায়শই আপনার বয়খা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব এবং পরয়োজন অনুযায়ী আপনাকে ওষুধ দিব। আমরা আপনাকে বাড়িতে নেওয়ার জন্য বয়খার ওষুধও দেব। সম্ভাব্য পাশবর্পতিক্রিয়ার বিষয়ে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে কথা বলুন। কখন ওভার-দয়-কাউন্টার বয়খানাশক ওষুধে সুইচ করা শুরু করতে হবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন।

## PACU বা আপনার রিকভারি রুম থেকে প্রস্থান

একবার আপনার জ্ঞান ফিরলে এবং বয়খা নিয়ন্ত্রণে এলে, আপনি আপনার দায়িত্বশীল যত্নকারীর সাথে বাড়ি যেতে পারবেন। হাসপাতাল ছাড়ার আগে, আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের একজনের সাথে আপনার অস্ত্রোপচারের কাটা স্থান(গুলো) দেখে নিন। সেগুলি দেখতে কেমন তা জানলে পরে যেকোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারবেন।

## বাড়িতে

বাড়িতে ও MSK-তে অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় আপনার পড়ে যাওয়া রোধ করতে যা করতে পারেন তা সম্পর্কে জানতে *What You Can Do to Avoid Falling* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/what-you-can-do-avoid-falling](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/what-you-can-do-avoid-falling)) পড়ুন।

## আপনার সুস্থ হওয়ার ট্র্যাকার পূরণ করা

হাসপাতাল ত্যাগ করার পর আপনি কেমন অনুভব করছেন তা আমরা জানতে

চাই। আপনার যত্ন নিতে আমাদের সাহায্য করতে, আপনার MSK MyChart অ্যাকাউন্টে আমরা কিছু প্রশ্ন পাঠাবো। আপনার ডিসচার্জ হওয়ার পর 10 দিনের জন্য আমরা প্রতিদিন সেগুলো পাঠাব। এই প্রশ্নাবলী আপনার সুস্থ হওয়ার ট্র্যাকার হিসাবে পরিচিত।

প্রতিদিন মধ্যরাতের আগে (রাত 12টা) আপনার সুস্থ হওয়ার ট্র্যাকারটি পূরণ করুন। এটি সম্পূর্ণ করতে মাত্র 2 থেকে 3 মিনিট সময় লাগে। এই প্রশ্নাবলীর আপনার উত্তর আমাদের বুঝতে সহায়তা করবে যে আপনি কেমন বোধ করছেন এবং আপনার কী প্রয়োজন।

আপনার উত্তরের উপর ভিত্তি করে, আমরা আরো তথ্যের জন্য আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারি। কখনো কখনো, আমরা আপনাকে আপনার সার্জনের অফিসে কল করতে বলতে পারি। আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনি সবসময় আপনার সার্জনের অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

আরো জানতে *Common Questions About MSK's Recovery Tracker* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/mymsk-recovery-tracker](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/mymsk-recovery-tracker)) পড়ুন।

### আপনার কাটা স্থান(গুলো)-এর যত্ন নেওয়া

প্রতিদিন আপনার ক্ত(গুলো) দেখুন। যেকোনো ধরনের লালচে ভাব বা তরল নিঃসরণ দেখা দিলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে কল করুন।

আপনার কাটা স্থান(গুলো) তব্কের নিচে সেলাই (সিউচার) দিয়ে বন্ধ করা থাকবে। এই সেলাইগুলো নিজে থেকেই গলে যায় এবং এগুলো অপসারণ করার প্রয়োজন হয় না।

আপনার অস্ত্রোপচারের কাটা স্থানে সেটরি-সিট্রপস বা ডাম্পবন্ড থাকলে, সেগুলি সাধারণত নিজে থেকেই আলাগা হয়ে পড়ে যাবে বা খোসা ছাড়িয়ে পড়বে। তা না হলে, ফলো-আপ অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় দেখা করার পর আপনার

সবাস্থ্যসেবা পরদানকারী নিজে এগুলো খুলে ফেলতে পারেন। 14 দিন পরেও না পড়ে থাকলে আপনি সেগুলি খুলে ফেলতে পারেন।

অস্বেত্ৰাপ্চারের এক বা দুই সপ্তাহ পরে, টিসুয়্ অপসারণ করা হয়েছে এমন আপনার বগল বা স্তনের তব্কের নিচে তরলের একটি পকেট তৈরি হতে পারে। এটিকে সেরোমা বলা হয়, এবং এটি ক্ষতিকর নয়। সেই স্থানটি নরম ও ফোলা মনে হতে পারে। এটি স্পশের্ বয্খাযুক্তও মনে হতে পারে।

সেরোমা সাধারণত নিজে থেকেই সেরে যায়। যদি আপনার বড় সেরোমা হয় বা অসব্স্থিত লাগে, তাহলে আপনার চিকিৎসক বা নাসের্ সাথে আলোচনা করতে আপনার সবাস্থ্যসেবা পরদানকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

### **আপনার স্তনে নতুন সেনসেশন (অনুভূতি)**

আপনি সুস্থ হয়ে ওঠার পরকির্য়ায়, আপনার স্তন বা বাহুতে কয়েকটি ভিন্ ধরনের অনুভূতি বা অসব্স্থিত অনুভব করতে পারেন। হালকা বয্খা, অবশ ভাব এবং কনকনানি এর কমন উদাহরণ।

এই অনুভূতিগুলো সাধারণত আসা-যাওয়া করে এবং অস্বেত্ৰাপ্চারের পর প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেয়্ পর্যই ভালো হয়ে যায়। কিছু অনুভূতি কয়েক মাস বা এমনকি ৫ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে থাকতে পারে। এর কারণ হলো স্নায়ু আপনার শরীরের সবচেয়ে ধীরে সেরে ওঠা অংশ। বেশিরভাগ মানুষ বলেন এই অনুভূতিগুলো তীবর্ বা কষ্টদায়ক নয়।

আপনি যখন সুস্থ হয়ে উঠতে থাকবেন, তখন আপনার অস্বেত্ৰাপ্চারের কাটা স্থান(গুলো) বরাবর দাগের টিসুয়্ অনুভব করতে পারেন। এটি শক্ মনে হবে। এটি সাধারণ ব্যাপার, এবং আগামী কয়েক মাসের মধ্যেয়্ এটি নরম হয়ে যাবে।

### **গোসল করা**

আপনার সাজরারির 24 ঘণ্টা পরে আপনি গোসল করতে পারেন। উষ্ণ পানি দিয়ে গোসল করে নিলে কিছুটা উপশম পেতে পারেন এবং তা অসব্স্থিত কমাতে

সাহায্য করতে পারে।

গোসল করার জন্য পরস্তুত হলে, আপনার বর্ষ এবং কাটা স্থান(গুলো)-এর উপর থাকা যেকোনো গজ পর্ষাড খুলে ফেলুন। আপনার কাটা স্থান(গুলো)-তে যদি Steri-Strips বা Dermabond থাকে, তাহলে সেগুলো খুলবেন না। সাবধানে সাবান ও পানি দিয়ে আপনার কাটা স্থান(গুলো) পরিষ্কার করুন এবং পানি সেগুলোর উপর দিয়ে বর্ষে যেতে দিন। পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে আসেত করে জাযগাগুলো শুকিয়ে নিন।

আপনার ক্ষত(গুলো) খোলা রাখা যেতে পারে, যদি না সেখান থেকে কোনো তরল নিঃসরণ হয়। আপনার যদি তরল নিঃসরণ হয়, তবে আপনার সব্স্থয্বেসা পরদানকারীকে কল করুন। যদি বেশি আরাম লাগে, তাহলে আপনার কাটা স্থান(গুলো)-এর উপর একটি পরিষ্কার গজ পর্ষাড রাখতে পারেন।

অসেতর্পচারের পর আপনার সব্স্থয্বেসা পরদানকারীর সাথে পর্থম অয্পয়েন্টমেন্টের আগে টবে গোসল করবেন না, সাঁতার কাটবেন না কিংবা হট টব বা সনা বয্বেহার করবেন না। এছাড়াও, আপনার অসেতর্পচারের স্থানের আশেপাশে ডিওডোরান্ট, লোশন, পাউডার বা পারফিউম বয্বেহার করার আগে আপনার সব্স্থয্বেসা পরদানকারীর সাথে কথা বলুন।

## আপনার বয্থা থেকে উপশম পাওয়া

বয্থা বা অসব্স্থিতর সময়কাল বয্কিতভেদে ভিন্ হয়।

বাড়িতে আপনার বয্থা উপশম করার বয্পারে এই নিদের্শাবলী অনুসরণ করুন।

- আপনাকে পরদান করা নিদের্শনা এবং পর্যোজন অনুযাযী ওষুধ সেবন করুন।
- পের্সকরাইব করা ওষুধ সেবনের পরেও যদি বয্থা না কমে, তাহলে আপনার

সবাস্থ্যসেবা পরদানকারীকে কল করুন।

- বয়্খা কমানোর জনয়্ পেরস্কির্পশনে উল্লেখ করা ওষুধ সেবনের সময় গাড়ি চালাবেন না বা মদ পান করবেন না। পেরস্কির্পশনের কিছু বয়্খার ওষুধ আপনাকে তন্দরাচ্ছন্ন করতে পারে (খুবই ঘুম পাওয়া)। অয়্যালকোহল তন্দরার পরভাবকে আরো তীবর্ করে তুলতে পারে।
- আপনার অসেতরাপচারের কাটা স্থান সেরে যাওয়ার সাথে সাথে আপনার বয়্খা কমতে থাকবে এবং বয়্খার জনয়্ কম ওষুধের পরয়োজন হবে। ওভার-দয়্-কাউন্টার বয়্খানাশক বয়্খা এবং অসব্িস্ত দূর করতে সাহাযয়্ করবে। অয়্যাসিটামিনোফেন (Tylenol®) এবং আইবুপেরাফেন (Advil বা Motrin) হলো ওভার-দয়্-কাউন্টার বয়্খানাশক ওষুধের উদাহরণ।
  - আপনার পেরস্কির্পশনের বয়্খার ওষুধ বন্ধ করার জনয়্ আপনার সবাস্থ্যসেবা পরদানকারীর নিদের্শাবলী অনুসরণ করুন।
  - যেকোনো ওষুধ খুব বেশি খাবেন না। আপনার হেলথেকেয়ার পেরাভাইডারের বা লেবেলে থাকা নিদের্শাবলী অনুসরণ করুন।
  - আপনি যে সকল ওষুধ খাচ্ছেন তার লেবেলগুলি পড়ুন। আপনি যদি অয়্যাসিটামিনোফেন গ্রহণ করেন তাহলে এটি খুবই গুরুতব্পূর্ণ। অয়্যাসিটামিনোফেন অনেক ওভার-দয়্-কাউন্টার এবং পেরস্কির্পশনে ওষুধের একটি উপাদান। অতয়্যধিক সেবন করলে আপনার লিভারের ক্য়তি হতে পারে। আপনার কেয়ার টিমের কোনো সদসেয়র্ সাথে কথা না বলে অয়্যাসিটামিনোফেনযুক্ত একাধিক ওষুধ খাবেন না।
- বয়্খার ওষুধ আপনাকে আপনার সব্ভাবিক কাজকমের্ ফিরে আসতে সাহাযয়্ করবে। আরামদায়কভাবে আপনার কাজকমর্ এবং বয়্যাম করার জনয়্ যথেষ্ট পরিমাণে গ্রহণ করুন। আপনি বেশি স্কিরয়্ হতে শুরু করলে আপনার হয়তো একটু বেশি বয়্খা হতে পারে।
- আপনি কখন বয়্খার ওষুধ সেবন করছেন, তার উপর নজর রাখুন। এটি

সেবন করার 30 থেকে 45 মিনিট পরে এটি কাজ করে। বয়্খা বেড়ে যাওয়ার জনয়্ অপেক্ষা করার চেয়ে বরং যখন বয়্খা শুরু হয়, তখনই ওষুধ সেবন করলে তা বেশি কাযরকর হয়।

কিছু পেরস্কির্পশন বয়্খার ওষুধ যেমন অপিওয়েড (opioid) এর কারণে কোষ্ঠকাঠিনয়্ হতে পারে। কোষ্ঠকাঠিনয়্ হলো সব্ভাবিকের তুলনায় কম ঘন ঘন মলতয়্গ করা, মলতয়্গ করার সময় কষ্ট হওয়া অথবা উভয়ই।

### কোষ্ঠকাঠিনয়্ পর্তিরোধ ও উপশম করা

কিভাবে আপনার কোষ্ঠকাঠিনয়্ পর্তিরোধ ও উপশম করবেন, সে বিষয়ে আপনার সব্স্থয়্সেবা পর্দ্দানকারীর সাথে কথা বলুন। আপনি এই নিদের্শনাবলী অনুসরণ করতে পারেন।

- পর্তিদিন একই সময়ে বাথরুমে যান। সেই সময় বাথরুম যাওয়ার সাথে আপনার শরীর অভয়্স্ত হয়ে উঠবে। তবে আপনি যদি বাথরুম যাওয়ার পর্য়োজন বোধ করেন, তাহলে তা চেপে রাখবেন না।
- খাবার খাওয়ার 5 থেকে 15 মিনিট পরে বাথরুম বয়্বহার করার চেষ্টা করুন। সকালের নাস্তা খাবার পর বাথরুম যাওয়া ভালো। এই সময়ে আপনার কোলোনের কাযরক্ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি শকিত্শালী থাকে।
- যদি পারেন, তাহলে ব্যায়াম করুন। হাঁটা একটি কাযরকর ব্যায়াম যা কোষ্ঠকাঠিনয়্ পর্তিরোধ ও উপশম করতে সাহাযয়্ করতে পারে।
- সম্ভব হলে পর্তিদিন 8 থেকে 10 (8-আউন্স) কাপ (2 লিটার) পানীয় পান করুন। পানি, জুস (যেমন আলুবোখারার জুস) সুয়্প এবং মিল্কশেক বেছে নিন। কয়্ফেইনযুক্ত পানীয়, যেমন কফি এবং সোডা কম পান করুন। কয়্ফেইন আপনার শরীর থেকে তরল বের করে দেয়।
- আপনার ডায়েটে ফাইবারের পরিমাণ ধীরে ধীরে, দিনপর্তি 25 থেকে 35 গ্রাম করে বাড়ান। খোসাযুক্ত ফল ও শাকসবজি গোটা শসয়্ এবং সিরিয়ালে ফাইবার (খাদয়্ আঁশ) থাকে। আপনার যদি ওস্টিমি থাকে বা সম্পর্তি

অন্তের অস্বাস্থ্যপচার হয়ে থাকে, তাহলে আপনার ডায়েটে কোনো পরিবর্তন করার আগে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে কথা বলুন।

- কোষ্ঠকাঠিন্য দূর করতে ওভার-দ্য-কাউন্টার এবং প্রেসক্রিপশনের ওষুধ উভয়ই ব্যবহার করা যেতে পারে। কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য যেকোনো ওষুধ খাওয়ার আগে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে কথা বলুন। আপনার যদি ওস্টিমি থাকে বা অন্তের অস্বাস্থ্যপচার হয়ে থাকে তাহলে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার হেলথকেয়ার প্রভাইডারের বা লেবেলে থাকা নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য ওভার-দ্য-কাউন্টার ওষুধের উদাহরণ হলো:

- ডকুসেট সোডিয়াম (Colace®)। এটি মল নরমকারক (এমন ওষুধ যা আপনার মল নরম করে) যার সামান্য কিছু পাশবর্ প্রতিক্রিয়া আছে। কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে আপনি এটি ব্যবহার করতে পারেন। এটি খনিজ তেলের সাথে সেবন করবেন না।
- পলিএথিলিন গ্লাইকল (MiraLAX®)। এটি একটি রেচক (এমন ওষুধ যা আপনার মলত্যাগে সাহায্য করে) যার সামান্য কিছু পাশবর্ প্রতিক্রিয়া আছে। এটি ৪ আউন্স (১ কাপ) লিকুইডের সাথে সেবন করুন। ইতোমধ্যে আপনার কোষ্ঠকাঠিন্য হলেই কেবল এটি গ্রহণ করুন।
- সেনা (Senokot®)। এটি একটি উত্তেজক রেচক, যার কারণে ক্র্যাম্পিং হতে পারে। বিছানায় যাওয়ার সময় এটি সেবন করা সবচেয়ে ভালো। ইতোমধ্যে আপনার কোষ্ঠকাঠিন্য হলেই কেবল এটি গ্রহণ করুন।

এই ওষুধগুলির যেকোনোটর কারণে ডায়রিয়া (ঘন ঘন তরল বা পানির মতো মলত্যাগ) হলে এগুলি গ্রহণ করা বন্ধ করুন। প্রয়োজন হলে আপনি পুনরায় শুরু করতে পারেন।

২ দিন ধরে মলত্যাগ না হলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে

যোগাযোগ করুন।

## শারীরিক কার্যকলাপ এবং ব্যায়াম

আপনি এখনই পর্য্য সব কাজকর্ম নতুন করে শুরু করতে পারেন, তবে আপনার দৈনন্দিন রুটিনে ফেরার সাথে সাথে নিজের গতি নিয়ন্ত্রণ করাটা সবচেয়ে ভালো। কঠোর পরিশ্রমের ব্যায়াম (যেমন- দৌড়ানো, জগিং বা ভারোত্তোলন) শুরুর আগে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে কথা বলুন।

## অস্ত্রোপচারের পর ব্যায়াম

আপনার যদি লাম্পেক্টমি, সেনিটনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি অথবা অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড ডিসেকশন করা হয়ে থাকে, তাহলে *Exercises After Your Lumpectomy or Axillary Lymph Node Procedure* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/exercises-after-your-axillary-lymph-node-dissection](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/exercises-after-your-axillary-lymph-node-dissection)) পড়ুন। এতে কিছু ব্যায়াম রয়েছে যা আপনার হাত ও কাঁধের স্বাভাবিক নড়াচড়া ফিরিয়ে আনতে সাহায্য করতে পারে।

## গাড়ি চালানো

ঘুমের ভাব তৈরি করতে পারে এমন পেরস্ক্রিপশনের কোনো ব্যথানাশক ওষুধ না খাওয়া সাপেক্ষে আপনি পুনরায় গাড়ি চালানো শুরু করতে পারেন। আপনার হাতের স্বাভাবিক নড়াচড়ার পূর্ণ সক্ষমতা থাকতে হবে এবং সবচ্ছন্দে সিটয়ারিং হুইল ঘোরাতে সক্ষম হতে হবে।

আপনি হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ার পর যাত্রী হিসেবে যেকোনো সময় গাড়িতে চড়তে পারবেন।

## লিম্ফডেমা সম্পর্কে

কখনও কখনও লিম্ফ নোড অপসারণ করলে আপনার লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমের সঠিকভাবে তরল নিষ্কাশন করা কঠিন হয়ে যেতে পারে। এটি হলে, যেখান থেকে লিম্ফ নোডগুলো অপসারণ করা হয়েছে সেই স্থানে লিম্ফ্যাটিক তরল জমে

যেতে পারে। এই অতিরিক্ত তরল জমার কারণে যে ফোলাভাব হয় তাকে লিম্ফেডেমা বলা হয়।

লিম্ফেডেমা আপনার আকরান্ত পাশে (যে পাশে লিম্ফ নোড অপসারণ করা হয়েছে) হাত, কনুই, স্তন বা দেহের অংশে হতে পারে।

বেশিরভাগ মানুষের লিম্ফেডিমা হয় না, তবে কিছু মানুষের হতে পারে। লিম্ফেডিমা হওয়ার ঝুঁকি একজন ব্যক্তির কেষ্টের কতটা, তা নিখরারণ করা কঠিন, কারণ:

- লিম্ফেডিমা নিগর্যের জনয় কোনো মানসম্মত পরীক্ষা নেই।
- লিম্ফ নোড অপসারণ বা ক্ষতিগরস্ত হওয়া মানুষের ওপর ভিন্নভাবে পরভাব ফেলে।
- লিম্ফেডিমা অসেতরূপচারের অল্প সময় পরও হতে পারে, আবার অনেক বছর পরেও হতে পারে।
- বতরমান লিম্ফেডিমার কিছু কেষ্টের পুরনো চিকিৎসা পদ্ধতির কারণে এটি হতে পারে।

লিম্ফেডিমা হওয়ার আপনার ঝুঁকি নিভর্র করে আপনার লিম্ফ নোডগুলো কীভাবে অপসারণ করা হয়েছে তার ওপর (চিতর 2 দেখুন)।


সেনিটনেল লিম্ফ নোড বাযোপসির সময়, আপনার বগল থেকে ১টি থেকে কয়েকটি লিম্ফ নোড অপসারণ করা হয় এবং কয়ান্সার কোষ আছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়। সেনিটনেল লিম্ফ নোড বাযোপসির পরে লিম্ফেডিমা হওয়ার ঝুঁকি কম। সেনিটনেল লিম্ফ নোড বাযোপসি করা পর্তি ১০০ জনের মধ্যে পরায় ০ থেকে ৭ জনের লিম্ফেডিমা হতে পারে।

অয়াক্সিলারি লিম্ফ নোড ডিসেকশনের সময়, আপনার বগল থেকে কয়েকটির বেশি লিম্ফ নোড অপসারণ করা হয়। এটি করা হয় এমন অতিরিক্ত লিম্ফ

নোড অপসারণের জন্য, যেগুলোতে ক্যান্সার কোষ থাকতে পারে।

অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড ডিসেকশনের পর লিম্ফডিমা হওয়ার ঝুঁকি সেনিটনেল নোড বায়োপসির তুলনায় বেশি। অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড ডিসেকশন করা পর্তি ১০০ জনের মধ্যে পর্য ১৫ থেকে ২৫ জনের লিম্ফডিমা হতে পারে।

কার লিম্ফডিমা হবে তা নিশ্চিতভাবে জানার কোনো উপায় নেই।



### লিম্ফডিমা হওয়ার ঝুঁকি কমানো

নিম্নলিখিত কাজগুলো করা লিম্ফডিমা হওয়ার ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করতে পারে:

- সবাস্থ্যকর শরীরের ওজন বজায় রাখুন অথবা নিরাপদভাবে তা অজরনের চেষ্টা করুন।
- নিয়মিত ব্যায়াম করুন এবং আপনার পেশিগুলো পরসারিত (স্ট্রেচ) করুন। আপনার জন্য কোন ব্যায়ামগুলো উপযুক্ত, তা নিয়ে আপনার সাজরন বা নাসেরর সঙ্গে কথা বলুন।
  - আপনি যখন আবার ব্যায়াম ও শারীরিক কাযরকলাপ শুরু করবেন, তখন ধীরে ধীরে ও পযর্যকরমে তা বাড়ান। আপনি যদি অসব্িস্ত অনুভব করেন, তাহলে থেমে যান এবং বিরতি নিন। ব্যায়াম ব্যথা সৃষ্টি করা উচিত নয়।
- আপনার হাত ও বাহুতে সংকরমণের ঝুঁকি যতটা সম্ভব কমানোর চেষ্টা করুন। কাটা, আঁচড় এবং পোড়ার যত্ন কীভাবে সবচেয়ে ভালোভাবে নেওয়া যায়, তা আপনার সবাস্থ্যসেবা পরদানকারীর কাছে জিজ্ঞাসা করুন।

চিত্র ২. লিম্ফডিমা হওয়ার আনুমানিক ঝুঁকি

আপনার যদি সেনিটনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি করা হয়ে থাকে:

- রক্ত নেওয়া, ইনজেকশন (শট), আইভি লাইন এবং রক্তচাপ মাপার জন্য আপনার আকরান্ত বাহু ব্যবহার করা ঠিক আছে। আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের অনুরোধ করুন, যদি সম্ভব হয় তবে তারা যেন আপনার অপ্রভাবিত বাহু ব্যবহার করার চেষ্টা করেন।
- আপনি যদি লিম্ফেডিমার কোনো লক্ষণ লক্ষ্য করতে শুরু করেন, তবে সবসময় আপনার অপ্রভাবিত বাহু ব্যবহার করুন। এটি যদি সম্ভব না হয়, তাহলে কোন বাহু ব্যবহার করা সবচেয়ে নিরাপদ হবে তা নিয়ে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে কথা বলুন।

আপনার যদি অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড ডিসেকশন করা হয়ে থাকে:

- আপনার পরিক্রিয়ার পর লিম্ফেডিমার ঝুঁকি কমানোর বিষয়ে জানতে *Hand and Arm Guidelines After Your Axillary Lymph Node Dissection* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/hand-and-arm-care-after-removal-axillary-lymph-nodes](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/hand-and-arm-care-after-removal-axillary-lymph-nodes)) পড়ুন।

## লিম্ফেডিমার লক্ষণ

অস্ত্রোপচারের পর সামান্য ফোলা স্বাভাবিক। ফোলাভাব সেরাচ্ছ ৬ সপ্তাহ পরে থাকতে পারে। এটি সাধারণত সাময়িক এবং ধীরে ধীরে সেরে যাবে। অস্ত্রোপচারের পর আপনি ব্যথা বা অনিয়মিত অনুভূতিও পেতে পারেন, যেমন হঠাৎ খোঁচা লাগার মতো অনুভূতি এবং ঝিনঝিন করা। এই অনুভূতিগুলো সাধারণ এবং এগুলো অবশ্যই লিম্ফেডিমার লক্ষণ নয়।

আপনি যদি লিম্ফেডিমা হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন, তাহলে আপনার আকরান্ত হাত, বাহু স্তন এবং শরীরের ধড়ে এই লক্ষণগুলোর দিকে নজর রাখুন:

- ভারী লাগা, ব্যথা বা ঘনত্বের অনুভব করা

- তব্কে টানটান ভাব অনুভব করা
- কম নমনীয়তা
- তব্কের পরিবর্তন, যেমন টানটান ভাব বা পিটিং (চাপ দিলে যে তব্কে দাগ পড়ে যায় এবং পরে সেই দাগ থেকে যায়)

আপনার যদি লিম্ফেডিমার কোনো লক্ষণ থাকে বা আপনি নিশ্চিত না হন, তাহলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ করুন।

লিম্ফেডিমা সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, আপনি নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথের রিসোসার্টিও পড়তে পারেন। [লিম্ফেডিমা বোঝা](#)।

## যৌন কার্যকলাপ

আপনি যখন নিজেকে পরস্তুত মনে করবেন, তখন যৌন কার্যকলাপ শুরু করতে পারেন। এটি আপনার অস্বস্তিচাপার স্থানে কোনো কষ্ট করবে না। অস্বস্তিচাপার পর প্রথম কয়েক সপ্তাহে অস্বস্তিচাপার স্থানে চাপ পড়া এড়িয়ে চলুন। অস্বস্তিচাপার স্থানের ওপর একটি ছোট বালিশ বা তোয়ালে রাখার চেষ্টা করুন। আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে, আপনার নার্সের সাথে কথা বলুন।

অস্বস্তিচাপার পর অল্প সময়ের মধ্যেই আপনার সঙ্গীকে আপনার কাটার স্থান(গুলো) দেখতে দেওয়া সহায়ক হতে পারে। এটি আপনাদের উভয়েরই যেকোনো উদ্বেগ কমাতে সহায়তা করতে পারে। আপনার সঙ্গী চিন্তিত হতে পারেন যে আপনার কাটা স্থান(গুলোতে) স্পর্শ করলে আপনার ব্যথা লাগতে পারে। তাদেরকে জানান কী আপনার জন্য আরামদায়ক এবং কী নয়।

ক্যান্সার এবং এর চিকিৎসা আপনার চেহারা বা যৌনতার ওপর কী প্রভাব ফেলতে পারে তা নিয়ে আপনার উদ্বেগ থাকতে পারে। আমাদের নারী যৌন চিকিৎসা ও নারীর স্বাস্থ্য কমরসুচি আপনাকে সাহায্য করার জন্য উপলব্ধ রয়েছে। আরও তথ্যের জন্য ৬৪৬-৮৮৮-৫০৭৬ নম্বরে কল করুন।

## ফলো-আপ অয্যাপয়েন্টমেন্ট

আপনার ফলো-আপ অয্যাপয়েন্টমেন্ট অস্বেতর্যাপচারের 1 থেকে 2 সপ্তাহ পরে হবে। আপনার সব্স্থয্বেবা পর্দানকারী এই অয্যাপয়েন্টমেন্টের সময় আপনার পয্যথোলজি সংকর্যন্ত ফলাফল নিয়ে আপনার সাথে আলোচনা করবেন।

## আপনার অনুভূতি নিয়ন্তরণ করুন

গুরুতর অসুস্থতার কারণে অস্বেতর্যাপচারের পরে আপনার নতুন এবং বিরকিতকর অনুভূতি হতে পারে। অনেকে জানিয়েছেন তারা কখনও না কখনও কান্না, দুঃখিত, চিন্তিত, নাভর্যস, বিরকিত বা রাগানিব্ত বোধ করেছিল। আপনি হয়তো বুঝতে পারবেন যে এই ধরনের কিছু অনুভূতি আপনি নিয়ন্তরণ করতে পারছেন না। এমনটি ঘটলে মানসিক সহায়তা খোঁজা একটি ভালো ধারণা। আপনার সব্স্থয্বেবা পর্দানকারী আপনাকে MSK-এর কাউন্সলিং সেন্টারে পাঠাতে পারেন। আপনি 646-888-0200 নমব্রে কল করে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

আপনি কেমন অনুভব করছেন সে সম্পকের্ কথা বলাই হলো মোকাবেলা করার পর্থম ধাপ। বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সদস্যরা সাহায্য করতে পারেন। আমরা আপনাকে আশব্স্ত করতে, সহায়তা করতে এবং নিদের্শনা পর্দান করতে পারি। আপনি, আপনার পরিবার এবং আপনার বন্ধুরা মানসিকভাবে কেমন অনুভব করছেন তা আমাদেরকে অবহিত করা সবসময়ই গুরুতব্পূর্ণ। আপনার এবং আপনার পরিবারের জনয্ অনেক রিসোসর্ রয়েছে। আমরা আপনাকে এবং আপনার পরিবার ও বন্ধুদের আপনার অসুস্থতার মানসিক দিকগুলি নিয়ন্তরণ করার জনয্ সহায়তা করতে এখানে এসেছি। আপনি হাসপাতালে বা বাড়িতে যেখনেই থাকুন না কেন আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারব।

## আপনার সব্স্থয্বেবা পর্দানকারীকে যখন ফোন করবেন

আপনার সব্স্থয্বেবা পর্দানকারীকে ফোন করুন, যদি:

- আপনার জ্বর 101° ফা. (38.3° সে.)-এর বেশি।
- আপনার শ্বাসকষ্ট হয়।
- আপনার অস্বেত্রপচারের কাটা স্থান(গুলোর) আশেপাশের ত্বক্ সর্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উষ্ণ হয়।
- স্থানটিতে আরও বেশি অসব্স্থিত হয়।
- আপনার অস্বেত্রপচারের কাটা স্থান(গুলোর) চারপাশটি আরও লাল হয়ে উঠছে।
- আপনার কাটার জায়গার আশেপাশের অংশে ফোলাভাব শুরু হচ্ছে।
- আপনার কাটার জায়গার আশেপাশের ফোলাভাব আরও বেড়ে যাচ্ছে।
- আপনার অস্বেত্রপচারের কাটা স্থান(গুলো) থেকে তরল নিগর্ন্ত হচ্ছে।

### যোগাযোগের তথ্য

আপনার কোনো প্রশ্ন বা উদ্বেগ থাকলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ করুন। আপনার সেবা প্রদানকারী দলের একজন সদস্য সোমবার থেকে শুক্রবার সকাল 9 টা থেকে বিকাল 5 টা পর্যন্ত উত্তর দেবেন। এই সময়ের বাইরে, আপনি একটি বাতর্ পাঠাতে পারেন বা অন্তর্ MSK প্রদানকারীর সাথে কথা বলতে পারেন। কলে সর্বা একজন ডাক্তার বা নাসর্কে পারেন।

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে কীভাবে যোগাযোগ করবেন তা আপনি নিশ্চিত না হলে, 212-639-2000 নম্বরে কল করুন।

### সহায়তামূলক পরিষেবা

এই বিভাগে সহায়তামূলক পরিষেবাসমূহের একটি তালিকা রয়েছে। আপনি যখন আপনার অস্বেত্রপচারের জন্য প্রস্তুত হন এবং আপনার অস্বেত্রপচারের পরে দ্রুত সুস্থ করেন তখন তারা আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

আপনি এই বিভাগটি পড়ার সাথে সাথে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রশ্নাবলী লিখুন।

### MSK সহায়তামূলক পরিষেবা

ভতির্ সংকরান্ত অফিস

212-639-7606

আপনার হাসপাতালে ভতির্ সম্পর্কে আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, যেমন একটি ব্যক্তিগত কক্ষ চাইলে কল করুন।

### অয়ানেসেথসিয়া

212-639-6840

অয়ানেসেথসিয়া সম্পর্কিত আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে কল করুন।

### ব্লাড ডোনার রুম

212-639-7643

আপনি যদি রক্ত বা প্লেটলেট দান করতে আগরহী হন তাহলে তথ্যের জন্য কল করুন।

### Bobst International Center

[www.msk.org/international](http://www.msk.org/international)

888-675-7722

আমরা বিশেষর সকল দেশের রোগীদের স্বাগত জানাই এবং বিভিন্ন রকমের সেবাদান করে থাকি। আপনি যদি একজন আন্তর্জাতিক রোগী হন তাহলে আপনার পরিচরার ব্যবস্থা করতে সহায়তার জন্য কল করুন।

### কাউন্সেলিং সেন্টার

[www.msk.org/counseling](http://www.msk.org/counseling)

646-888-0200

অনেকে কাউন্সেলিং সাভির্সটিকে সহায়ক বলে মনে করেন। আমাদের কাউন্সেলিং সেন্টার ব্যক্তিগত, দম্পতি, পরিবার এবং গোষ্ঠীর জন্য

কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান করে। আপনি যদি উদ্ভিগ্ন বা বিষণ্ণতা বোধ করেন তাহলে আমরা সাহায্য করার জন্য ওষুধও লিখে দিতে পারি।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে, আপনার কেয়ার টিমের একজন সদস্যকে রেফারেলের জন্য বলুন বা উপরের নম্বরে কল করুন।

### ফুড প্যানিটর পের্গারাম

646-888-8055

ক্যান্সারের চিকিৎসার সময় আমরা অভাবী ব্যক্তিদের খাবার দিই। আরো জানতে আপনার কেয়ার টিমের একজন সদস্যদের সাথে কথা বলুন বা উপরের নম্বরে কল করুন।

### ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন ও ওয়েলনেস সাভির্স

[www.msk.org/integrativemedicine](http://www.msk.org/integrativemedicine)

আমাদের ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন ও ওয়েলনেস সাভির্স ঐতিহ্যগত চিকিৎসাগত পরিচরার পরিপূরক (এর মতো) অনেক পরিষেবা অফার করে। উদাহরণস্বরূপ, মিউজিক থেরাপি, মাইন্ড/বডি থেরাপি, ড্যান্স অ্যান্ড মুভমেন্ট থেরাপি, যোগব্যায়াম এবং টাচ থেরাপি। এই পরিষেবাগুলোর জন্য একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে, 646-449-1010 নম্বরে কল করুন।

এছাড়াও আপনি ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন ও ওয়েলনেস সাভির্সে একজন স্বাস্থ্য সেবাদানকারীর সাথে পরামর্শের সময়সূচীও নিধারণ করতে পারেন। তারা একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারা গঠন এবং পাশব্র্পতিকির্য়া নিয়ন্তরণ করার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরিতে আপনার সাথে কাজ করবেন। পরামর্শের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিধারণ করতে 646-608-8550 নম্বরে কল করুন।

### MSK লাইব্রেরি

[library.mskcc.org](http://library.mskcc.org)

আপনি আমাদের লাইব্রেরির ওয়েবসাইটে ঘুরে আসতে পারেন বা লাইব্রেরির

রেফারেন্স কমরীদের সাথে কথা বলতে ইমেইল করতে

পারেন [asklibrarian@mskcc.org](mailto:asklibrarian@mskcc.org) ঠিকানায়। তারা আপনাকে এক ধরনের ক্যান্সার সম্পর্কে আরো তথ্য খুঁজে পেতে সহায়তা করতে পারেন। আপনি লাইব্রেরির [রোগী শিক্ষা রিসোসর্গাইড](#)ও দেখতে পারেন।

### পুষ্টি বিষয়ক পরিষেবা

[www.msk.org/nutrition](http://www.msk.org/nutrition)

212-639-7312

আমাদের পুষ্টি বিষয়ক পরিষেবা আমাদের ক্লিনিকাল ডায়েটিশিয়ান পুষ্টিবিদদের মধ্যে একজনের সাথে পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করে। আপনার ক্লিনিকাল ডায়েটিশিয়ান পুষ্টিবিদ আপনার খাদ্যাভাস সম্পর্কে আপনার সাথে কথা বলবেন। চিকিৎসার সময় ও পরে কী খাওয়া উচিত সে বিষয়েও তিনি পরামর্শ দিতে পারেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে, আপনার কেয়ার টিমের একজন সদস্যকে রেফারেলের জন্য বলুন বা উপরের নম্বরে কল করুন।

### রোগী ও কমিউনিটির শিক্ষা

[www.msk.org/pe](http://www.msk.org/pe)

শিক্ষামূলক তথ্যসূত্র, ভিডিও এবং অনলাইন পেরাগ্রাম অনুসন্ধান করতে আমাদের রোগী ও কমিউনিটির শিক্ষা সম্পর্কিত ওয়েবসাইটটি দেখুন।

### রোগীর বিল

646-227-3378

আপনার বিমা কোম্পানির সাথে প্রাক-অনুমোদন সম্পর্কে আপনার প্রশ্ন থাকলে কল করুন। একে প্রাক-অনুমোদনও বলা হয়।

### রোগীর প্রতিনিধি অফিস

212-639-7202

হেলথ কেয়ার প্রক্সি ফর্ম বা আপনার পরিচর্যা সম্পর্কে উদ্বেগ বিষয়ক আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কল করুন।

পেরিঅপারেটিভ নাসর্ লিয়াজেঁ

212-639-5935

আপনার অস্বেতর্পচারের সময় MSK কোনো তথ্য পর্কাশ করার বিষয়ে  
আপনার পর্শ্ন থাকলে কল করুন।

বয্কিত্গত কতর্বয্রত নাসর্ ও সহচর

646-357-9272

আপনি হাসপাতালে ও বাড়িতে আপনার পরিচযরার জনয্ বয্কিত্গত নাসর্ বা  
সহচরদের অনুরোধ করতে পারেন। আরো জানতে কল করুন।

পুনবর্াসন পরিষেবা

[www.msk.org/rehabilitation](http://www.msk.org/rehabilitation)

কযান্সার ও কযান্সারের চিকিৎসা আপনার শরীরকে দুবর্ল, শক্ত বা টান  
অনুভব করতে পারে। কিছু লিম্ফডেমা (ফোলাভাব) হতে পারে। আমাদের  
ফিজিওথেরাপিস্ট (পুনবর্াসন মেডিসিন ডাক্তার), পেশাগত থেরাপিস্ট (OT)  
এবং ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট (PT) আপনাকে আপনার সব্ভাবিক কাজকমের্  
ফিরে যেতে সহায়তা করতে পারেন।

- পুনবর্াসন মেডিসিন ডাক্তাররা এমন সমসয্া নিগর্য় করে এবং চিকিৎসা  
করে যা আপনার চলাফেরা ও কাযর্কলাপকে পর্ভাবিত করে। তারা MSK-  
কে বা বাড়ির কাছাকাছি কোথাও আপনার পুনবর্াসন থেরাপি পের্গর্ামটি  
ডিজাইন এবং সমনব্য় করতে সহায়তা করতে পারেন। আরো জানতে, 646-  
888-1929 নমব্রে পুনবর্াসন মেডিসিন (ফিজিয়য্টির্)-এ কল করুন।
- আপনার সব্ভাবিক দৈনন্দিন কাজকমর্ করতে সমসয্া হলে একজন OT  
সাহাযয্ করতে পারেন। উদাহরণসব্ৰূপ, তিনি দৈনন্দিন কাজ সহজ করতে  
সহায়তা করার জনয্ সরঞ্জামের পরামশর্ দিতে পারেন। একজন PT  
আপনাকে শকিত্ ও নমনীয়তা তৈরি করতে বয্য্যাম শেখাতে পারেন। আরো  
জানতে, 646-888-1900 নমব্রে পুনবর্াসন থেরাপি-তে কল করুন।

ক্যান্সারের পরে জীবনের জনস্ব-রিসোসর্(RLAC) পেরাগরাম

646-888-8106

MSK-এ, আপনার চিকিৎসার পর পরিচর্যা শেষ হয় না। যেসব রোগীরা এবং তাদের পরিবার চিকিৎসা শেষ করেছেন **RLAC পেরাগরাম** তাদের জনস্ব।

এই পেরাগরামের অনেক পরিষেবা রয়েছে। আমরা সেমিনার, কমরশালা, সহায়তা গ্রুপ এবং চিকিৎসার পরে জীবন সম্পর্কে পরামর্শ পর্দান করি। আমরা বিমা ও কমরসংস্থানের বিষয়েও সহায়তা করতে পারি।

### যৌন স্বাস্থ্য পেরাগরাম

ক্যান্সার ও ক্যান্সারের চিকিৎসা আপনার যৌন স্বাস্থ্য, পর্জনন ক্ষমতা বা উভয়কেই পর্ভাবিত করতে পারে। MSK-কে এর যৌন স্বাস্থ্য পেরাগরাম আপনার চিকিৎসার আগে, চিকিৎসা চলাকালীন বা পরে আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

- আমাদের **ফিমেল সেক্সুয়াল মেডিসিন অ্যান্ড উইমেনস হেলথ পেরাগরাম** যৌন স্বাস্থ্য সমস্যা যেমন অকাল মেনোপজ বা পর্জনন ক্ষমতার সমস্যায় সাহায্য করতে পারে। আপনার MSK কেয়ার টিমের একজন সদস্যকে রেফারেলের জনস্ব বলুন বা আরো জানতে 646-888-5076 নম্বরে কল করুন।
- আমাদের **মেল সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপেরডাক্টিভ মেডিসিন পেরাগরাম** যৌন স্বাস্থ্য সমস্যা, যেমন ইরেক্টাইল ডিসফাংশন (ED) এ সহায়তা করতে পারে। আপনার কেয়ার টিমের একজন সদস্যকে রেফারেলের জনস্ব বলুন বা আরো জানতে 646-888-6024 নম্বরে কল করুন।

### সমাজ কমরী

[www.msk.org/socialwork](http://www.msk.org/socialwork)

212-639-7020

সমাজকমরীরা রোগী, পরিবার ও বন্ধুদের ক্যান্সারে আকরান্ত বয্কিতদের

জনস্ সাধারণ সমস্যা মোকাবেলায় সহায়তা করেন। তারা আপনার চিকিৎসা জুড়ে পৃথক পরামশর্ ও সহায়তা গোষ্ঠী পরদান করেন। তারা আপনাকে শিশু ও পরিবারের অনযানস্ সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করতে সহায়তা করতে পারেন।

আমাদের সামজকমরীরা আপনাকে কমিউনিটি এজেনিস্ ও পের্গরামগুলোতে রেফার করতে সহায়তা করতে পারেন। যদি আপনার বিল পরিশোধ করতে সমস্যা হয়, তাদের কাছে আথির্ক রিসোসর্ সম্পকের্ও তথস্ রয়েছে। আরো জানতে উপরের নমব্রে কল করুন।

### আধ্যাত্মিক পরিচযর্

212-639-5982

আমাদের চ্যাপলিনরা (আধ্যাত্মিক পরামশর্দাতারা) শুনতে, পরিবারের সদস্যদের সহায়তা করতে এবং পরাথর্না করার জনস্ রয়েছে। তারা কমিউনিটির পাদর্ী বা বিশবাসী গোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, বা কেবল একজন সান্তবন্দায়ক সহচর এবং আধ্যাত্মিক উপসিথতি হতে পারেন। যেকেউ **আধ্যাত্মিক পরিচযর্** চাইতে পারেন। আপনার কোনো ধমরীয় সম্প্কৃততা (কোনো ধমের্ সাথে সংযোগ) থাকতে হবে না।

MSK-এর আন্তঃধমরীয় চ্যাপেল মেমোরিয়াল হাসপাতালের পর্ধান লবির কাছে অবসিথত। এটি দিনে 24 ঘণ্টা খোলা থাকে। আপনার যদি জরুরি অবস্থা থাকে তাহলে 212-639-2000 নমব্রে কল করুন। কলে চ্যাপলিনকে চান।

### টোবাকো টিরটমেন্ট পের্গরাম

[www.msk.org/tobacco](http://www.msk.org/tobacco)

212-610-0507

আপনি যদি ধূমপান তয্গ করতে চান, MSK এর বিশেষজ্ঞ আছেন যারা সাহাযস্ করতে পারেন। আরো জানতে কল করুন।

### ভাচুর্যাল পের্গরাম

[www.msk.org/vp](http://www.msk.org/vp)

আমরা রোগী ও পরিচর্যাকারীদের জন্য অনলাইনে শিক্ষা ও সহায়তা প্রদান করি। এগুলো লাইভ সেশন যেখানে আপনি কথা বলতে বা কেবল শুনতে পারেন। আপনি আপনার রোগ নিয়ন্ত্রণ, চিকিৎসার সময় কী আশা করবেন এবং কিভাবে আপনার ক্যান্সারের পরিচর্যার জন্য পরিসংখ্যান নেবেন তা সম্পর্কে শিখতে পারেন।

সেশনগুলো বয়স্কিতগত, বিনামূল্যে এবং বিশেষজ্ঞ কতৃক পরিচালিত হয়। ভার্চুয়াল পেরাগরাম সম্পর্কে জানতে বা নিবন্ধন করতে আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন।

### বাহ্যিক সহায়তামূলক পরিষেবা

অ্যাক্সেস-এ-রাইড

[web.mta.info/nyct/paratran/guide.htm](http://web.mta.info/nyct/paratran/guide.htm)

877-337-2017

নিউ ইয়র্ক সিটিতে, প্রতিবন্ধী বয়স্কিত যারা পাবলিক বাস বা সাবওয়েতে যেতে পারেন না তাদের জন্য MTA শেয়ার করা রাইড, ডোর-টু-ডোর পরিষেবা প্রদান করে।

### এয়ার চ্যারিটি নেটওয়ার্ক

[www.aircharitynetwork.org](http://www.aircharitynetwork.org)

877-621-7177

চিকিৎসা কেন্দ্র যাতায়াতের ব্যবস্থা করে।

### আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি (ACS)

[www.cancer.org](http://www.cancer.org)

800-ACS-2345 (800-227-2345)

ক্যান্সারের চিকিৎসার সময় রোগী ও শুরুর প্রদানকারীদের থাকার জন্য বিনামূল্যে জায়গা হোপ লজ সহ বিভিন্ন তথ্য ও পরিষেবা প্রদান করে।

### ক্যান্সার ও ক্যারিয়ার

[www.cancerandcareers.org](http://www.cancerandcareers.org)

646-929-8032

ক্যান্সারে আকরান্ত কমরীদের জনষ্ শিক্ষা, সরঞ্জাম এবং ইভেন্টের জনষ্ একটি রিসোসর্।

ক্যান্সারকেয়ার

[www.cancercare.org](http://www.cancercare.org)

800-813-4673

275 সেভেনথ অ্যাভিনিউ (ওয়েস্ট 25তম ও 26তম স্ট্রটের মধ্যে)

নিউ ইয়র্ক, NY 10001

কাউন্সেলিং, সাপোর্ট গ্রুপ, শিক্ষামূলক কমর্শালা, পর্কাশনা এবং আথির্ক সহায়তা পর্দান করে।

ক্যান্সার সাপোর্ট কমিউনিটি

[www.cancersupportcommunity.org](http://www.cancersupportcommunity.org)

ক্যান্সারে আকরান্ত বষ্কিতদের সহায়তা ও শিক্ষা পর্দান করে।

কেয়ারগিভার অ্যাকশন নেটওয়ার্ক

[www.caregiveraction.org](http://www.caregiveraction.org)

800-896-3650

দীঘর্স্থায়ী অসুস্থতা বা অক্ক্ষমতায়ুক্ত পির্য়জনদের পরিচযর্ করা লোকদের জনষ্ শিক্ষা ও সহায়তা পর্দান করে।

কপেরারেট অ্যাঞ্জেল নেটওয়ার্ক

[www.corpangelnetwork.org](http://www.corpangelnetwork.org)

866-328-1313

কপেরারেট জেটগুলোতে খালি আসন বয্বহার করে সারা দেশে চিকিৎসার জনষ্ বিনামূলেষ্ ভর্মণের সুযোগ পর্দান করে।

গুড ডেস

[www.mygooddays.org](http://www.mygooddays.org)

877-968-7233

চিকিৎসার সময় কোপেমেন্ট পরদানের জনস্ আথির্ক সহায়তা পরদান করে।  
রোগীদের অবশস্ই চিকিৎসা বিমা থাকতে হবে, আয়ের মানদণ্ড পূরণ করতে  
হবে এবং গুড ডেজ ফমুর্লারির অংশ হিসাবে ওষুধ নিধর্রণ করতে হবে।

হেলথওয়েল ফাউন্ডেশন

[www.healthwellfoundation.org](http://www.healthwellfoundation.org)

800-675-8416

নিদির্ষ্ট ওষুধ ও থেরাপির জনস্ কোপেমেন্ট, সবস্থস্বেবা পির্মিয়াম এবং  
কতর্নযোগস্ আওতাধীন করার জনস্ আথির্ক সহায়তা পরদান করে।

জো'স হাউস

[www.joeshouse.org](http://www.joeshouse.org)

877-563-7468

কযান্সারে আকর্রন্ত বস্কিত ও তাদের পরিবারের জনস্ চিকিৎসা কেনেদর্র  
কাছাকাছি থাকার জায়গার একটি তালিকা পরদান করে।

LGBT কযান্সার পর্জেক্ট

[www.lgbtcancer.com](http://www.lgbtcancer.com)

অনলাইন সহায়তা গোষ্ঠী এবং LGBT-বান্ধব কিল্লিকাল টর্র্যালের একটি  
ডাটাবেস সহ LGBT কমিউনিটির জনস্ সহায়তা এবং সমথর্রন পরদান করে।

লাইভস্টর্রং ফাটির্লিটি

[www.livestrong.org/fertility](http://www.livestrong.org/fertility)

855-744-7777

কযান্সারে আকর্রন্ত রোগী এবং বেঁচে থাকা বস্কিতদের পর্জনন তথস্ এবং  
সহায়তা পরদান করে যাদের মেডিকেল চিকিৎসা বন্ধ্যাতেব্র সাথে সম্পকিত

ঝুঁকি রয়েছে।

লুক গুড ফিল বেটার পেরাগরাম

[www.lookgoodfeelbetter.org](http://www.lookgoodfeelbetter.org)

800-395-LOOK (800-395-5665)

এই পেরাগরামটি আপনার চেহারা সম্পর্কে আরো ভালো বোধ করতে সহায়তা করার জন্য আপনি যা করতে পারেন তা শিখতে কমরশালা পরদান করে। আরো তথ্যের জন্য বা কোনো কমরশালার জন্য সাইন আপ করতে, উপরের নম্বরে কল করুন বা পেরাগরামের ওয়েবসাইটে যান।

ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট

[www.cancer.gov](http://www.cancer.gov)

800-4-CANCER (800-422-6237)

ন্যাশনাল কাউন্সিল অন এজিং (NCOA)

[www.benefitscheckup.org](http://www.benefitscheckup.org)

বয়স্কদের জন্য তথ্য ও সহায়ক সম্পদ পরদান করে। BenefitsCheckUp® নামের একটি বিনামূল্যের অনলাইন টুল পরদান করে, যা আপনাকে পেরস্ক্রিপশন সহায়তা কমরসূচির সঙ্গে যুক্ত করে, যার মধ্যে মেডিকেশ্যারের Extra Help পেরাগরামও অন্তর্ভুক্ত।

ন্যাশনাল LGBT ক্যান্সার নেটওয়ার্ক

[www.cancer-network.org](http://www.cancer-network.org)

LGBT ক্যান্সার থেকে বেঁচে যাওয়া ও যারা ঝুঁকিতে রয়েছে তাদের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সহায়তা পরদান করে।

নিডি মেডস

[www.needymeds.org](http://www.needymeds.org)

বর্যান্ড ও জেনেরিক নামের ওষুধের জন্য রোগীর সহায়তা পেরাগরামের তালিকাভুক্ত করে।

NYRx

[www.health.ny.gov/health\\_care/medicaid/program/pharmacy.htm](http://www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/pharmacy.htm)

নিউ ইয়র্ক স্টেটে সরকারি খাতের নিয়োগকর্তাদের যোগ্য কর্মচারী ও অবসরপরাপ্তদের পেরস্কির্পশন সুবিধা প্রদান করে।

পেশেন্ট অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক (PAN) ফাউন্ডেশন

[www.panfoundation.org](http://www.panfoundation.org)

866-316-7263

বিমা রয়েছে এমন রোগীদের জন্য কোপেমেন্ট সহায়তা দেয়।

পেশেন্ট অ্যাডভোকেট ফাউন্ডেশন

[www.patientadvocate.org](http://www.patientadvocate.org)

800-532-5274

পরিচর্যা, আর্থিক সহায়তা, বিমা সহায়তা, চাকরি ধরে রাখার সহায়তা এবং জাতীয় অপঘরাপ্ত বিমা কভার থাকা রিসোসর্ ডিরেক্টরিতে অ্যাক্সেস প্রদান করে।

রেড ডোর কমিউনিটি (সাধারণত গিল্ডা'স ক্লাব নামে পরিচিত)

[www.reddoorcommunity.org](http://www.reddoorcommunity.org)

212-647-9700

এমন একটি জায়গা যেখানে ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যক্তিরা নেটওয়ার্কিং, কর্মশালা, বক্তৃতা এবং সামাজিক কার্যক্রমের মাধ্যমে সামাজিক ও মানসিক সহায়তা পান।

RxHope

[www.rxhope.com](http://www.rxhope.com)

877-267-0517

যে সকল মানুষ ওষুধ কিনতে আর্থিক সঙ্কটে পড়ে তাদের আর্থিক সহায়তা

পরদান করে।

ট্রিয়াজ ক্যান্সার

[www.triagecancer.org](http://www.triagecancer.org)

ক্যান্সার রোগীদের এবং তাদের পরিচর্যাকারীদের জন্য আইনি, চিকিৎসা এবং আর্থিক তথ্য এবং রিসোসর্ পরদান করে।

## শিক্ষামূলক তথ্যসূত্র

এই নির্দেশিকায় উল্লেখিত শিক্ষামূলক তথ্যসূত্রের তালিকা এই বিভাগটি করে। এগুলো আপনার অস্বেত্রাপচারের জন্য পরিস্তুত হওয়া এবং আপনার অস্বেত্রাপচারের পরে দ্রুত সুস্থ হওয়ার জন্য আপনাকে সহায়তা করবে।

আপনি এই তথ্যসূত্র পড়ার সাথে সাথে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রশ্নাবলী লিখুন।

- *A Guide for Caregivers* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/guide-caregivers](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/guide-caregivers))
- আপনার লসিকা ম্যাপিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে  
([www.mskcc.org/bn/cancer-care/patient-education/about-lymphatic-mapping-procedure](http://www.mskcc.org/bn/cancer-care/patient-education/about-lymphatic-mapping-procedure))
- *Advance Care Planning for People With Cancer and Their Loved Ones* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/advance-care-planning](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/advance-care-planning))
- *Clear Liquid Diet* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/clear-liquid-diet](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/clear-liquid-diet))
- *Common Questions About MSK's Recovery Tracker*  
([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/mymsk-recovery-tracker](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/mymsk-recovery-tracker))

- *Eating and Drinking Before Your Surgery or Procedure When Taking GLP-1 Medicines* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/eating-and-drinking-before-your-surgery-or-procedure-when-taking-glp-1-medicines](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/eating-and-drinking-before-your-surgery-or-procedure-when-taking-glp-1-medicines))
- *Exercises After Your Lumpectomy or Axillary Lymph Node Procedure* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/exercises-after-your-axillary-lymph-node-dissection](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/exercises-after-your-axillary-lymph-node-dissection))
- *Fertility Preservation Before Cancer Treatment: Options for People Born with Ovaries and a Uterus* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/fertility-preservation-females-starting-treatment](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/fertility-preservation-females-starting-treatment))
- *Hand and Arm Guidelines After Your Axillary Lymph Node Dissection* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/hand-and-arm-care-after-removal-axillary-lymph-nodes](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/hand-and-arm-care-after-removal-axillary-lymph-nodes))
- *Herbal Remedies and Cancer Treatment* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/herbal-remedies-and-treatment](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/herbal-remedies-and-treatment))
- *How to Be a Health Care Agent* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-be-health-care-agent](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-be-health-care-agent))
- *How To Check if a Medicine or Supplement Has Aspirin, Other NSAIDs, Vitamin E, or Fish Oil* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids))

- লিমেফডিমা বোঝা
- *What You Can Do to Avoid Falling* ([www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/what-you-can-do-avoid-falling](http://www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/what-you-can-do-avoid-falling))

আপনার কোনো প্রশ্ন বা উদ্বেগ থাকলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ করুন। আপনার পরিচর্যা দলের একজন সদস্য সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত উত্তর দেবেন সকাল 9:00 টা থেকে বিকেল 5:00 টার পর এই সময়ের বাইরে, আপনি একটি বাতর রেখে যেতে পারেন বা অন্য একজন MSK প্রদানকারীর সাথে কথা বলতে পারেন। কলে সবার্দা একজন ডাক্তার বা নাসরকে পাবেন। আপনি যদি আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করবেন তা নিশ্চিত না হন, তাহলে ফোন করুন। ২১২-৬৩৯-২০০০.

আরো রিসোর্সের জন্য [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe)-এ ভিজিট করে আমাদের ভাচুয়াল লাইব্রেরি দেখুন।

---

About Your Lumpectomy and Axillary Surgery - Last updated on May 2, 2026

Memorial Sloan Kettering Cancer Center কতর্ক সবার্সব্তব্ সংরক্শিত