Memorial Sloan Kettering Cancer Center

রোগী এবং শুশরুষাকারীর শিক্ষা

আপনার মাস্টেকটমি সম্পকের্

এই নিদের্শিকাটি আপনাকে MSK-এ আপনার মাস্টেকটমি (স্তন অস্তেরা্পচার)-এর জনয্ পরস্তুত হতে সাহাযয্ করবে। আপনি সুস্থ হয়ে ওঠার সময় কী হতে পারে তা জানতেও এটি আপনাকে সাহাযয্ করবে।

আপনার অস্তেরা্পচারের দিন পযর্ন্ত তথেয্র সোসর্ হিসেবে এই নিদের্শিকাটি বয্বহার করুন। আপনার অস্তেরা্পচারের দিন এটি আপনার সাথে নিয়ে আসুন। আপনি এবং আপনার পরিচযরা্কারী দল এটি বয্বহার করবেন যাতে আপনার আরোগয্ লাভ করা সম্পকের্ আরো জানতে পারেন।

আপনার মাস্টেকটমি সম্পকের্

এই গাইডে বিভিন্ন ধরনের স্তন অস্তেরা্পচার সম্পকের্ তথয্ রয়েছে। আপনার থাকতে পারে:

- একটি সম্পূণর্ মাস্টেকটমি।
- একটি সম্পূণর্ মাস্টেকটমি এবং সেনি্টনেল লিম্ফ নোড বাযো়পসি।
- একটি সম্পূণর্ মাস্টেকটমি এবং সেনি্টনেল লিম্ফ নোড বাযো়পসি, সম্ভাবয্ অয্াকি্সলারি লিম্ফ নোড ডিসেকশনসহ।
- একটি সম্পূণর্ স্তন অপসারণ (মাস্টেকটমি) এবং বগলের (অয্াকি্সলারি) লিম্ফ নোড অপসারণের অস্তেরা্পচার (যাকে মডিফাইড র্যাডিকয্াল মাস্টেকটমিও বলা হয)।
- আরেকটি অনুরূপ অস্তেরা্পচার।

আপনি যদি স্তন পুনগরঠ্ন করান, তাহলে আপনার প্লাস্টিক সাজর্ন আপনাকে আরও তথয্ দেবেন।

সম্পূণর্ মাস্টেকটমি

একটি টোটাল মাস্টেকটমি হলো আপনার স্তনের সমস্ত টিসুয্ অপসারণের জনয্ করা একটি অস্তেরা্পচার। এটি সাধারণত আপনার বুকে একটি চেরা (সাজির্কয্াল কাট) দিযে় করা হয, তবে এটি বিভিন্ন উপাযে় করা যেতে পারে। আপনার স্তন সাজর্ন আপনার সাথে আলোচনা করবেন কোন বিকল্পটি আপনার জনয্ সঠিক।

আপনার অস্ত্রোপচারের সময়, আপনার সার্জন আপনার বগল থেকে এক বা একাধিক লিম্ফ নোডও অপসারণ করতে পারেন। একজন প্যাথলজিস্ট লিম্ফ নোড(গুলো) পরীক্ষা করবেন যাতে দেখা যায় ক্যান্সার সেগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে কি না।

সেন্টিনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি

সেন্টিনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি হলো যখন আপনার বগলের প্রথম লিম্ফ নোড(গুলো), যেগুলো স্তনের টিউমার থেকে নিঃসরণ গ্রহণ করে, সেগুলো অপসারণ করে ক্যান্সার কোষ আছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়। এই লিম্ফ নোডগুলোকে সেন্টিনেল লিম্ফ নোড বলা হয়। যদি ক্যান্সার কোষ ছড়িয়ে পড়ে, তবে সেন্টিনেল লিম্ফ নোডগুলো সাধারণত প্রথম স্থান যেখানে তারা যায়। আপনার সার্জন আপনার স্তনে একটি বিশেষ রং ইনজেক্ট করে সেন্টিনেল নোড(গুলো) শনাক্ত করবেন।

আপনার যদি সেন্টিনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি করা হয়, তাহলে আপনার অস্ত্রোপচারের অংশ হিসেবে লিম্ফ্যাটিক ম্যাপিং করা হতে পারে। এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও তথ্য এই গাইডের পরবর্তী অংশে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আপনার অস্ত্রোপচারের সময় আপনার সার্জন সেন্টিনেল লিম্ফ নোড(গুলি) পরীক্ষার জন্য প্যাথলজিস্টের কাছে পাঠাতে পারেন। যদি প্যাথলজিস্ট কোনো ক্যান্সার কোষ দেখতে পান, তাহলে আপনার সার্জন তখন বগলের লিম্ফ নোড ডিসেকশন করতে পারেন।

বগলের লিম্ফ নোড অপসারণের অস্ত্রোপচার.

বগলের অধিকাংশ বা সব লিম্ফ নোড (লসিকা গ্রন্থি) অপসারণের অস্ত্রোপচারকে অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড ডিসেকশন বলা হয়। অপসারণ করা লিম্ফ নোডের সংখ্যা ব্যক্তি ভেদে ভিন্ন হতে পারে।

আপনার লসিকাতন্ত্র (লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম) সম্পর্কে.

আপনার স্তন অস্ত্রোপচারের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া এবং অস্ত্রোপচারের পর সুস্থ হয়ে ওঠার সময় লসিকাতন্ত্র (লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম) কীভাবে কাজ করে তা বোঝা সহায়ক হতে পারে। আপনার লসিকাতন্ত্রের (লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমের) ২টি প্রধান কাজ রয়েছে:


- এটি সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে।
- এটি আপনার শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে তরল নিষ্কাশনে সাহায্য করে।

আপনার লসিকাতন্ত্র (লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম) লিম্ফ নোড, লসিকানালী (লিম্ফ্যাটিক ভেসেল) এবং লসিকা তরল (লিম্ফ ফ্লুইড) নিয়ে গঠিত (চিত্র ১ দেখুন)।

- **লিম্ফ নোড (লসিকা গ্রন্থি).** লিম্ফ নোড হলো ছোট শিমের দানার মতো আকৃতির গ্রন্থি, যা

আপনার লসিকানালীগুলোর (লিম্ফয্াটিক ভেসেল) বরাবর অবস্থিত। আপনার লিম্ফ নোডগুলো লসিকা তরলকে পরিশোধন করে এবং সেখান থেকে বয্াকটেরিয়া, ভাইরাস, কয্ান্সার কোষ ও অনয্ান্য বজর্য্ পদাথর্ দূর করে।

- **লসিকানালী (লিম্ফয্াটিক ভেসেল).** এগুলো আপনার রক্তনালীর মতো ক্ষুদর্ নালী, যা লসিকা তরলকে লিম্ফ নোডে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে শরীরের অনয্ান্য অংশে বহন করে।
- **লসিকা তরল** এটি একটি সব্চ্ছ তরল যা আপনার লসিকা তন্তের্র মধেয্ পর্বাহিত হয়। এটি এমন কোষ বহন করে যা সংকর্মণ এবং অনয্ান্য রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহাযয্ করে।



চিতর্ 1. আপনার স্তন ও বগলের লসিকাতন্তর্ (লিম্ফয্াটিক সিস্টেম).

মাস্টেকটমি (স্তন অপসারণের অস্তেরা্পচার) করার আগে।

এই বিভাগটি আপনাকে আপনার অস্তেরা্পচারের জনয্ পরস্তুত হতে সহায়তা করবে। আপনার অস্তেরা্পচারের সময় নিধরা্রিত হলে এটি পড়ুন। আপনার অস্তেরা্পচারের সময় কাছাকাছি আসার সাথে সাথে এটি বয্বহার করুন। পরস্তুত হওয়ার জনয্ কী করতে হবে তা সম্পকের্ এতে গুরুতব্পূণর্ তথয্ রয়েছে।

আপনি এই বিভাগটি পড়ার সাথে সাথে আপনার সবা্স্থয্সেবা পরদানকারীকে জিজ্ঞাসা করার জনয্

পর্শ্নাবলী লিখুন।

সাজর্ারির জনয্ পর্স্তুতি নেওয়া

আপনার অস্তেরা্পচারের জনয্ পর্স্তুত হতে আপনি এবং আপনার কেয়ার টিম একসাথে কাজ করবে। এই বিষয়গুলির কোনোটি আপনার ক্ষেতের্ পর্যোজয্ কি না তা আমাদের জানিয়ে আপনাকে নিরাপদ রাখতে আমাদেরকে সাহাযয্ করুন, এমনকি আপনি নিশ্চিত না হলেও।

- আমি শুধু পের্সকির্পশনের ঔষধ সেবন করি। পের্সকির্পশনের ওষুধ হলো এমন ওষুধ যা আপনি শুধুমাতর্ একজন সবা্স্থয্সেবা পর্দানকারীর পের্সকির্পশনের মাধয্মে পেতে পারেন। উদাহরণ:
  - যেসব ঔষধ আপনি মুখে সেবন করেন।
  - যেসব ঔষধ আপনি ইনজেকশনের (শটের) মাধয্মে নেন।
  - যেসব ঔষধ আপনি নিশবা্সের সাথে গর্হণ করেন (শবা্স গর্হণের সময়)।
  - যেসব ঔষধ আপনি তবকে পয্াচ বা কির্মের মাধয্মে গর্হণ করেন।
- আমি পয্াচ এবং কির্ম সহ যেকোনো ওভার-দয্-কাউন্টার ওষুধগুলি গর্হণ করি। ওভার-দয্-কাউন্টারের ওষুধ হলো এমন ওষুধ যা আপনি পের্সকির্পশন ছাড়াই কিনতে পারেন।

আপনি যেসব ঔষধ এবং সাপ্লিমেন্ট সেবন করেন, আপনার সবা্স্থয্সেবা পর্দানকারীরা সেগুলো সম্পকের্ জানে এটা নিশ্চিত করুন।

আপনি যেসব ঔষধ এবং সাপ্লিমেন্ট সেবন করেন, সেগুলোর ভিত্তি করে সাজর্ারির আগে কিছু নিদির্ষ্ট নিদের্শনা আপনাকে মেনে চলতে হতে পারে। এসব নিদের্শনা না মানলে, আপনার সাজর্ারি বিলমিবত্ত বা বাতিল হতে পারে।

- আমি যেকোনো ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট গর্হণ করি, যেমন- ভেষজ, ভিটামিন, খনিজ বা পরা্কৃতিক বা ঘরোয়া পর্তিষেধক।
- আমার পেসমেকার, অটোমেটিক ইমপ্লয্ান্টেবেল কাডির্ওভাটর্ার-ডিফির্বির্লেটর (AICD) বা অনয্ানয্ হাটর্ ডিভাইস রয়েছে।
- অতীতে অয্ানেস্থেসিয়া (A-nes-THEE-zhuh) নিয়ে আমার সমসয্া হয়েছিল। অয্ানেস্থেসিয়া হলো অস্তেরা্পচার বা পর্কির্য়ার সময় আপনাকে ঘুম পাড়ানোর ওষুধ।
- লয্াটেক্স সহ নিদির্ষ্ট কিছু ওষুধ বা উপকরণগুলিতে আমার অয্ালাজির্ রয়েছে।
- আমি রক্ত সঞ্চারণ গর্হণ করতে ইচ্ছুক নই।
- আমি গাঁজার মতো বিনোদনমূলক মাদক সেবন করি।

গভর্ধারণ পর্তিরোধ.

অস্ত্রোপচারের আগে আপনার গভর্ধারণের কোনো সম্ভাবনা থাকলে, অবশ্যই এমন একটি জন্মনিয়ন্ত্রণ (গভর্নিরোধ) পদ্ধতি বয্বহার করুন যাতে হরমোন থাকে না। উদাহরণসব্রূপ, আপনি কন্ডোম, ডায়াফর্াম বা কপার (Paragard®) ইনটর্াউটেরাইন ডিভাইস (IUD) বয্বহার করতে পারেন।

জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পকের্ আপনার কোনো পর্শ্ন থাকলে বা আপনার জনয্ উপযুক্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বেছে নিতে সহায়তা পর্য়োজন হলে, আপনার স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের (গাইনোকোলজিস্ট) সঙ্গে পরামশর্ করুন।

পর্জননক্ষমতা সংরক্ষণ

চিকিৎসা চলাকালীন গভর্ধারণ এড়িয়ে চলুন। যদি আপনার ডাক্তার কিছু সময়ের জনয্ গভর্ধারণ না করার পরামশর্ দিয়ে থাকেন এবং ভবিষয্তে সন্তান নেওয়ার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আপনি আপনার ডিমব্াণু (এগ) সংরক্ষণ (ফির্জ করে রাখা) করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন। আরও জানতে, পড়ুন।*Fertility Preservation Before Cancer Treatment: Options for People Born with Ovaries and a Uterus* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/fertility-preservation-females-starting-treatment).

ওজন কমানোর জনয্ GLP-1 ওষুধ।

আপনি যদি GLP-1 ধরনের কোনো ওষুধ গর্হণ করেন, তাহলে আপনার সব্াস্থয্সেবা পর্দানকারীকে অবশয্ই তা জানানো গুর্ুতব্পূণর্। আপনার অস্ত্রোপচার বা পর্কির্য়ার আগে খাওয়া ও পান করার জনয্ বিশেষ নিদের্শনা অবশয্ই মেনে চলতে হবে। **গত ৩০ দিনের মধেয্ যেকোনো সময় GLP-1 ওষুধ সেবন করে থাকলে, এই নিদের্শনাগুলো মেনে চলা অতয্ন্ত গুর্ুতব্পূণর্। আপনি যদি এগুলো মেনে চলেন না, তাহলে আপনার অস্ত্রোপচার বা পর্কির্য়া বিলমিব্ত বা বাতিল হতে পারে।**

- **আপনার অস্ত্রোপচার বা চিকিৎসা-পদ্ধতির আগের দিন সকাল ৬টা থেকে সব্চ্ছ তরল খাবার খাওয়া শুর্ু করুন।** কোনো ধরনের শক্ত বা কঠিন খাবার গর্হণ করবেন না। আরও তথয্ জানার জনয্ [bXNrLW5vZGUtbGluazogMjAyNDg=] পড়ুন।
- **আপনার আগমনের সময়ের ৮ ঘণ্টা আগে পানীয় পান বন্ধ করুন।** এই সময়ের পরে কিছুই খাওয়া বা পান করা যাবে না, এমনকি পরিষ্কার তরলও। আপনি আপনার ওষুধের সঙ্গে সামানয্ পরিমাণে পানি পান করতে পারেন।

আরও তথয্ জানার জনয্ [bXNrLW5vZGUtbGluazogMzE4MDM2] পড়ুন।

নিচে GLP-1 ওষুধের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। আরও কিছু আছে, তাই নিশ্চিত করুন যে আপনার সেবাদানকারী দল আপনার গর্হণ করা সমস্ত ওষুধ সম্পকের্ জানে। কখনও কখনও,

এগুলি ডায়াবেটিস বা অন্যান্য অবস্থার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করার জন্য নির্ধারিত হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে, এগুলো ওজন কমানোর জন্যও পের্সকরাইব করা হয়।

• Semaglutide (Wegovy®, Ozempic®, Rybelsus®) • Dulaglutide (Trulicity®)	• Tirzepatide (Zepbound®, Mounjaro®) • Liraglutide (Saxenda®, Victoza®)

মদ পান করা সম্পর্কের তথ্য

আপনি কী পরিমাণ মদ পান করেন সে সম্পর্কে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সাথে কথা বলা গুরুত্বপূর্ণ। এটি আমাদেরকে আপনার পরিচর্যার পরিকল্পনা করতে সহায়তা করবে।

আপনি নিয়মিত মদ পান করলে আপনার অস্ত্রোপচারের সময় এবং পরবর্তীতে আপনার অন্যান্য সমস্যার ঝুঁকি থাকতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে রক্তপাত, সংক্রমণ, হৃৎপিণ্ডের সমস্যা এবং দীর্ঘ সময় ধরে হাসপাতালে থাকা।

আপনি যদি নিয়মিত মদ পান করেন এবং হঠাৎ বন্ধ করে দেন, তাহলে এর কারণে খিঁচুনি, চিত্তবিভ্রম এবং মৃত্যু হতে পারে। আপনি এই সমস্যাগুলির ঝুঁকিতে রয়েছেন তা বুঝতে পারলে আমরা এগুলি প্রতিরোধে সহায়তা করার জন্য ওষুধ দিতে পারি।

আপনার অস্ত্রোপচারের আগে সমস্যাগুলি এড়িয়ে যেতে আপনি যা করতে পারেন তা এখানে উল্লেখ করা হলো।

- আপনি কী পরিমাণ মদ পান করেন সে সম্পর্কে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সাথে সৎ থাকুন।
- আপনার অস্ত্রোপচারের পরিকল্পনা করা হয়ে গেলে মদ পান করা বন্ধ করার চেষ্টা করুন। অবিলম্বে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে বলুন, যদি আপনার:
    - মাথাব্যথা হয়।
    - বমি বমি ভাব (কোনো কিছু উগরে দিচ্ছেন বলে মনে হওয়া) অনুভব হয়।
    - স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উদ্বিগ্নতা (নার্ভাস বা চিন্তিত) অনুভব হয়।
    - ঘুম না হয়।

এগুলি মদ্যপান বন্ধ করার প্রাথমিক লক্ষণ যার চিকিৎসা করা যেতে পারে।

- আপনি মদ্যপান বন্ধ করতে না পারলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে বলুন।
- মদ্যপান এবং অস্ত্রোপচার সম্পর্কে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে প্রশ্ন করুন।

বরাবরের মতো, আপনার চিকিৎসার সকল তথয্ গোপন রাখা হবে।

ধূমপান সম্পকির্ত তথয্

আপনি যদি ধূমপান করেন বা ইলেক্ট্রন্িক স্মোকিং ডিভাইস বয্বহার করেন, তবে সাজর্ারির সময় আপনার শব্াসকষ্ট হতে পারে। ইলেক্ট্রন্িক স্মোকিং ডিভাইসের উদাহরণ হল ভেপ এবং ই-সিগারেটসমূহ। সাজর্ারির কিছুদিন আগেও ধূমপান বন্ধ করলে, তা সাজর্ারির সময় বা সাজর্ারির পরে শব্াসকষ্টের সমসয্া পর্তিরোধে সহায়ক হতে পারে।

আপনি ধূমপান করলে আপনার সব্াস্থয্সেবা পর্দানকারী আপনাকে আমাদের টোবাকো টির্ট্মেন্ট পেরা্গর্াম্মে পাঠাবেন। এছাড়াও আপনি 212-610-0507 নমব্রে কল করে পেরা্গর্াম্টিতে যুক্ত হতে পারেন।

স্লিপ অয্াপনিয়া সম্পকির্ত তথয্

স্লিপ অয্াপনিয়া হলো একটি সাধারণ শব্াস-পর্শব্াসের বয্াধি। আপনার যদি স্লিপ অয্াপনিয়া হয়, তাহলে আপনার ঘুমের মধেয্ কিছু সময়ের জনয্ শব্াস-পর্শব্াস বন্ধ হয়ে যায়। সবচেয়ে সাধারণ ধরন হলো অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অয্াপনিয়া (OSA). OSA এর কেষ্তের্, ঘুমানোর সময় আপনার শব্াসনালী সম্পূণর্রূপে অবরুদ্ধ হয়ে যায়।

OSA অস্তে্রাপচারের সময় এবং পরবতর্ীতে গুরুতর সমসয্া সৃষ্টি করতে পারে। আপনার স্লিপ অয্াপনিয়া থাকলে অথবা আপনি যদি মনে করেন যে আপনার এটি হতে পারে তাহলে আমাদেরকে বলুন। স্লিপ অয্াপনিয়ার জনয্ আপনি শব্াস পর্শব্াসের যন্তর্ যেমন CPAP মেশিন বয্বহার করলে আপনার অস্তে্রাপচারের দিন এটি সাথে নিয়ে আসুন।

MSK MyChart বয্বহার করা

MSK MyChart (mskmychart.mskcc.org) হলো MSK-র রোগীর পোটর্াল। আপনার কেয়ার টিমকে বাতর্া পাঠাতে ও পড়তে, আপনার পরীক্ষার ফলাফল দেখতে, আপনার অয্াপয়েন্টমেন্টের তারিখ ও সময় দেখতে এবং আরো অনেক কিছু করতে আপনি এটি বয্বহার করতে পারেন। আপনি আপনার পরিচযর্াকারীকে তার নিজসব্ অয্াকাউন্ট তৈরি করার জনয্ আমন্তর্ণ জানাতে পারেন যাতে তারা আপনার পরিচযর্া সম্পকির্ত তথয্ দেখতে পারে।

আপনার যদি MSK MyChart এ অয্াকাউন্ট না থাকে, তবে আপনি mskmychart.mskcc.org ওয়েবসাইটে সাইন আপ করতে পারেন। আপনার কেয়ার টিমের সদসয্কেও ইনভাইটেশন পাঠাতে বলতে পারেন।

অয্াকাউন্ট সম্পকির্ত কোন সাহাযেয্র অনয্, MSK MyChart হেল্পডেস্কের 646-227-2593 নমব্রে কল করুন। সোমবার থেকে শুকর্বার সকাল 9টা থেকে 5টা পযর্ন্ত (ইস্টার্ন টাইম) তাদের

সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন।

আপনার অস্ত্রোপচারের 30 দিনের মধ্যে প্রি-সার্জিক্যাল টেস্টিং (PST)

অস্ত্রোপচারের আগে আপনার একটি PST অ্যাপয়েন্টমেন্ট থাকবে। আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টটি সরাসরি (সশরীরে) দেখা করার জন্য অথবা ভিডিও ভিজিট হতে পারে। আপনি আপনার সার্জনের অফিস থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্টের তারিখ, সময় এবং ঠিকানা সহ একটি রিমাইন্ডার পাবেন। সমস্ত MSK অবস্থানে পার্কিং বিষয়ক তথ্য এবং দিকনির্দেশনা পেতে www.msk.org/parking ভিজিট করুন।

আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টের দিন আপনি খাবার খেতে এবং আপনার নিয়মিত ওষুধ সেবন করতে পারেন।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় নিম্নলিখিত জিনিসগুলি আনা সহায়ক:

- প্রেসক্রিপশন এবং নিজে থেকে কেনা ওষুধ, প্যাচ এবং ক্রিম সহ আপনি যে সকল ওষুধ গ্রহণ করছেন তার একটি তালিকা।
- বিগত বছরে MSK-এর বাইরে করা যেকোনো চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল, যদি আপনার কাছে থাকে। উদাহরণের মধ্যে রয়েছে কার্ডিয়াক স্ট্রেস টেস্ট, ইকোকার্ডিওগ্রাম বা ক্যারোটিড ডপলার স্টাডির ফলাফল।
- আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের নাম এবং টেলিফোন নম্বর।

আপনার PST অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় আপনি একজন অ্যাডভান্স প্র্যাকটিস প্রোভাইডারের (APP) সাথে দেখা করবেন। তারা MSK-এর অ্যানেস্থেসিওলজি (A-nes-THEE-zee-AH-loh-jee) কর্মীদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে। তারা অস্ত্রোপচার বা প্রক্রিয়ার সময় অ্যানেস্থেশিয়া ব্যবহারে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ডাক্তার।

আপনার APP আপনার সাথে আপনার চিকিৎসা এবং অস্ত্রোপচারের ইতিহাস পর্যালোচনা করবে। আপনার পরিচর্যার পরিকল্পনা করার জন্য আপনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হতে পারে, যেমন:

- আপনার হৃদস্পন্দন পরীক্ষা করার জন্য ইলেক্ট্রোকার্ডিওগ্রাম (EKG)।
- বুকের এক্স-রে।
- রক্ত পরীক্ষা।

আপনার APP আপনাকে অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সাথে দেখা করার পরামর্শ দিতে

পারে। তারা আরও করবেন:

- আপনার অস্ত্রোপচারের সকালে কোন কোন ওষুধ সেবন করবেন, সে বিষয়ে তারা আপনার সঙ্গে আলোচনা করবেন।
- আপনার অস্ত্রোপচারের আগে কীভাবে খাবেন ও পান করবেন, সে বিষয়ে আপনাকে নির্দেশনা দেবেন।

আপনার প্রক্রিয়ার আগে করণীয় নির্দেশনা (যেমন ওষুধ খাওয়া, খাওয়া ও পান করার নির্দেশনা) আপনি আপনার MSK MyChart অ্যাকাউন্টে দেখতে পাবেন:

1. আপনার MSK MyChart অ্যাকাউন্টে লগ ইন করুন। হোমপেজে "Visits" নির্বাচন করুন।
2. "Past" অথবা "Past visits" বিভাগে যান এবং আপনার PST অ্যাপয়েন্টমেন্টটি খুঁজে নিন। "View After Visit Summary" নির্বাচন করুন।
3. আপনার After Visit Summary-এর "Preprocedure Instructions" বিভাগটি পড়ুন।

এই প্রক্রিয়ার আগে দেওয়া নির্দেশনাগুলো মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি এই নির্দেশনাগুলো মেনে না চলেন, তাহলে আপনার অস্ত্রোপচার বিলম্বিত হতে পারে অথবা বাতিল হতে পারে।

আপনি যদি আপনার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান বা বুকের দুধ সংগ্রহ (পাম্প) করে থাকেন, তাহলে আপনার নার্স প্র্যাকটিশনারকে (NP) তা জানান।

আপনার পরিচর্যাকারীকে সনাক্ত করুন

আপনার পরিচর্যায় আপনার পরিচর্যাকারীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আপনার অস্ত্রোপচারের আগে, আপনি ও আপনার পরিচর্যাকারী আপনার স্বাস্থ্য সেবাপ্রদানকারীর কাছ থেকে আপনার অস্ত্রোপচার সম্পর্কে জানবেন। আপনার অস্ত্রোপচারের পরে, আপনার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর পরিচর্যাকারী আপনাকে বাড়িতে নিয়ে যাবেন। তারা আপনাকে বাড়িতে আপনার নিজের পরিচর্যা করতেও সাহায্য করবেন।

পরিচর্যাকারীদের জন্য



ক্যান্সারের চিকিৎসায় থাকা একজন ব্যক্তির পরিচর্যা করায় অনেক দায়িত্ব থাকে। আপনাকে সেগুলো পরিচালনা করতে সহায়তা করার জন্য আমরা রিসোর্স ও সহায়তা প্রদান করি। আরো জানতে www.msk.org/caregivers দেখুন বা *A Guide for Caregivers* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/guide-caregivers) পড়ুন।

একটি হেলথ কেয়ার পর্‌ক্সি ফরম পূরণ করুন

আপনি ইতোমধেয্‌ একটি হেলথ কেয়ার পর্‌ক্সি ফরম পূরণ না করে থাকলে আমরা আপনাকে এখনই পূরণ করার পরামশর্‌ দিচ্ছি। আপনি ইতোমধেয্‌ একটি পূরণ করে থাকলে অথবা আপনার যদি অনয্‌ কোনো অগির্‌ম নিদের্‌শনা থাকে তাহলে সেগুলো আপনার পরবতর্‌ী অয্াপয়েন্টমেন্টে নিয়ে আসবেন।

হেলথ কেয়ার পর্‌ক্সি একটি আইনি নথি। আপনি যদি নিজের জনয্‌ যোগাযোগ করতে না পারেন তাহলে কে আপনার পকেষ্‌ কথা বলবে তা এতে উল্লেখ থাকে। এই বয্‌ক্তি হলো আপনার সবা্‌স্থয্‌সেবা পর্‌তিনিধি।

- সবা্‌স্থয্‌সেবা পর্‌ক্সি এবং অনয্ানয্‌ অগির্‌ম নিদের্‌শাবলী সম্পকের্‌ জানতে *Advance Care Planning for People With Cancer and Their Loved Ones* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/advance-care-planning) পড়ুন।
- সবা্‌স্থয্‌সেবা পর্‌তিনিধি হওয়ার বিষয়ে জানতে *How To Be a Health Care Agent* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-be-health-care-agent) পড়ুন।

হেলথ কেয়ার পর্‌ক্সি ফরম পূরণ করার বিষয়ে আপনার কোনো পর্‌শ্ন থাকলে আপনার কেয়ার টিমের যেকোনো সদসেয্‌র সাথে কথা বলুন।

আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জনয্‌ কাউকে ঠিক করে রাখুন

অস্তে্‌রা্‌পচারের পর আপনাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জনয্‌ একজন দায়িতব্‌শীল বয্‌ক্তি থাকতে হবে। দায়িতব্‌বান পরিচযর্‌া সহযোগী হলেন এমন বয্‌ক্তি যিনি আপনাকে নিরাপদে বাসায় নিয়ে যেতে সহায্‌তা করতে পারেন। তাদের কোনো উদেব্‌গ থাকলে তারা যেন আপনার পরিচযর্‌াকারী দলের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অস্তে্‌রা্‌পচারের দিনের আগে থেকেই এর বয্‌বস্থা করে রাখুন।

আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জনয্‌ আপনার যদি দায়িতব্‌বান পরিচযর্‌া সহযোগী না থাকে তবে নিচের একটি এজেন্সিকে কল করুন। আপনাকে সঙ্গে করে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জনয্‌ তারা কাউকে পাঠাবে। এই পরিষেবার জনয্‌ চাজর্‌ করা হয় এবং আপনাকে যাতায়াতের বয্‌বস্থা করতে হবে। টয্াক্সি বা গাড়ি পরিষেবা বয্‌বহার করা যেতে পারে, কিন্তু তবুও আপনার সাথে কোনো দায়বদ্ধ পরিচযর্‌া সহযোগীকে থাকতে হবে।

নিউ ইয়কের্‌ এজেন্সিসমূহ

VNS হেলথ: 888-735-8913

পরিচযর্‌াকারী বয্‌ক্তিবগর্‌: 877-227-4649

নিউ জাসির্‌তে এজেন্সিসমূহ

পরিচযর্‌াকারী বয্‌ক্তিবগর্‌: 877-227-4649

4% ক্লোরহেক্সিডিন গ্লুকোনেট (CHG) দ্রবণ অ্যান্টিসেপটিক ত্বক পরিষ্কারক (যেমন Hibiclens®) কিনুন

4% CHG দ্রবণ হলো ত্বক পরিষ্কারক যা ব্যবহার করার পর 24 ঘণ্টা জীবাণু মেরে ফেলে। আপনার অস্ত্রোপচারের আগে এটি দিয়ে গোসল করা অস্ত্রোপচারের পরে আপনার সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়তা করবে। আপনি প্রেসক্রিপশন ছাড়াই Evelyn H. Lauder Breast Center থেকে বের হওয়ার আগে বা আপনার নিকটস্থ ওষুধের দোকান থেকে ৪% CHG (ক্লোরহেক্সিডিন গ্লুকোনেট) জীবাণুনাশক ত্বক পরিষ্কারক কিনতে পারেন।

৩২৫ মিলিগ্রাম অ্যাসিটামিনোফেন ট্যাবলেট কিনুন, যেমন Tylenol® Regular Strength।

অ্যাসিটামিনোফেন একটি প্রেসক্রিপশন ছাড়াই পাওয়া যায় এমন ব্যথানাশক ওষুধ। অস্ত্রোপচারের পর বাড়িতে আপনার ব্যথা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করার জন্য আপনি এটি ব্যবহার করবেন। এটি আগে থেকেই কিনে রাখা সুবিধাজনক হবে। আপনি এটি প্রেসক্রিপশন ছাড়াই আপনার নিকটস্থ ওষুধের দোকান (ফার্মেসি) থেকে কিনতে পারেন। যেকোনো ওষুধ সেবনের সময় সবসময় ওষুধের পাতের দেওয়া নির্দেশনা বা আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর পরামর্শ অনুসরণ করুন।

আপনার অস্ত্রোপচারের 7 দিন আগে

অ্যাসপিরিন সেবন করা সম্পর্কে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর নির্দেশাবলি মেনে চলুন

অ্যাসপিরিন রক্তক্ষরণ ঘটাতে পারে। আপনি যদি অ্যাসপিরিন বা এমন কোনো ওষুধ খান যাতে অ্যাসপিরিন থাকে তাহলে আপনার অস্ত্রোপচারের 7 দিন আগে থেকে ডোজ পরিবর্তন করতে হতে পারে বা এটি খাওয়া বন্ধ করতে হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর নির্দেশাবলি মেনে চলুন। **তাদের পরামর্শ ছাড়া অ্যাসপিরিন খাওয়া বন্ধ করবেন না।**

আরো জানতে, পড়ুন *How To Check if a Medicine or Supplement Has Aspirin, Other NSAIDs, Vitamin E, or Fish Oil* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids)।

ভিটামিন ই, মাল্টিভিটামিন, ভেষজ প্রতিকার এবং অন্যান্য ডায়েটরি পরিপূরক সেবন বন্ধ করুন

ভিটামিন ই, মাল্টিভিটামিন, ভেষজ প্রতিকার এবং অন্যান্য ডায়েটরি পরিপূরক সেবন করলে রক্তপাত হতে পারে। আপনার অস্ত্রোপচারের 7 দিন আগে থেকে এগুলো সেবন করা বন্ধ করুন। আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী যদি আপনাকে অন্য নির্দেশাবলি প্রদান করেন তাহলে সেগুলো মেনে চলুন।

আরো জানতে *Herbal Remedies and Cancer Treatment* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/herbal-remedies-and-treatment) পড়ুন।

আপনার অস্ত্রোপচারের 2 দিন আগে

ননস্টেরয়েডাল অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ড্রাগস (NSAID) সেবন বন্ধ করুন

আইবুপ্রোফেন (Advil® ও Motrin®) এবং নযাপ্রোক্সেন (Aleve®) এর মতো NSAID সেবন করলে রক্তপাত হতে পারে। আপনার অস্ত্রোপচারের 2 দিন আগে থেকে এগুলো সেবন করা বন্ধ করুন। আপনার সবাস্থয্সেবা পর্দানকারী যদি আপনাকে অনয্ নিদের্শাবলি পর্দান করেন তাহলে সেগুলো মেনে চলুন।

আরো জানতে *How To Check if a Medicine or Supplement Has Aspirin, Other NSAIDs, Vitamin E, or Fish Oil* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids) পড়ুন।

আপনার অস্ত্রোপচারের 1 দিন আগে

আপনার সাজর্ারির সময়টি মাথায় রাখুন

একজন কমর্ী আপনার সাজর্ারির আগের দিন দুপুর 2টার পর আপনাকে কল করবেন। যদি আপনার অস্ত্রোপচার সোমবারের জনয্ নিধর্ারিত হয় তবে তারা আপনাকে আগের শুকর্বারে কল করবেন। আপনি যদি সন্ধয্া 7টা পযর্ন্ত কল না পান তাহলে 212-639-5014 নমব্রে কল করুন।

অস্ত্রোপচারের জনয্ আপনাকে কখন হাসপাতালে আসতে হবে তা কমর্ী আপনাকে জানাবেন। আপনাকে কোথায় যেতে হবে সেটিও তারা স্মরণ করিয়ে দেবেন।

সমস্ত MSK অবস্থানে পাকির্ং বিষয়ক তথয্ এবং দিকনিদের্শনা পেতে www.msk.org/parking ভিজিট করুন।

লিম্ফয্াটিক ময্াপিং (লসিকাতন্ত্রর মানচিত্রায়ন).

যদি আপনার সেন্টিনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি করা হয়, তবে অস্ত্রোপচারের আগের দিন অথবা অস্ত্রোপচারের দিন সকালে আপনার লিম্ফয্াটিক ময্াপিং পর্কির্য়া করা হতে পারে। এটি আপনার সাজর্নকে অস্ত্রোপচারের সময় সেন্টিনেল লিম্ফ নোড(গুলো) শনাক্ত করতে সাহাযয্ করবে।

লিম্ফয্াটিক ময্াপিং পর্কির্য়ার সময় আপনাকে পরায় ২০ মিনিট একটি হেলানো (রিক্লাইনিং) চেয়ারে শুয়ে থাকতে হবে। আপনি যখন রিক্লাইনিং চেয়ারে থাকবেন, তখন একজন সবাস্থয্সেবা পর্দানকারী আকর্ান্ত স্তনের অয্ারিওলার (বোঁটার চারপাশের গাঢ় অংশ) নিচের তব্কের মধেয্ অল্প পরিমাণ তেজস্কির্য় তরল ইনজেকশন (সুঁইয়ের মাধয্মে) দেবেন। ইনজেকশন দেওয়ার সময়

আপনার হালকা চিমটি লাগা বা জব্লাপোড়ার অনুভূতি হতে পারে।

ইনজেকশন দেওয়ার পর আপনাকে ইনজেকশন দেওয়া স্থানটি ১০ মিনিট ধরে আলতোভাবে মযাসাজ করতে হবে। এটি তেজস্কির্য় তরলটিকে সেন্টিনেল লিম্ফ নোড(গুলো) পযর্ন্ত পৌঁছাতে সাহাযয় করবে। এরপর একজন পর্যুক্তিবিদ (টেকনোলজিস্ট) আকর্ান্ত পাশের আপনার স্তন ও বগলে তেজস্কির্য়তার মাতর্া পরিমাপ করবেন, যাতে দেখা যায় তরলটির কতটা শোষিত হয়েছে। এটি করার জনয় তাদের ২টি পদ্ধতি রয়েছে:

- আপনার রেডিয়েশন পর্যুক্তিবিদ (টেকনোলজিস্ট) Neoprobe® নামে একটি ছোট হাতে ধরা যন্তর্ বয্বহার করতে পারেন।
- অথবা আপনার একটি ইমেজিং স্কযান করা হতে পারে, যার জনয় আপনাকে একটি বড় যন্তের্র উপর শুয়ে থাকতে হবে। এ সম্পর্কে আরও জানতে “Nuclear Medicine Scan” (নিউক্লিয়ার মেডিসিন স্কযান) অংশটি পড়ুন।

উভয় পদ্ধতিই সমানভাবে কাযর্কর। আপনার সবাস্থয্সেবা পর্দানকারী আপনাকে কী আশা করতে হবে তা জানাবেন।

নিউক্লিয়ার মেডিসিন স্কযান

ইনজেকশনের পর যদি আপনার ইমেজিং স্কযান করা হয, তাহলে আপনার পর্যুক্তিবিদ (টেকনোলজিস্ট) আপনাকে স্কযানিং ককে্ষ নিয়ে যাবেন। ছবি তোলার সময় আপনাকে একটি টেবিলের উপর শুয়ে থাকতে হবে এবং পর্যুক্তিবিদ (টেকনোলজিস্ট) ছবি তুলবেন। পর্তিটি ছবি সম্পূর্ণ করতে ৫ মিনিট সময় লাগে, এবং এই সময়ে আপনাকে খুব স্থির হয়ে শুয়ে থাকতে হবে। যদি আপনি কোনো অবস্থানে ৫ মিনিট থাকা অসব্স্তিকর মনে করেন, তাহলে আপনার টেকনোলজিস্টকে আপনার জনয় সময় গণনা করে দিতে বলুন। স্কযানটি ১০ থেকে ১৫ মিনিট সময় নেবে।

আপনার স্কযানের সময় তোলা ছবিগুলোতে তেজস্কির্য় তরলের পর্বাহ দেখা যাবে। তারা এটাও দেখাবে কোন লিম্ফ নোডগুলো তরল শোষণ করে। এটি আপনার লসিকা তন্তের্র একটি “মানচিতর্” তৈরি করে। আপনার সাজর্ন এই মানচিতর্টি বয্বহার করবেন আপনার অস্তের্াপচারের সময় আপনার সেন্টিনেল লিম্ফ নোড(গুলো) খুঁজে বের করতে।

আপনার লিম্ফয্াটিক মযাপিংয়ের একই দিনে যদি আপনার সাজর্ারি হয়, তাহলে একজন স্টাফ সদসয় আপনাকে স্কযানিং রুম থেকে অপারেশন রুমে নিয়ে যাবেন। আপনি যদি জোসি রবার্টস্ন সাজর্ারি সেন্টার (JRSC)-এ অস্তের্াপচার করান, তাহলে আপনার কেয়ার টিম আপনার পর্কির্য়ার পর JRSC-তে যাওয়ার জনয় MSK ভয্ানে করে যাওয়ার বয্বস্থা করবে। বেশিরভাগ অনয্ানয় ক্ষেতের্, আপনার লিম্ফয্াটিক মযাপিংয়ের পর আপনি বাড়ি চলে যাবেন।

4% CHG দর্বণের অয্যান্টিসেপটিক তব্ক পরিষ্কারক, যেমন Hibiclens দিয়ে গোসল করুন

অস্তেরা্পচারের আগের রাতে বিছানায় যাওয়ার আগে 4% CHG দর্বণের অয্যান্টিসেপটিক তব্ক পরিষ্কারক, যেমন Hibiclens দিয়ে গোসল করুন।

1. আপনার নিয়মিত শয্াম্পু এবং কন্ডিশনার দিয়ে আপনার চুল ধুয়ে ফেলুন। আপনার মাথা ভালো করে ধুয়ে ফেলুন।
2. আপনার নিয়মিত বয্বহাযর্ সাবান দিয়ে আপনার মুখ ও যৌনাঙ্গের (কুঁচকি) আশপাশ ধুয়ে নিন। গরম জল দিয়ে শরীর ভালো করে ধুয়ে ফেলুন।
3. 4% CHG দর্বণের বোতলটি খুলুন। সামানয্ পরিমাণ আপনার হাতে বা পরিষ্কার একটি ধোয়া কাপড়ে ঢালুন।
4. ঝরনা ধারা থেকে দূরে রাখুন। আপনার ঘাড় থেকে পা পযর্ন্ত আপনার দেহে 4% CHG দর্বণটি আলতোভাবে ঘষুন। আপনার মুখে বা যৌনাঙ্গে এটি দেবেন না।
5. 4% CHG দর্বণটি ধুয়ে ফেলতে পুনরায় ঝরনা ধারার নিচে যান। গরম জল বয্বহার করুন।
6. একটি পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে নিজেকে মুছে নিন।

গোসলের পর কোনো পর্কার লোশন, কির্ম, ডিওডোরেন্ট, মেকআপ, পাউডার, পারফিউম বা কোলোন লাগাবেন না।

খাওয়া-দাওয়ার নিদের্শনা

গুর্ুত্বপূর্ণ: আপনি যদি ওজন কমানোর জনয্ GLP-1 ওষুধ গর্হণ করেন, তবে এই নিদের্শাবলী অনুসরণ করবেন না। পরিবতের্ [bXNrLW5vZGUtbGluazogMzE4MDM2]-এ থাকা নিদের্শাবলী অনুসরণ করুন।



আপনার অস্তেরা্পচার বা পর্কির্য়ার আগের রাত ১২টায় খাবার খাওয়া বন্ধ করুন। এর মধেয্ শক্ত কয্ান্ডি এবং গামও অন্তভুর্ক্ত।

কখন খাওয়া বন্ধ করবেন, সে বয্াপারে আপনার সব্াস্থয্সেবা পর্দানকারীরা অনয্ নিদের্শনা দিয়ে থাকতে পারে। এরকম হলে, তাদের নিদের্শনা মেনে চলুন। কিছু বয্ক্তিকে তাদের অস্তেরা্পচার বা পর্কির্য়ার আগে দীঘর্ সময় ধরে উপবাস (খাবার না খাওয়া) করতে হয়।

আপনার অস্ত্রোপচারের দিন
পান করার নির্দেশনা

গুরুত্বপূর্ণ: যদি আপনি একটি GLP-1 ওষুধ গ্রহণ করেন, তাহলে এই নির্দেশনাগুলি অনুসরণ করবেন না। পরিবর্তে *Eating and Drinking Before Your Surgery or Procedure When Taking GLP-1 Medicines* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/eating-and-drinking-before-your-surgery-or-procedure-when-taking-glp-1-medicines)-এ থাকা নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

আপনার আগমনের 2 ঘণ্টা আগে এবং মধ্যরাতের মধ্যে শুধুমাত্র নিচের তালিকাভুক্ত তরল পান করুন। আর কোনো কিছু খাবেন না বা পান করবেন না। আপনার আগমনের 2 ঘণ্টা আগে পান করবেন না।

- জল।
- আপেলের সচ্ছ জুস, আঙুরের সচ্ছ জুস বা ক্রানবেরির সচ্ছ জুস।
- Gatorade বা Powerade।
- ব্ল্যাক কফি বা সাধারণ চা। চিনি দিলেও কোনো সমস্যা নেই। আর কিছু দেবেন না।
    - কোনো ধরনের দুধ বা ক্রিমার দেবেন না। এর মধ্যে উদ্ভিজ্জ দুধ এবং ক্রিমার অন্তর্ভুক্ত।
    - স্বাদযুক্ত কোনো সিরাপ যোগ করবেন না।

আপনার ডায়াবেটিস থাকলে, পানীয়তে আপনার চিনির পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত রাখুন। এই পানীয়গুলোর চিনি-মুক্ত, কম চিনিযুক্ত অথবা অতিরিক্ত চিনি যোগ করা হয়নি—এমন সংস্করণ বেছে নিলে আপনার রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা আরও সহজ হবে।

অস্ত্রোপচার বা চিকিৎসা-সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার আগে শরীরে পর্যাপ্ত পানি থাকা উপকারী, তাই তৃষ্ণা পেলে পানি পান করুন। প্রয়োজনের চাইতে বেশি পান করবেন না। আপনার অস্ত্রোপচার বা চিকিৎসা-সংক্রান্ত প্রক্রিয়ার সময় শিরার মাধ্যমে (IV) তরল প্রদান করা হবে।



আপনার আগমনের 2 ঘণ্টা আগে পান করবেন না। পানিও এতে অন্তভুর্ক্ত।

কখন পান করা বন্ধ করবেন, সে বয্াপারে আপনার সবা্স্থয্সেবা পর্দানকারীরা অনয্ নিদের্শনা দিয়ে থাকতে পারে। এরকম হলে, তাদের নিদের্শনা মেনে চলুন।

নিদের্শনা অনুযায়ী ওষুধ খান

আপনার কেয়ার টিমের একজন সদসয্ আপনাকে জানাবেন যে আপনার অস্তের্াপচারের দিন সকালে কোন ওষুধগুলি খেতে হবে। শুধু এক চুমুক পানি দিয়ে সেই ওষুধগুলি খান। আপনি সাধারণত কী কী ওষুধ খান তার উপর নিভর্র করে, এগুলি আপনার সকালের সাধারণ ওষুধগুলির সবকয়টি বা কয়েকটি হতে পারে বা তার কোনোটিই নাও হতে পারে।

4% CHG দর্বণের অয্ান্টিসেপটিক তব্ক পরিষ্কারক, যেমন Hibiclens দিয়ে গোসল করুন

হাসপাতাল তয্াগ করার আগে 4% CHG দর্বণের অয্ান্টিসেপটিক তব্ক পরিষ্কারক দিয়ে গোসল করুন। আগের রাতে যেভাবে বয্বহার করেছিলেন ঠিক সেভাবে বয্বহার করুন।

গোসলের পর কোনো পর্কার লোশন, কির্ম, ডিওডোরেন্ট, মেকআপ, পাউডার, পারফিউম বা কোলোন লাগাবেন না।

যে জিনিসগুলি মনে রাখতে হবে

- আপনি যদি কন্টয্াক্ট লেন্স পরেন তাহলে তার পরিবতের্ চশমা পরুন। অস্তের্াপচারের সময় কন্টয্াক্ট লেন্স পরা থাকলে তা আপনার চোখের ক্ষতি করতে পারে।
- কোনো ধাতব বস্তু পরবেন না। শরীরে ফুটো করে পরা গহনা সহ সকল গহনা খুলে ফেলুন। আপনার অস্তের্াপচারের সময় বয্বহৃত সরঞ্জামগুলি ধাতুর সংস্পর্শে এলে পুড়ে যেতে পারে।
- মূলয্বান জিনিস বাড়িতে রেখে আসুন।
- আপনার ঋতুসর্াব (আপনার মাসিক পিরিয়ড) হলে টয্াম্পনের পরিবতের্ সয্ানিটারি পয্াড বয্বহার করুন। পর্য়োজন হলে আমরা আপনাকে ডিসপোজেবল অন্তবর্াস এবং একটি পয্াড পর্দান করব।

কী আনতে হবে

- একটি বোতাম-ডাউন বা ঢিলেঢালা টপ।
- স্লিপ অয্াপনিয়ার জনয্ আপনার শব্াস পর্শব্াসের যন্তর্ (যেমন CPAP মেশিন), যদি আপনার থাকে।

- আপনার সব্াস্থয্ সেবার পর্ক্স ফরম এবং অনয্ান্য্ অগির্ম নিদের্শাবলী, যদি আপনি সেগুলি পূরণ করে থাকেন।
- আপনার সেল ফোন এবং চাজর্ার।
- ছোটখাটো কেনাকাটার জনয্ সামানয্ টাকা যদি আপনি কিনতে চান, যেমন সংবাদপতর্।
- আপনার বয্ক্তিগত জিনিসপতের্র জনয্ একটি কেস, যদি আপনার থাকে। চশমা, শর্বণ সহায়ক যন্তর্, ডেঞ্চারে, কৃতির্ম যন্তর্, পরচুলা এবং ধমর্ীয় আনুষাঙ্গিক হলো বয্ক্তিগত সামগর্ীর উদাহরণ।
- এই নিদের্শিকা। অস্তের্াপচারের পর কিভাবে নিজের যত্ন নিতে হয় তা শিখতে আপনি এটি বয্বহার করবেন।

আপনি হাসপাতালে গেলে

অনেক কমর্ী আপনাকে আপনার নাম এবং জন্ম তারিখ বলতে ও বানান করতে বলবেন। এটি আপনার নিরাপত্তার জনয্। একই বা অনুরূপ নামের মানুষের একই দিনে অস্তের্াপচার হতে পারে।

অস্তের্াপচারের জনয্ আপনার পোশাক পরিবতর্ন করার সময় হলে আমরা আপনাকে একটি হসপিটাল গাউন, রোব এবং পিছল-নিরোধী মোজা পর্দান করব।

একজন নাসের্র সাথে দেখা করুন

অস্তের্াপচারের আগে আপনি একজন নাসের্র সাথে দেখা করবেন। মধয্রাতের (রাত 12টা) পরে আপনি কোনো ওষুধ সেবন করে থাকলে সেগুলোর ডোজ এবং কখন গর্হণ করেছেন তা তাদেরকে বলুন। ওভার-দয্-কাউন্টার এবং পের্সকির্প্শনের ওষুধ, পয্াচ এবং কির্ম উল্লেখ করতে ভুলবেন না।

আপনার নাসর্ আপনার একটি শিরায় একটি ইন্টারভেনাস (IV) লাইন লাগাতে পারে যা সাধারণত আপনার বাহুতে বা হাতে। আপনার নাসর্ IV স্থাপন না করলে, আপনার অয্ানেস্থেসিওলজিস্ট (A-nes-THEE-zee-AH-loh-jist) অপারেটিং রুমে এটি স্থাপন করবেন।

একজন অয্ানেস্থেসিওলজিস্টের সাথে দেখা করুন

এছাড়াও অস্তের্াপচারের আগে আপনি একজন অয্ানেস্থেসিওলজিস্টের সাথে দেখা করবেন। তারা যা করবেন:

- আপনার সাথে আপনার চিকিৎসার বিস্তারিত পযর্ালোচনা করবেন।
- অতীতে অয্ানেস্থেসিয্া নিয়ে আপনার কোনো সমসয্া হয়েছে কি না তা জানতে চাইবেন। এর মধেয্ বমি বমি ভাব (ভিতর থেকে কোনো কিছু উগরে দিচ্ছেন বলে মনে হওয়া) অথবা বয্থা অন্তভুর্ক্ত।

- আপনার অস্ত্রোপচারের সময় আপনার আরাম এবং সুরক্ষা সম্পর্কে আপনার সাথে কথা বলবেন।
- আপনি যে ধরনের অ্যানেস্থেসিয়া নেবেন তা সম্পর্কে আপনার সাথে কথা বলবেন।
- অ্যানেস্থেসিয়া সম্পর্কিত আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

আপনার অস্ত্রোপচারের স্থান চিহ্নিত করা

আপনার নাম ও জন্মতারিখ জিজ্ঞাসা করার পাশাপাশি, কর্মীরা আপনার সার্জনের নাম কী, আপনি কোন অস্ত্রোপচার করাচ্ছেন এবং কোন পাশে অস্ত্রোপচার করা হবে তাও জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আপনার সার্জন বা আপনার সার্জিক্যাল দলের অন্য কোনো সদস্য একটি মার্কার ব্যবহার করে আপনার শরীরের সেই স্থানটি চিহ্নিত করবেন যেখানে অপারেশন করা হবে। এটি আপনার নিরাপত্তার জন্য। এটি নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে আপনার সার্জিক্যাল দলের সব সদস্য আপনার অস্ত্রোপচারের পরিকল্পনা সম্পর্কে জানেন।

অস্ত্রোপচারের জন্য প্রস্তুতি নিন

আপনার অস্ত্রোপচারের সময় হলে, আপনি আপনার চশমা, শ্রবণ সহায়ক যন্ত্র, ডেঞ্চার, কৃত্রিম ডিভাইস, পরচুলা এবং ধর্মীয় আনুষাঙ্গিক খুলে রাখবেন।

অপারেটিং রুমে আপনি হেঁটে যাবেন অথবা কোনো কর্মী সদস্য স্ট্রেচারে আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবেন। অপারেটিং রুম টিমের একজন সদস্য আপনাকে অপারেটিং বেডে উঠতে সাহায্য করবেন। তারা আপনার পায়ের নিচের অংশে কম্প্রেশন বুট লাগাবে। এগুলি আপনার পায়ে রক্ত সঞ্চালনে সহায়তা করার জন্য আলতোভাবে ফুলে উঠে ও চুপসে যায়।

আপনি সাচ্ছন্দ্য বোধ করলে, আপনার অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট আপনাকে আপনার আইভি (IV) লাইনের মাধ্যমে অ্যানেস্থেসিয়া দিবেন এবং আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন। এছাড়াও আপনার অস্ত্রোপচারের সময় এবং পরে আপনাকে আইভি লাইনের মাধ্যমে তরল দেওয়া হবে।

আপনার অস্ত্রোপচারের সময়

আপনি পুরোপুরি ঘুমিয়ে যাবার পরে, আপনার কেয়ার টিম আপনার মুখের ভেতর দিয়ে আপনার শ্বাসনালীতে একটি শ্বাস-প্রশ্বাসের নল স্থাপন করবে। এটি আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসে সাহায্য করবে।

আপনি যদি সেন্টিনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি করান, আপনার সার্জন আপনার নিপলের নিচে বা টিউমারের কাছে অল্প পরিমাণ নীল রং ইনজেক্ট করবেন। এই রঞ্জক আপনার লিম্ফ্যাটিক তরলের মাধ্যমে সেন্টিনেল নোড(গুলো)তে পৌঁছাবে এবং সেগুলোকে নীল রঙে রঞ্জিত করবে। যদি আপনার লিম্ফ্যাটিক ম্যাপিং করা হয়ে থাকে, তাহলে আপনার সার্জন একটি ছোট যন্ত্রও ব্যবহার করবেন যা সেই প্রক্রিয়ার সময় ইনজেক্ট করা তরল থেকে নির্গত তেজস্ক্রিয়তা

পরিমাপ করে।

একবার তারা সেন্টিনেল লিম্ফ নোড(গুলো) শনাক্ত করলে, আপনার সাজর্ন একটি কাটা দেবেন এবং সেগুলো অপসারণ করবেন। তারা আপনার অস্ত্রোপচারের সময় ক্যান্সার কোষ আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য সেগুলো প্যাথলজি বিভাগে পাঠাতে পারে। যদি প্যাথলজিস্ট ক্যান্সার কোষ দেখেন, তাহলে আপনার সাজর্ন আরও লিম্ফ নোড অপসারণ করতে পারেন। এটিকে অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড ডিসেকশন বলা হয়। আপনার সাজর্ন প্রয়োজনে এটি আপনার সাথে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন।

কারণ আপনার সেন্টিনেল লিম্ফ নোড বায়োপসির সময় নীল রং ব্যবহার করা হয়েছিল, আপনার অস্ত্রোপচারের পর ১ থেকে ২ দিন পর্যন্ত আপনার ত্বক, প্রস্রাব (পেশাব) এবং মল (পায়খানা) নীলচে-সবুজ হতে পারে।

আপনার সাজর্ন আপনার অস্ত্রোপচার শেষ করার পর আপনার ত্বকের নিচে সেলাই (স্টিচ) দিয়ে আপনার কাটা অংশ(গুলো) বন্ধ করবেন। তারা আপনার চিরার উপর Steri-Strips™ (পাতলা সার্জিক্যাল টেপের টুকরো) বা Dermabond® (সার্জিক্যাল আঠা)ও লাগাতে পারে। তারা আপনার কাটা স্থান(গুলো) একটি ব্যান্ডেজ দিয়ে ঢেকে দিতে পারে।

সাধারণত অপারেটিং রুমে থাকা অবস্থায়ই আপনার কেয়ার টিম আপনার শ্বাস-প্রশ্বাসের নলটি খুলে ফেলে।

আপনার কেয়ার টিম সাধারণত অপারেশন থিয়েটারেই থাকাকালীন আপনার শ্বাসনালীর টিউবটি খুলে ফেলবে।

এই বিভাগটি আপনাকে আপনার অস্ত্রোপচারের পরে কী হতে পারে তা জানতে সহায়তা করবে। হাসপাতাল ও বাড়ি উভয় জায়গা থেকে কিভাবে নিরাপদে সুস্থ হওয়া যায় আপনি তা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

আপনি এই বিভাগটি পড়ার সাথে সাথে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রশ্নাবলী লিখুন।


পোস্ট-অ্যানেস্থেসিয়া কেয়ার ইউনিট (PACU) বা আপনার রিকভারি রুমে

আপনি আপনার অস্ত্রোপচারের পর জেগে উঠলে PACU বা আপনার রিকভারি রুমে থাকবেন। একজন নার্স আপনার তাপমাত্রা, নাড়ি, রক্তচাপ এবং অক্সিজেনের মাত্রা পর্যবেক্ষণ করতে থাকবেন। আপনি আপনার নাকের নিচে অংশে একটি টিউব দিয়ে অথবা আপনার নাক ও মুখের মাঝখানে একটি মাস্কের মাধ্যমে অক্সিজেন নিতে পারেন। এছাড়াও আপনার পায়ের নিচের অংশে

কম্পের্শন বুট থাকবে।

টিউব ও ডেরইন

আপনার বুকে একটি সাজির্কয্াল বর্া থাকবে যা আপনার সাজির্কয্াল স্থান ঢেকে রাখবে এবং বর্াটির সাথে অন্তত ১টি জয্াকসন-পর্য্াট (JP) ডের্ন (চিতর্ ২ দেখুন) সংযুক্ত থাকবে। জেপি ডের্ন আপনার কাটা স্থান(গুলো) থেকে তরল বের করতে সাহাযয্ করবে এবং ফোলা পর্তিরোধ করবে। আপনি আপনার চেরা অংশ(গুলো) এবং ডের্ন(গুলো) এর যত্ন নিতে সাহাযয্ করার জনয্ বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জনয্ সরঞ্জাম এবং একটি অতিরিক্ত সাজির্কয্াল বর্া পাবেন।



চিতর্ 2. জেপি ডের্ন

আপনার বয্থা থেকে উপশম পাওয়া

অস্ত্রোপচারের পরে আপনার কিছুটা বয্থা অনুভব হবে। এটি সামলাতে আপনাকে সাহাযয্ করার জনয্:

- আপনার আইভি লাইনের মাধয্মে আপনাকে বয্থার ওষুধ দেওয়া হবে।
- আপনি যখন সব্াভাবিক খাবার খেতে পারবেন, তখন আপনাকে মুখে খাওয়ার বয্থানাশক ওষুধ দেওয়া হবে (যে ওষুধ আপনি গিলে খান)।

আমরা আপনাকে পর্ায়শই আপনার বয্থা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব এবং পর্য়োজন অনুযায়ী আপনাকে ওষুধ দিব। বয্থা না কমলে আপনার সব্াস্থয্সেবা পর্দানকারীকে বলুন। আপনার বয্থা নিয়ন্তর্ণ করা গুর্ুত্বপূর্ণ যাতে আপনি আপনার ইনসেন্টিভ স্পিরোমিটার বয্বহার করতে পারেন এবং চলাফেরা করতে পারেন। আপনার বয্থা নিয়ন্তর্ণ আপনাকে আরো দর্ুত সুস্থ হতে সাহাযয্ করবে।

আমরা আপনাকে বাড়িতে নেওয়ার জনয্ বয্থার ওষুধও দেব। সম্ভাবয্ পাশব্র্পর্তিকির্য়ার বিষয়ে আপনার সব্াস্থয্সেবা পর্দানকারীর সাথে কথা বলুন। কখন ওভার-দয্-কাউন্টার বয্থানাশক ওষুধে সুয্ইচ করা শুর্ু করতে হবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন।

চলাফেরা ও হাঁটা

চলাফেরা ও হাঁটা আপনার রক্ত জমাট বাঁধা এবং নিউমোনিয়ার ঝুঁকি হর্াস করতে সহায়তা করবে

(ফুসফুসের সংকর্মণ)। এটি আপনাকে গয্াস নিগর্ত করা এবং পুনরায় মলতয্াগ করা (মলতয্াগ) শুরু করতে সহায়তা করবে। পর্য়োজন হলে আপনার নাসর্, ফিজিকয্াল থেরাপিস্ট বা অকুপেশনাল থেরাপিস্ট আপনাকে চলাফেরা করতে সহায়তা করবে।

কিভাবে হাঁটা আপনাকে সুস্থ হতে সাহাযয্ করতে পারে সে সম্পকের্ আরো জানতে *Frequently Asked Questions About Walking After Your Surgery* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/frequently-asked-questions-about-walking-after-your-surgery) পড়ুন।

হাসপাতালে থাকাকালীন নিরাপদ থাকতে এবং পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচতে আপনাকে কী করতে হবে তা জানতে *Call! Don't Fall!* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/call-dont-fall) পড়ুন।

আপনার ফুসফুসের বয্ায়াম

আপনার ফুসফুসের বয্ায়াম করা গুরুতব্পূণর্ যেন তা পুরোপুরি পর্সারিত হয়। এটি নিউমোনিয়া পর্তিরোধে সহায়তা করে।

- জেগে থাকা অবস্থায় আপনার ইনসেন্টিভ স্পাইরোমিটারটি পর্তি ঘণ্টায় 10 বার বয্বহার করুন। আরো জানতে *How To Use Your Incentive Spirometer* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-use-your-incentive-spirometer) পড়ুন।
- কাশি এবং গভীর শব্াস-পর্শব্াসের বয্ায়াম করুন। কিভাবে করতে হয় তা আপনার পরিচযর্া দলের একজন সদসয্ আপনাকে শেখাবেন।

খাওয়া ও পান করা

পর্থমে, আপনি পানি বা জুস পান করতে পারেন। তারপর, আপনি কর্য্াকারসের মতো শক্ত খাবার খেতে শুরু করতে পারেন। এরপর আপনি আপনার সব্াভাবিক খাবার আবার খেতে শুরু করতে পারেন, যখন আপনি সক্ষম হবেন। আপনার ডায়েট সম্পকের্ কোনো পর্শ্ন থাকলে, একজন কি্লনিকাল ডায়েটিশিয়ান পুষ্টিবিদের সাথে দেখা করুন।

আপনার টিউব এবং ডেরনের যত্ন নেওয়া

আপনি অন্তত ১টি JP ডেরন লাগানো অবস্থায় বাড়ি ফিরবেন। সাধারণত অস্তেরা্পচারের পরা্য় ২ সপ্তাহ পর ডেরনগুলো অপসারণ করা হয়, তবে পর্য়োজন হলে আরও বেশি সময় রাখা হতে পারে।

আপনি হাসপাতাল ছাড়ার আগে একজন নাসর্ আপনাকে ডেরনের যত্ন কীভাবে নিতে হয় তা শেখাবেন। আপনার পরিচযর্াকারীও শিখলে তা সহায়ক হবে। এর ফলে তারা আরো সহজে আপনাকে

বাড়িতে সাহাযয্ করতে পারবেন।

আরও জানার জনয্, পড়ুন *Caring for Your Jackson-Pratt Drain* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/caring-your-jackson-pratt-drain).

ডিসচাজের্র পরিকল্পনা

অস্ত্রোপচারের পর আপনার পর্থম অয্াপয়েন্টমেন্ট সাধারণত হাসপাতাল ছাড়ার ১ থেকে ২ সপ্তাহের মধেয্ হবে। আপনার নাসর্ আপনাকে এই অয্াপয়েন্টমেন্ট কীভাবে করতে হবে তার নিদের্শনা দেবেন, যার মধেয্ কল করার ফোন নমব্রও থাকবে।

হাসপাতাল তয্াগ করা

হাসপাতাল ছাড়ার আগে, আপনার সব্াস্থয্সেবা পর্দানকারীদের একজনের সাথে আপনার অস্ত্রোপচারের কাটা স্থান(গুলো) দেখে নিন। সেগুলি দেখতে কেমন তা জানলে পরে যেকোনও পরিবতর্ন লকষ্য করতে পারবেন।

আপনি যাওয়ার আগে আপনার সব্াস্থয্সেবা পর্দানকারী আপনার ছাড়পতের্র আদেশ এবং ওষুধের পের্সকির্পশন লিখে দেবেন। এছাড়াও আপনি লিখিত ডিসচাজর্ নিদের্শাবলী পাবেন। আপনি চলে যাওয়ার আগে আপনার একজন সব্াস্থয্সেবা পর্দানকারী আপনার সাথে সেগুলি পযর্ালোচনা করবেন।

আপনাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জনয্ একজন দায়িতব্শীল পরিচযর্াকারী সঙ্গীর পর্য়োজন হবে।

বাড়িতে

বাড়িতে ও MSK-তে অয্াপয়েন্টমেন্টের সময় আপনার পড়ে যাওয়া রোধ করতে যা করতে পারেন তা সম্পকের্ জানতে *What You Can Do To Avoid Falling* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/what-you-can-do-avoid-falling) পড়ুন।

আপনার সুস্থ হওয়ার টর্য্াকার পূরণ করা

হাসপাতাল তয্াগ করার পর আপনি কেমন অনুভব করছেন তা আমরা জানতে চাই। আপনার যত্ন নিতে আমাদের সাহাযয্ করতে, আপনার MSK MyChart অয্াকাউন্টে আমরা কিছু পর্শ্ন পাঠাবো। আপনার ডিসচাজর্ হওয়ার পর 10 দিনের জনয্ আমরা পর্তিদিন সেগুলো পাঠাব। এই পর্শ্নাবলী আপনার সুস্থ হওয়ার টর্য্াকার হিসাবে পরিচিত।

পর্তিদিন মধয্রাতের আগে (রাত 12টা) আপনার সুস্থ হওয়ার টর্য্াকারটি পূরণ করুন। এটি সম্পূণর্ করতে মাতর্ 2 থেকে 3 মিনিট সময় লাগে। এই পর্শ্নাবলীর আপনার উত্তর আমাদের বুঝতে সহায়তা করবে যে আপনি কেমন বোধ করছেন এবং আপনার কী পর্য়োজন।

আপনার উত্তরের উপর ভিত্তি করে, আমরা আরো তথ্যের জন্য আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারি। কখনো কখনো, আমরা আপনাকে আপনার সার্জনের অফিসে কল করতে বলতে পারি। আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনি সবসময় আপনার সার্জনের অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

আরো জানতে *Common Questions About MSK's Recovery Tracker* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/mymsk-recovery-tracker) পড়ুন।

আপনার ব্যথা থেকে উপশম পাওয়া

ব্যথা বা অস্বস্তির সময়কাল ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। আপনি বাড়িতে যাওয়ার পরেও আপনার কিছুটা ব্যথা থাকতে পারে এবং ব্যথা কমানোর ওষুধ সেবন করতে হতে পারে। কিছু মানুষের অস্ত্রোপচারের কাটা স্থান(গুলো)র আশেপাশে ৬ মাস বা তারও বেশি সময় ধরে ব্যথা, টান বা পেশিতে ব্যথা থাকতে পারে। এর মানে এই নয় যে কোনো সমস্যা হয়েছে।

বাড়িতে আপনার ব্যথা উপশম করার ব্যাপারে এই নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।

- আপনাকে প্রদান করা নির্দেশনা এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ওষুধ সেবন করুন।
- প্রেস্কক্রাইব করা ওষুধ সেবনের পরেও যদি ব্যথা না কমে, তাহলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে কল করুন।
- ব্যথা কমানোর জন্য প্রেস্কিপশনে উল্লেখ করা ওষুধ সেবনের সময় গাড়ি চালাবেন না বা মদ পান করবেন না। প্রেস্কিপশনের কিছু ব্যথার ওষুধ আপনাকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করতে পারে (খুবই ঘুম পাওয়া)। অ্যালকোহল তন্দ্রার প্রভাবকে আরো তীব্র করে তুলতে পারে।
- আপনার অস্ত্রোপচারের কাটা স্থান সেরে যাওয়ার সাথে সাথে আপনার ব্যথা কমতে থাকবে এবং ব্যথার জন্য কম ওষুধের প্রয়োজন হবে। ওভার-দ্য-কাউন্টার ব্যথানাশক ব্যথা এবং অস্বস্তি দূর করতে সাহায্য করবে। অ্যাসিটামিনোফেন (Tylenol®) এবং আইবুপ্রোফেন (Advil বা Motrin) হলো ওভার-দ্য-কাউন্টার ব্যথানাশক ওষুধের উদাহরণ।
    - আপনার প্রেস্কিপশনের ব্যথার ওষুধ বন্ধ করার জন্য আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।
    - যেকোনো ওষুধ খুব বেশি খাবেন না। আপনার হেলথেকেয়ার প্রোভাইডারের বা লেবেলে থাকা নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন।
    - আপনি যে সকল ওষুধ খাচ্ছেন তার লেবেলগুলি পড়ুন। আপনি যদি অ্যাসিটামিনোফেন গ্রহণ করেন তাহলে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। অ্যাসিটামিনোফেন অনেক ওভার-দ্য-কাউন্টার এবং প্রেস্কিপশনে ওষুধের একটি উপাদান। অত্যধিক সেবন করলে আপনার লিভারের ক্ষতি হতে পারে। আপনার কেয়ার টিমের কোনো সদস্যের সাথে কথা না বলে

অয্াসিটামিনোফেনযুক্ত একাধিক ওষুধ খাবেন না।

- বয্থার ওষুধ আপনাকে আপনার সব্াভাবিক কাজকমের্ ফিরে আসতে সাহাযয্ করবে। আরামদায়কভাবে আপনার কাজকমর্ এবং বয্ায়াম করার জনয্ যথেষ্ট পরিমাণে গর্হণ করুন। আপনি বেশি সকির্য় হতে শুর্ু করলে আপনার হয়তো একটু বেশি বয্থা হতে পারে।
- আপনি কখন বয্থার ওষুধ সেবন করছেন, তার উপর নজর রাখুন। এটি সেবন করার 30 থেকে 45 মিনিট পরে এটি কাজ করে। বয্থা বেড়ে যাওয়ার জনয্ অপেক্ষা করার চেয়ে বরং যখন বয্থা শুর্ু হয়, তখনই ওষুধ সেবন করলে তা বেশি কাযর্কর হয়।

কিছু পের্সকির্পশন বয্থার ওষুধ যেমন অপিওয়েড (opioid) এর কারণে কোষ্ঠকাঠিনয্ হতে পারে। কোষ্ঠকাঠিনয্ হলো সব্াভাবিকের তুলনায্ কম ঘন ঘন মলতয্াগ করা, মলতয্াগ করার সময় কষ্ট হওয়া অথবা উভয়ই।

কোষ্ঠকাঠিনয্ পর্তিরোধ ও উপশম করা

কিভাবে আপনার কোষ্ঠকাঠিনয্ পর্তিরোধ ও উপশম করবেন, সে বিষয়ে আপনার সব্াস্থয্সেবা পর্দানকারীর সাথে কথা বলুন। আপনি এই নিদের্শনাবলী অনুসরণ করতে পারেন।

- পর্তিদিন একই সময়ে বাথরুমে যান। সেই সময় বাথরুম যাওয়ার সাথে আপনার শরীর অভয্স্ত হয়ে উঠবে। তবে আপনি যদি বাথরুম যাওয়ার পর্য়োজন বোধ করেন, তাহলে তা চেপে রাখবেন না।
- খাবার খাওয়ার 5 থেকে 15 মিনিট পরে বাথরুম বয্বহার করার চেষ্টা করুন। সকালের নাস্তা খাবার পর বাথরুম যাওয়া ভালো। এই সময়ে আপনার কোলোনের কাযর্ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি শকি্তশালী থাকে।
- যদি পারেন, তাহলে বয্ায়াম করুন। হাঁটা একটি কাযর্কর বয্ায়াম যা কোষ্ঠকাঠিনয্ পর্তিরোধ ও উপশম করতে সাহাযয্ করতে পারে।
- সম্ভব হলে পর্তিদিন 8 থেকে 10 (8-আউন্স) কাপ (2 লিটার) পানীয় পান করুন। পানি, জুস (যেমন আলুবোখারার জুস) সুয্প এবং মিল্কশেক বেছে নিন। কয্াফেইনযুক্ত পানীয়, যেমন কফি এবং সোডা কম পান করুন। কয্াফেইন আপনার শরীর থেকে তরল বের করে দেয়।
- আপনার ডায়েটে ফাইবারের পরিমাণ ধীরে ধীরে, দিনপর্তি 25 থেকে 35 গর্াম করে বাড়ান। খোসাযুক্ত ফল ও শাকসবজি গোটা শসয্ এবং সিরিয়ালে ফাইবার (খাদয্ আঁশ) থাকে। আপনার যদি ওস্টমি থাকে বা সম্পর্তি অন্ের্র অস্ের্াপচার হয়ে থাকে, তাহলে আপনার ডায়েটে কোনো পরিবতর্ন করার আগে আপনার সব্াস্থয্সেবা পর্দানকারীর সাথে কথা বলুন।
- কোষ্ঠকাঠিনয্ দূর করতে ওভার-দয্-কাউন্টার এবং পের্সকির্পশনের ওষুধ উভয়ই বয্বহার করা যেতে পারে। কোষ্ঠকাঠিনের্য়র জনয্ যেকোনো ওষুধ খাওয়ার আগে আপনার সব্াস্থয্সেবা

পর্দানকারীর সাথে কথা বলুন। আপনার যদি ওস্টমি থাকে বা অন্ত্রের অস্ত্রোপচার হয়ে থাকে তাহলে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার হেলথকেয়ার পেরাভাইডারের বা লেবেলে থাকা নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। কোষ্ঠকাঠিন্যের জন্য ওভার-দ্য-কাউন্টার ওষুধের উদাহরণ হলো:

- ডকুসেট সোডিয়াম (Colace®)। এটি মল নরমকারক (এমন ওষুধ যা আপনার মল নরম করে) যার সামান্য কিছু পাশর্প্রতিক্রিয়া আছে। কোষ্ঠকাঠিন্য প্রতিরোধে আপনি এটি ব্যবহার করতে পারেন। এটি খনিজ তেলের সাথে সেবন করবেন না।
- পলিএথিলিন গ্লাইকল (MiraLAX®)। এটি একটি রেচক (এমন ওষুধ যা আপনার মলত্যাগে সাহায্য করে) যার সামান্য কিছু পাশর্প্রতিক্রিয়া আছে। এটি 8 আউন্স (1 কাপ) লিকুইডের সাথে সেবন করুন। ইতোমধ্যে আপনার কোষ্ঠকাঠিন্য হলেই কেবল এটি গ্রহণ করুন।
- সেনা (Senokot®)। এটি একটি উত্তেজক রেচক, যার কারণে ক্র্যাম্পিং হতে পারে। বিছানায় যাওয়ার সময় এটি সেবন করা সবচেয়ে ভালো। ইতোমধ্যে আপনার কোষ্ঠকাঠিন্য হলেই কেবল এটি গ্রহণ করুন।

এই ওষুধগুলির যেকোনোটির কারণে ডায়রিয়া (ঘন ঘন তরল বা পানির মতো মলত্যাগ) হলে এগুলি গ্রহণ করা বন্ধ করুন। প্রয়োজন হলে আপনি পুনরায় শুরু করতে পারেন।

২ দিন ধরে মলত্যাগ না হলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ করুন।

সুস্থ হওয়ার প্রক্রিয়া এবং নতুন অনুভূতি

অস্ত্রোপচারের পর আপনি সেরে উঠতে থাকলে আপনার হাত, বক্ষ বা বুকের প্রাচীরে বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি হতে পারে। আপনি কোমলতা, অবশভাব, হালকা খোঁচা লাগার মতো ব্যথা বা এই তিনটিই অনুভব করতে পারেন। আপনি এমন অনুভূতিও পেতে পারেন যেন আপনার হাত বেয়ে তরল নামছে, যদিও বাস্তবে কোনো তরল নেই। এটি হতে পারে কারণ অস্ত্রোপচারের সময় আপনার স্নায়ু কেটে গেছে।

আপনার মাসটেকটমির পরও আপনি অনুভব করতে পারেন যে আপনার স্তন বা নিপল এখনও আছে। এটিকে ফ্যান্টম সেনসেশন (ভূতুড়ে অনুভূতি) বলা হয়।

এই অনুভূতিগুলো সাধারণত আসা-যাওয়া করে এবং অস্ত্রোপচারের পর প্রথম কয়েক মাসের মধ্যে প্রায়ই ভালো হয়ে যায়। কিছু অনুভূতি কয়েক মাস বা এমনকি ৫ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে থাকতে পারে। এর কারণ হলো স্নায়ু আপনার শরীরের সবচেয়ে ধীরে সেরে ওঠা অংশ। বেশিরভাগ মানুষ বলেন এই অনুভূতিগুলো তীব্র বা কষ্টদায়ক নয়।

অনুভূতির পরিবতর্নের কারণে, আপনার অস্তেরা্পচারের স্থানে সরাসরি কোনো গরম বা ঠান্ডা জিনিস (যেমন গরম পানির বোতল, হিটিং পয্াড বা আইস পয্াক) রাখবেন না।

আপনি যখন সুস্থ হয়ে উঠতে থাকবেন, তখন আপনার অস্তেরা্পচারের কাটা স্থান(গুলো) বরাবর দাগের টিসুয্ অনুভব করতে পারেন। এটি শক্ত মনে হবে। এটি সাধারণ বয্াপার, এবং আগামী কয়েক মাসের মধেয্ এটি নরম হয়ে যাবে।

আপনার কাটা স্থান(গুলো)-এর যত্ন নেওয়া

আপনার কাটা স্থান(গুলো) তব্কের নিচে সেলাই (সিউচার) দিয়ে বন্ধ করা থাকবে। এই সেলাইগুলো নিজে থেকেই গলে যায্ এবং এগুলো অপসারণ করার পর্য়োজন হয্ না। যদি আপনার কাটা স্থান(গুলো)-এর উপর ছোট ছোট সাজির্কয্াল টেপ (Steri-Strips) থাকে, তাহলে আপনার সাজর্ন বা নাসর্ ফলো-আপ অয্াপয়েন্টমেন্টে সেগুলো খুলে দেবেন। যদি আপনার কাটা স্থান(গুলো)-এর উপর সাজির্কয্াল গ্লু (Dermabond) থাকে, এটি সময়ের সাথে সাথে নিজে থেকেই গলে যাবে।

আপনার কাটা স্থান(গুলো) কতবার পরিষ্কার করতে হবে তা আপনার সব্াস্থয্সেবা পর্দানকারীর নিদের্শনা অনুযায়ী অনুসরণ করুন।

অস্তেরা্পচারের এক বা দুই সপ্তাহ পরে, টিসুয্ অপসারণ করা হয়েছে এমন আপনার বগল বা স্তনের তব্কের নিচে তরলের একটি পকেট তৈরি হতে পারে। এটিকে সেরোমা বলা হয, এবং এটি ক্ষতিকর নয়। সেই স্থানটি নরম ও ফোলা মনে হতে পারে। এটি স্পশের্ বয্থাযুক্তও মনে হতে পারে।

সেরোমা সাধারণত নিজে থেকেই সেরে যায়। যদি আপনার বড় সেরোমা হয় বা অসব্স্তি লাগে, তাহলে আপনার চিকিৎসক বা নাসের্র সাথে আলোচনা করতে আপনার সব্াস্থয্সেবা পর্দানকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

আপনার সব্াস্থয্সেবা পর্দানকারীকে ফোন করুন, যদি:

- আপনার কাটা স্থান(গুলো)-এর চারপাশের তব্ক খুব লাল হয়ে গেছে।
- আপনার কাটা স্থান(গুলো)-এর চারপাশের তব্ক আরও বেশি লাল হয়ে যাচ্ছে।
- পুঁজের মতো রস বেরোতে দেখছেন (গাঢ় ও দুধের মতো)।

খাওয়া ও পান করা

আপনার সব্াস্থয্সেবা পর্দানকারী যদি আপনাকে অনয্ কোনো নিদের্শ না দিয়ে থাকেন, তাহলে অস্তেরা্পচারের আগে যেসব খাবার খেতেন, তা খেতে পারবেন। অস্তেরা্পচারের পর সুস্থ হওয়ার জনয্ অনেক কয্ালোরি এবং পেরা্টিনযুক্ত বয্ালেন্সড ডায়েট সাহাযয্ করবে। পর্তেয্ক খাবারের

সাথে পযরা্প্ত পরিমাণ পেরা্টিন খাওয়ার চেষ্টা করুন (যেমন মাংস, মাছ বা ডিম)। এছাড়া ফল, শাক-সবি্জ এবং গোটা দানাশসয্ খাওয়ার চেষ্টা করুন।

পরচুর পরিমাণে পানীয় পান করা গুরুতবপূ্ণর্। পর্তিদিন 8 থেকে 10 (8-আউন্স) কাপ তরল পানীয় পান করার চেষ্টা করুন। অয্ালকোহলবিহীন তরল বেছে নিন। কয্াফেইনযুক্ত তরল সীমিত করুন।

আপনার ডায়েট সম্পকের্ কোনো পর্শ্ন থাকলে, একজন কি্লনিকাল ডায়েটিশিয়ান পুষ্টিবিদের সাথে দেখা করুন।

গোসল করা

আপনার যদি স্তন পুনগর্ঠন (বের্স্ট রিকনস্ট্রা্কশন) হয়ে থাকে, তাহলে কখন গোসল করতে পারবেন এবং কোনো বিশেষ নিদের্শনা আছে কি না সে বিষয়ে আপনার প্লাস্টিক সাজর্নের সাথে কথা বলুন। আপনার যদি পুনগর্ঠন (রিকনস্ট্রা্কশন) না হয়ে থাকে, তাহলে অস্তেরা্পচারের ২৪ ঘণ্টা পরে আপনি গোসল করতে পারবেন। বাড়ি যাওয়ার আগে, আপনার নাসর্ আপনাকে গোসল করার সময় কীভাবে ডের্নগুলো নিরাপদে রাখতে হয় তা শেখাবেন।

গোসল করার জনয্ পর্স্তুত হলে, আপনার সাজির্কয্াল বরা্ এবং কাটা স্থান(গুলো)-এর উপর থাকা যেকোনো গজ পয্াড খুলে ফেলুন। আপনার কাটা স্থান(গুলো)-তে যদি Steri-Strips বা Dermabond থাকে, তাহলে সেগুলো খুলবেন না।

সাবধানে সাবান ও পানি দিয়ে আপনার কাটা স্থান(গুলো) পরিষ্কার করুন এবং শাওয়ারের পানি সেগুলোর উপর দিয়ে বয়ে যেতে দিন।

পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে আস্তে করে জায়গাগুলো শুকিয়ে নিন। আপনার সাজির্কয্াল বরা্ আবার পরে নিন এবং ডের্নগুলো বর্ার সাথে সুরকি্ষতভাবে লাগিয়ে রাখুন। যদি বেশি আরাম লাগে, তাহলে বর্ার নিচে আপনার কাটা স্থান(গুলো)-এর উপর একটি পরিষ্কার গজ পয্াড রাখতে পারেন।

আপনার সবা্স্থয্সেবা পর্দানকারী অনুমতি না দেওয়া পযর্ন্ত গোসলের টব, হট টাব, সাউনা এবং সুইমিং পুল এড়িয়ে চলুন। এছাড়াও, আপনার অস্তেরা্পচারের স্থানের আশেপাশে ডিওডোরান্ট, লোশন, পাউডার বা পারফিউম বয্বহার করার আগে আপনার সবা্স্থয্সেবা পর্দানকারীর সাথে কথা বলুন।.

বরা্ পরা

যদি আপনাকে সাজির্কয্াল বরা্ দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে ডের্ন(গুলো) অপসারণ না হওয়া পযর্ন্ত এটি পরতে থাকুন। এর পরে কী পরবেন সে বিষয়ে আপনার সবা্স্থয্সেবা পর্দানকারীর সাথে কথা বলুন। আপনার সাজির্কয্াল বরা্ সহায়তা দেবে, আপনাকে আরামদায়ক রাখবে এবং আপনার ডের্ন(গুলো)কে স্থানে ধরে রাখবে। আপনি ঘুমানোর সময় আপনার সাজির্কয্াল বরা্ পরবেন, তবে

গোসলের আগে এটি খুলে ফেলবেন।

আপনি যখন আপনার অস্ত্রোপচারের পর সেরে উঠছেন বা স্তন পুনগর্ঠনের বিভিন্ন ধাপ পার করছেন, তখন আপনার বক্ষ-তে পযাড বযবহার করে আপনার চেহারার ভারসামযবজায রাখা যেতে পারে। বক্ষ পূরণ করার একটি উপায হলো নরম বেরস্ট ফমর (অস্থাযী বেরস্ট পরস্থেসিস) বযবহার করা। এই বেরস্ট ফমরটি একটি হালকা ওজনের নাইলন পাউচ। আপনি পাউচের ভিতরের তুলার পরিমাণ বাড়িযে বা কমিযে আপনার অনয স্তনের সাথে মিলিযে এর আকার ঠিক করতে পারেন। আপনি নাইলন পাউচটি হালকা সাবান যেমন Woolite® বা Ivory® দিযে ধুযে নিযে তারপর বাতাসে শুকাতে দিতে পারেন।

অনেক ধরনের বেরস্ট পরস্থেসিস এবং বক্ষ বিকির করে এমন বিশেষাযিত দোকান রযেছে। আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, এই পণযগুলো ওযেবসাইট থেকে কিনতে পারেন। আপনি এগুলো স্থানীয মাসটেকটমি বুটিক এবং লঞ্জারি স্টোর থেকেও কিনতে পারেন। অনলাইন দোকান এবং আপনার এলাকার দোকানগুলোর তালিকা খুঁজে পেতে, পড়ুন *Resources, Clothing, and Support After Breast Surgery* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/resources-clothing-support-breast-surgery).

আপনি আপনার বক্ষের ভেতর নরম গজও (gauze) রাখতে পারেন, যা আপনি নাসের কাছ থেকে সংগরহ করতে পারবেন। গজটি সবসময পরিষ্কার রাখার জনয নিযমিত বদলাতে হবে।

স্তন ও নিপল পরস্থেসিস

বেরস্ট পরস্থেসিস হলো নরম নাইলন পাউচের তুলনায বেশি স্থাযী একটি বেরস্ট ফমর।

নিপল পরস্থেসিস হলো সিলিকন দিযে তৈরি একটি কৃতিরম নিপল এবং অযারিওলা (নিপলের চারপাশের বৃত্তাকার অংশ)। এটি আঠা (বিশেষ গলু) বযবহার করে আপনার পুনগর্ঠিত স্তন বা বেরস্ট পরস্থেসিসের সাথে লাগানো যায। নিপল পরস্থেসিস বিভিন্ন আকার এবং তবকের রঙে পাওযা যায, যাতে এটি আপনার পরাকৃতিক নিপলের সাথে মিলিযে নেওযা যায।

আপনার যদি স্তন পুনগর্ঠন (বেরস্ট রিকনস্ট্রাকশন) না হযে থাকে, তাহলে সাধারণত অস্ত্রোপচারের পরায ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ পরে আপনি বেরস্ট ও নিপল পরস্থেসিস পরা শুরু করতে পারেন।

আপনি যদি স্তন ও নিপল পেরাস্থেসিস (কৃতিরম স্তন ও বোঁটা) বযবহার করতে আগরহী হন, তাহলে আপনার ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলুন। আপনার ফলো-আপ অযাপযেনটমেনটের সময তারা আপনাকে এই পরস্থেটিক ডিভাইসগুলোর জনয একটি পেরসকিরপশন দিতে পারবেন। আপনার পরস্থেটিক ডিভাইসগুলোর জনয কী কী খরচ বীমার আওতায রযেছে তা জানতে আপনার বীমা কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

এমন বিশেষায়িত দোকান রয়েছে যেখানে বিভিন্ন ধরনের স্তন ও নিপল পরস্থেসিস এবং বরা বিকির করা হয়। আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, এই পণ্যগুলো ওয়েবসাইট থেকে কিনতে পারেন। আপনি এগুলো স্থানীয় মাসটেকটমি বুটিক এবং লঞ্জারি স্টোর থেকেও কিনতে পারেন। অনলাইন দোকান এবং আপনার এলাকার দোকানগুলোর তালিকা জানতে, পড়ুন।*Resources, Clothing, and Support After Breast Surgery* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/resources-clothing-support-breast-surgery).

শারীরিক কাযরকলাপ এবং বয়ায়াম

যদি আপনার স্তন পুনগরঠন (বেরস্ট রিকনস্ট্রাকশন) করা হয়ে থাকে, তবে আপনার ডাক্তার নিরাপদ বলে না জানানো পযরন্ত ৫ পাউন্ড (২.৩ কিলোগরাম) এর বেশি ওজনের কোনো বস্তু তুলবেন না। সাধারণত এটি পরায় ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ সময় লাগে। এছাড়াও, এই সময়ে কঠোর শারীরিক কাযরকলাপ (যেমন জগিং ও টেনিস) এবং সংস্পশরমূলক খেলাধুলা (যেমন ফুটবল) এড়িয়ে চলুন।

আপনার অস্তেরাপচারের কাটার স্থান(গুলো) সেরে ওঠার সময় কোন কোন বয়ায়াম ও নড়াচড়া করতে পারবেন, সে সম্পকের আপনার চিকিৎসা দলের একজন সদসয় আপনার সঙ্গে আলোচনা করবেন। তাদের নিদেরশনা এবং নিদেরশিকায় দেওয়া নিদেরশনা অনুসরণ করুন।*মাস্টেকটমি বা স্তন পুনগরঠনের অস্তেরাপচারের পর বয়ায়াম* (www.mskcc.org/bn/cancer-care/patient-education/exercises-after-mastectomy-or-reconstruction).

আপনার অস্তেরাপচারের স্থানের চারপাশে যে দাগের টিসুয় (স্কার টিসুয়) তৈরি হয়, তা আপনার হাত ও কাঁধের নড়াচড়ার পরিসর সীমিত করতে পারে। যদি আপনার পুনগরঠন করা হয়ে থাকে, তবে আপনার পেশিতে বয়থা বা টানটান ভাবও থাকতে পারে। যদি আপনার অসবস্তি হয়, তবে বয়ায়াম শুরু করার ৩০ মিনিট আগে বয়থানাশক ওষুধ গরহণ করা সহায়ক হতে পারে।

অস্তেরাপচারের পর সবাভাবিকের চেয়ে কম শকিত থাকবে এটাই সবাভাবিক বিষয়। বয়কিত ভেদে আরোগয় লাভ করার সময় ভিন্ন হয়। আপনার সামথরয় অনুযায়ী পরতিদিন আপনার কাযরকলাপ বাড়ান। সবসময় বিশরামের সময়কালের সাথে কাযরকলাপের সময়সীমার ভারসাময় বজায় রাখুন। অয়ারোবিক বয়ায়াম করুন, যেমন হাঁটা এবং সিঁড়িতে ওঠা যা আপনাকে শকিত পেতে ও ভালো বোধ করতে সাহাযয় করবে।

যৌন কাযরকলাপ

আপনি যখন নিজেকে পরস্তুত মনে করবেন, তখন আবার যৌন কাযরকলাপ শুরু করতে পারেন। যৌন সম্পকর স্থাপন আপনার অস্তেরাপচারের স্থানে কোনো কষতি করবে না।

অস্তেরাপচারের পর অলপ সময়ের মধেয়ই আপনার সঙ্গীকে আপনার কাটার স্থান(গুলো) দেখতে দেওয়া সহায়ক হতে পারে। এটি আপনাদের উভয়েরই যেকোনো উদেবগ কমাতে সহায়তা করতে পারে।

আপনার সঙ্গীকে জানান কী আপনার জনয্ আরামদায়ক এবং কী নয়। অস্ত্রোপচারের পর পর্থম কয়েক সপ্তাহে অস্ত্রোপচারের স্থানে চাপ পড়া এড়িয়ে চলুন। অস্ত্রোপচারের স্থানের ওপর একটি ছোট বালিশ বা তোয়ালে রাখার চেষ্টা করুন। আপনার কোনো পর্শ্ন থাকলে, আপনার নার্সের্র সঙ্গে কথা বলুন।

কয্ান্সার এবং এর চিকিৎসা আপনার চেহারা বা যৌনতার ওপর কী পর্ভাব ফেলতে পারে তা নিয়ে আপনার উদেব্গ থাকতে পারে। আমাদের নারী যৌন চিকিৎসা ও নারীর সব্াস্থয্ কমর্সূচি আপনাকে সাহাযয্ করার জনয্ উপলব্ধ রয়েছে। আরও তথেয্র জনয্ ৬৪৬-৮৮৮-৫০৭৬ নমব্রে কল করুন।

আপনার গভর্ধারণের সম্ভাবনা থাকলে, অবশয্ই জন্মনিয়ন্ত্রণ বয্বহার করুন। কোনো ধরনের হরমোনাল জন্মনিয়ন্ত্রণ বয্বহার করবেন না। আপনার জন্মনিয়ন্ত্রণের বিকল্পগুলো হলো:

- পুরুষ কনডম
- ডায়াফর্াম
- কপার টি আইইউডি (Copper T IUD) আপনি যদি এই পদ্ধতিতে আগর্হী হন, তাহলে আপনার স্তর্ীরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলুন। এই ধরনের আইইউডি ১০ বছর পযর্ন্ত রাখা যেতে পারে অথবা আগেই অপসারণ করা যেতে পারে।

আপনার চিকিৎসার সময় এবং আপনার ডাক্তার গভর্ধারণের চেষ্টা করা নিরাপদ বলে না বলা পযর্ন্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ বয্বহার চালিয়ে যান।

গাড়ি চালানো

অধিকাংশ লোক অস্ত্রোপচারের পর 6 সপ্তাহের মধেয্ পুনরায় গাড়ি চালানো শুরু করতে পারেন। পের্সকির্পশনে দেওয়া বয্থানাশক ওষুধ সেবন করার সময় গাড়ি চালাবেন না। এই ওষুধগুলো আপনাকে ঘুমঘুম বা তন্দর্াচ্ছন্ন করে তুলতে পারে, যার ফলে গাড়ি চালানো আপনার জনয্ নিরাপদ নাও হতে পারে। আপনি হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ার পর যাতর্ী হিসেবে যেকোনো সময় গাড়িতে চড়তে পারবেন।

এছাড়াও, নিম্নলিখিত অবস্থাগুলো না হওয়া পযর্ন্ত গাড়ি চালাবেন না:

- আপনার ডের্ন(গুলো) অপসারণ করা হয়েছে।
- আপনার সম্পূর্ণ নড়াচড়ার ক্ষমতা (রেঞ্জ অফ মোশন) পুনরুদ্ধার হয়েছে।
- আপনি সব্াচ্ছন্দেয্ স্টিয়ারিং হুইল ঘোরাতে পারেন।

আপনার জনয্ কখন গাড়ি চালানো নিরাপদ হবে সে সম্পর্কে কোনো পর্শ্ন থাকলে, আপনার

সব্াস্থয্সেবা পর্দানকারীর সঙ্েগ কথা বলুন।

কাজে ফিরে যাওয়া

আপনার কাজ সম্পকের্ আপনার সব্াস্থয্সেবা পর্দানকারীর সাথে কথা বলুন। আপনি যে কাজ করেন তার উপর ভিত্তি করে আপনার জনয্ আবার কাজ শুরু করা কখন নিরাপদ হতে পারে সেই বিষয়ে তারা আপনাকে জানাবে। যদি আপনাকে পর্চুর নড়াচড়া করতে হয় বা ভারী জিনিস উত্তোলন করতে হয়, তাহলে আপনাকে হয়তো আরো কিছু সময় কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হতে পারে। যদি আপনাকে ডেস্ক বসে থাকতে হয়, তাহলে আপনি হয়তো আরো দর্রুত কাজে ফিরে যেতে পারবেন।

লিম্ফেডেমা সম্পকের্

কখনও কখনও লিম্ফ নোড অপসারণ করলে আপনার লিম্ফয্াটিক সিস্টেমের সঠিকভাবে তরল নিষ্কাশন করা কঠিন হয়ে যেতে পারে। এটি হলে, যেখান থেকে লিম্ফ নোডগুলো অপসারণ করা হয়েছে সেই স্থানে লিম্ফয্াটিক তরল জমে যেতে পারে। এই অতিরিক্ত তরল জমার কারণে যে ফোলাভাব হয় তাকে লিম্ফেডেমা বলা হয়।

লিম্ফেডেমা আপনার আকর্ান্ত পাশে (যে পাশে লিম্ফ নোড অপসারণ করা হয়েছে) হাত, কনুই, স্তন বা দেহের অংশে হতে পারে।

বেশিরভাগ মানুষের লিম্ফেডেমা হয় না, তবে কিছু মানুষের হতে পারে। লিম্ফেডেমা হওয়ার ঝুঁকি একজন বয্ক্তির ক্ষেতের্ কতটা, তা নিধর্ারণ করা কঠিন, কারণ:


- লিম্ফেডেমা নিণর্য়ের জনয্ কোনো মানসম্মত পরীক্ষা নেই।
- লিম্ফ নোড অপসারণ বা ক্ষতিগর্স্ত হওয়া মানুষের ওপর ভিন্নভাবে পর্ভাব ফেলে।
- লিম্ফেডেমা অস্তের্াপচারের অল্প সময় পরও হতে পারে, আবার অনেক বছর পরেও হতে পারে।
- বতর্মান লিম্ফেডেমার কিছু ক্ষেতের্ পুরনো চিকিৎসা পদ্ধতির কারণে এটি হতে পারে।

লিমে্ফডেমা হওয়ার আপনার ঝুঁকি নিভর্র করে আপনার লিম্ফ নোডগুলো কীভাবে অপসারণ করা হয়েছে তার ওপর (চিতর্ ৩ দেখুন)।

সেনি্টনেল লিম্ফ নোড বায়োপসির সময়, আপনার বগল থেকে ১টি থেকে কয়েকটি লিম্ফ নোড অপসারণ করা হয় এবং কয্ান্সার কোষ আছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়। সেনি্টনেল লিম্ফ নোড বায়োপসির পরে লিমে্ফডেমা হওয়ার ঝুঁকি কম। সেনি্টনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি করা পর্তি ১০০ জনের মধেয্ পরা্য ০ থেকে ৭ জনের লিমে্ফডেমা হতে পারে।

অয্াকি্সলারি লিম্ফ নোড ডিসেকশনের সময়, আপনার বগল থেকে কয়েকটির বেশি লিম্ফ নোড অপসারণ করা হয়। এটি করা হয় এমন অতিরিক্ত লিম্ফ নোড অপসারণের জনয্, যেগুলোতে কয্ান্সার কোষ থাকতে পারে। অয্াকি্সলারি লিম্ফ নোড ডিসেকশনের পর লিমে্ফডেমা হওয়ার ঝুঁকি সেনি্টনেল নোড বায়োপসির তুলনায় বেশি। অয্াকি্সলারি লিম্ফ নোড ডিসেকশন করা পর্তি ১০০ জনের মধেয্ পরা্য ১৫ থেকে ২৫ জনের লিমে্ফডেমা হতে পারে।

কার লিমে্ফডেমা হবে তা নিশি্চতভাবে জানার কোনো উপায় নেই।



চিতর্ 3. লিমে্ফডেমা হওয়ার আনুমানিক ঝুঁকি

লিমে্ফডেমা হওয়ার ঝুঁকি কমানো

নিম্নলিখিত কাজগুলো করা লিমে্ফডেমা হওয়ার ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করতে পারে:

- সবা্স্থয্কর শরীরের ওজন বজায় রাখুন অথবা নিরাপদভাবে তা অজর্নের চেষ্টা করুন।
- নিয়মিত বয্ায়াম করুন এবং আপনার পেশিগুলো পর্সারিত (স্ট্রেচ্) করুন। আপনার জনয্ কোন বয্ায়ামগুলো উপযুক্ত, তা নিয়ে আপনার সাজর্ন বা নাসের্র সঙ্গে কথা বলুন।
    - আপনি যখন আবার বয্ায়াম ও শারীরিক কাযর্কলাপ শুরু করবেন, তখন ধীরে ধীরে ও পযরা্য়ক্রমে তা বাড়ান। আপনি যদি অসব্স্তি অনুভব করেন, তাহলে থেমে যান এবং বিরতি নিন। বয্ায়াম বয্থা সৃষ্টি করা উচিত নয়।
- আপনার হাত ও বাহুতে সংকর্মণের ঝুঁকি যতটা সম্ভব কমানোর চেষ্টা করুন। কাটা, আঁচড় এবং

পোড়ার যত্ন কীভাবে সবচেয়ে ভালোভাবে নেওয়া যায়, তা আপনার সব্াস্থয্সেবা পর্দানকারীর কাছে জিজ্ঞাসা করুন।

আপনার যদি সেন্ট্িনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি করা হয়ে থাকে:

- রক্ত নেওয়া, ইনজেকশন (শট), আইভি লাইন এবং রক্তচাপ মাপার জনয্ আপনার আকর্ান্ত বাহু বয্বহার করা ঠিক আছে। আপনার সব্াস্থয্সেবা পর্দানকারীদের অনুরোধ করুন, যদি সম্ভব হয় তবে তারা যেন আপনার অপর্ভাবিত বাহু বয্বহার করার চেষ্টা করেন।
- আপনি যদি লিম্েফডেমার কোনো লক্ষণ লক্ষয্ করতে শুরু করেন, তবে সবসময় আপনার অপর্ভাবিত বাহু বয্বহার করুন। এটি যদি সম্ভব না হয়, তাহলে কোন বাহু বয্বহার করা সবচেয়ে নিরাপদ হবে তা নিয়ে আপনার সব্াস্থয্সেবা পর্দানকারীর সাথে কথা বলুন।

আপনার যদি অয্াক্সিলারি লিম্ফ নোড ডিসেকশন করা হয়ে থাকে:

- পড়ুন। *Hand and Arm Guidelines After Your Axillary Lymph Node Dissection* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/hand-and-arm-care-after-removal-axillary-lymph-nodes)আপনার পর্কির্য়ার পর লিম্েফডিমার ঝুঁকি কমানোর বিষয়ে জানতে।

লিম্েফডিমার লক্ষণ

অস্তে্রাপচারের পর সামানয্ ফোলা সব্াভাবিক। ফোলাভাব সবের্াচ্চ ৬ সপ্তাহ পযর্ন্ত থাকতে পারে। এটি সাধারণত সাময়িক এবং ধীরে ধীরে সেরে যাবে। অস্তে্রাপচারের পর আপনি বয্থা বা অনয্ানয্ অনুভূতিও পেতে পারেন, যেমন হঠাৎ খোঁচা লাগার মতো অনুভূতি এবং ঝিনঝিন করা। এই অনুভূতিগুলো সাধারণ এবং এগুলো অবশয্ই লিম্েফডিমার লক্ষণ নয়।

আপনি যদি লিম্েফডিমা হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন, তাহলে আপনার আকর্ান্ত হাত, বাহু, স্তন এবং শরীরের ধড়ে এই লক্ষণগুলোর দিকে নজর রাখুন:

- ভারী লাগা, বয্থা বা যন্তর্ণা অনুভব করা
- তব্কে টানটান ভাব অনুভব করা
- কম নমনীয়তা
- তব্কের পরিবতর্ন, যেমন টানটান ভাব বা পিটিং (চাপ দিলে যে তব্কে দাগ পড়ে যায় এবং পরে সেই দাগ থেকে যায়)

আপনার যদি লিম্েফডিমার কোনো লক্ষণ থাকে বা আপনি নিশ্চিত না হন, তাহলে আপনার সব্াস্থয্সেবা পর্দানকারীর সাথে যোগাযোগ করুন।

লিম্ফেডিমা সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, আপনি নিউ ইয়র্ক স্টেট ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথের রিসোর্সটিও পড়তে পারেন।লিম্ফেডিমা বোঝা।

আপনার অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করুন

গুরুতর অসুস্থতার কারণে অস্ত্রোপচারের পরে আপনার নতুন এবং বিরক্তিকর অনুভূতি হতে পারে। অনেকে জানিয়েছেন তারা কখনও না কখনও কান্না, দুঃখিত, চিন্তিত, নাভর্াস, বিরক্তি বা রাগানিব্ত বোধ করেছিল। আপনি হয়তো বুঝতে পারবেন যে এই ধরনের কিছু অনুভূতি আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। এমনটি ঘটলে মানসিক সহায়তা খোঁজা একটি ভালো ধারণা। আপনার সব্াস্থয্সেবা পর্দানকারী আপনাকে MSK-এর কাউন্সেলিং সেন্টারে পাঠাতে পারেন। আপনি 646-888-0200 নমব্রে কল করে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

আপনি কেমন অনুভব করছেন সে সম্পর্কে কথা বলাই হলো মোকাবেলা করার পর্থম ধাপ। বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সদসয্রা সাহায্য করতে পারেন। আমরা আপনাকে আশব্স্ত করতে, সহায়তা করতে এবং নির্দেশনা পর্দান করতে পারি। আপনি, আপনার পরিবার এবং আপনার বন্ধুরা মানসিকভাবে কেমন অনুভব করছেন তা আমাদেরকে অবহিত করা সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার এবং আপনার পরিবারের জন্য অনেক রিসোর্স রয়েছে। আমরা আপনাকে এবং আপনার পরিবার ও বন্ধুদের আপনার অসুস্থতার মানসিক দিকগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সহায়তা করতে এখানে এসেছি। আপনি হাসপাতালে বা বাড়িতে যেখনেই থাকুন না কেন আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারব।

আপনার সব্াস্থয্সেবা পর্দানকারীকে যখন ফোন করবেন

আপনার সব্াস্থয্সেবা পর্দানকারীকে ফোন করুন, যদি:

- আপনার জব্র ১০০.৪°F (৩৮°C) বা তার বেশি।
- আপনার কাটার জায়গা (অস্ত্রোপচারের ক্ষত) থেকে তরল বের হচ্ছে।
- আপনার শব্াস নিতে কষ্ট হচ্ছে।
- আপনার কাটার জায়গার আশেপাশের তব্ক সব্াভাবিকের চেয়ে বেশি উষ্ণ।
- আপনার কাটার জায়গার আশেপাশে অসব্স্তি বেড়ে গেছে।
- আপনার কাটার জায়গার আশেপাশের তব্ক সব্াভাবিকের চেয়ে বেশি লাল হয়ে গেছে।
- আপনার কাটার জায়গার আশেপাশের অংশে ফোলাভাব শুরু হচ্ছে।
- আপনার কাটার জায়গার আশেপাশের ফোলাভাব আরও বেড়ে যাচ্ছে।
- আপনার কোনো পর্শ্ন বা উদেব্গ থাকে।

যোগাযোগের তথয্

আপনার কোনো পর্শ্ন বা উদেব্গ থাকলে আপনার সব্াস্থয্সেবা পর্দানকারীর সাথে যোগাযোগ করুন। আপনার সেবাপর্দানকারী দলের একজন সদসয্ সোমবার থেকে শুকর্বার সকাল 9 টা থেকে বিকাল 5 টা পযর্ন্ত উত্তর দেবেন। এই সময়ের বাইরে, আপনি একটি বাতর্া পাঠাতে পারেন বা অনয্ MSK পর্দানকারীর সাথে কথা বলতে পারেন। কলে সবর্দা একজন ডাক্তার বা নাসর্কে পাবেন।

আপনার সব্াস্থয্সেবা পর্দানকারীর সাথে কীভাবে যোগাযোগ করবেন তা আপনি নিশ্চিত না হলে, 212-639-2000 নমব্রে কল করুন।

সহায়তামূলক পরিষেবা

এই বিভাগে সহায়তামূলক পরিষেবাসমূহের একটি তালিকা রয়েছে। আপনি যখন আপনার অস্তেরা্পচারের জনয্ পর্স্তুত হন এবং আপনার অস্তেরা্পচারের পরে দর্রুত সুস্থ করেন তখন তারা আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

আপনি এই বিভাগটি পড়ার সাথে সাথে আপনার সব্াস্থয্সেবা পর্দানকারীকে জিজ্ঞাসা করার জনয্ পর্শ্নাবলী লিখুন।

MSK সহায়তামূলক পরিষেবা

ভর্তি সংকর্ান্ত অফিস
212-639-7606
আপনার হাসপাতালে ভর্তি সম্পর্কে আপনার যদি কোনো পর্শ্ন থাকে, যেমন একটি বয্ক্তিগত কক্ষ চাইলে কল করুন।

অয্ানেস্থেসিয়া
212-639-6840
অয্ানেস্থেসিয়া সম্পর্কিত আপনার কোনো পর্শ্ন থাকলে কল করুন।

ব্লাড ডোনার রুম
212-639-7643
আপনি যদি রক্ত বা প্লেটলেট দান করতে আগর্হী হন তাহলে তথেয্র জনয্ কল করুন।

Bobst International Center
www.msk.org/international
888-675-7722

আমরা বিশেব্র সকল দেশের রোগীদের সব্াগত জানাই এবং বিভিন্ন রকমের সেবাদান করে থাকি। আপনি যদি একজন আন্তজর্াতিক রোগী হন তাহলে আপনার পরিচযর্ার বয্বস্থা করতে সহায়তার জনয্ কল করুন।

কাউন্সেলিং সেন্টার
www.msk.org/counseling
646-888-0200
অনেকে কাউন্সেলিং সাভির্সটিকে সহায়ক বলে মনে করেন। আমাদের কাউন্সেলিং সেন্টার বয্ক্তিগত, দম্পতি, পরিবার এবং গোষ্ঠীর জনয্ কাউন্সেলিং পরিষেবা পর্দান করে। আপনি যদি উদিব্গ্ন বা বিষণ্ণতা বোধ করেন তাহলে আমরা সাহাযয্ করার জনয্ ওষুধও লিখে দিতে পারি। অয্াপয়েন্টমেন্ট নিতে, আপনার কেয়ার টিমের একজন সদসয্কে রেফারেলের জনয্ বলুন বা উপরের নমব্রে কল করুন।

ফুড পয্ান্ট্রি প্রোগর্াম
646-888-8055
কয্ান্সারের চিকিৎসার সময় আমরা অভাবী বয্ক্তিদের খাবার দিই। আরো জানতে আপনার কেয়ার টিমের একজন সদসয্দের সাথে কথা বলুন বা উপরের নমব্রে কল করুন।

ইন্টিগের্টিভ মেডিসিন ও ওয়েলনেস সাভির্স
www.msk.org/integrativemedicine
আমাদের ইন্টিগের্টিভ মেডিসিন ও ওয়েলনেস সাভির্স ঐতিহয্গত চিকিৎসাগত পরিচযর্ার পরিপূরক (এর মতো) অনেক পরিষেবা অফার করে। উদাহরণসব্রূপ, মিউজিক থেরাপি, মাইন্ড/বডি থেরাপি, ডয্ান্স অয্ান্ড মুভমেন্ট থেরাপি, যোগবয্ায়াম এবং টাচ থেরাপি। এই পরিষেবাগুলোর জনয্ একটি অয্াপয়েন্টমেন্ট নিতে, 646-449-1010 নমব্রে কল করুন।

এছাড়াও আপনি ইন্টিগের্টিভ মেডিসিন ও ওয়েলনেস সাভির্সে একজন সব্াস্থয্ সেবাদানকারীর সাথে পরামশের্র সময়সূচীও নিধর্ারণ করতে পারেন। তারা একটি সব্াস্থয্কর জীবনধারা গঠন এবং পাশব্র্প্রতিকির্য়া নিয়ন্তর্ণ করার জনয্ একটি পরিকল্পনা তৈরিতে আপনার সাথে কাজ করবেন। পরামশের্র জনয্ অয্াপয়েন্টমেন্ট নিধর্ারণ করতে 646-608-8550 নমব্রে কল করুন।

MSK লাইবের্রি
library.mskcc.org
আপনি আমাদের লাইবের্রির ওয়েবসাইটে ঘুরে আসতে পারেন বা লাইবের্রির রেফারেন্স কমর্ীদের সাথে কথা বলতে ইমেইল করতে পারেনasklibrarian@mskcc.orgঠিকানায়। তারা আপনাকে এক ধরনের কয্ান্সার সম্পকের্ আরো তথয্ খুঁজে পেতে সহায়তা করতে পারেন। আপনি লাইবের্রির রোগী শিক্ষা রিসোসর্ গাইডওদেখতে পারেন।

পুষ্টি বিষয়ক পরিষেবা
www.msk.org/nutrition
212-639-7312
আমাদের পুষ্টি বিষয়ক পরিষেবা আমাদের ক্লিনিকাল ডায়েটিশিয়ান পুষ্টিবিদদের মধ্যে একজনের সাথে পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করে। আপনার ক্লিনিকাল ডায়েটিশিয়ান পুষ্টিবিদ আপনার খাদ্যাভ্যাস সম্পর্কে আপনার সাথে কথা বলবেন। চিকিৎসার সময় ও পরে কী খাওয়া উচিত সে বিষয়েও তিনি পরামর্শ দিতে পারেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে, আপনার কেয়ার টিমের একজন সদস্যকে রেফারেলের জন্য বলুন বা উপরের নম্বরে কল করুন।

রোগী ও কমিউনিটির শিক্ষা
www.msk.org/pe
শিক্ষামূলক তথ্যসূত্র, ভিডিও এবং অনলাইন প্রোগ্রাম অনুসন্ধান করতে আমাদের রোগী ও কমিউনিটির শিক্ষা সম্পর্কিত ওয়েবসাইটটি দেখুন।

রোগীর বিল
646-227-3378
আপনার বিমা কোম্পানির সাথে পূর্ব-অনুমোদন সম্পর্কে আপনার প্রশ্ন থাকলে কল করুন। একে পূর্ব-অনুমোদনও বলা হয়।

রোগীর প্রতিনিধি অফিস
212-639-7202
হেলথ কেয়ার প্রক্সি ফর্ম বা আপনার পরিচর্যা সম্পর্কে উদ্বেগ বিষয়ক আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কল করুন।

পেরিঅপারেটিভ নার্স লিয়াজোঁ
212-639-5935
আপনার অস্ত্রোপচারের সময় MSK কোনো তথ্য প্রকাশ করার বিষয়ে আপনার প্রশ্ন থাকলে কল করুন।

ব্যক্তিগত কর্তব্যরত নার্স ও সহচর
646-357-9272
আপনি হাসপাতালে ও বাড়িতে আপনার পরিচর্যার জন্য ব্যক্তিগত নার্স বা সহচরদের অনুরোধ করতে পারেন। আরো জানতে কল করুন।

পুনর্বাসন পরিষেবা
www.msk.org/rehabilitation

কয্ান্সার ও কয্ান্সারের চিকিৎসা আপনার শরীরকে দুবর্ল, শক্ত বা টান অনুভব করাতে পারে। কিছু লিম্ফেডেমা (ফোলাভাব) হতে পারে। আমাদের ফিজিওথেরাপিস্ট (পুনবর্াসন মেডিসিন ডাক্তার), পেশাগত থেরাপিস্ট (OT) এবং ফিজিকয্াল থেরাপিস্ট (PT) আপনাকে আপনার সব্াভাবিক কাজকমের্ ফিরে যেতে সহায়তা করতে পারেন।

- **পুনবর্াসন মেডিসিন ডাক্তাররা** এমন সমসয্া নিণর্য় করে এবং চিকিৎসা করে যা আপনার চলাফেরা ও কাযর্কলাপকে পর্ভাবিত করে। তারা MSK-কে বা বাড়ির কাছাকাছি কোথাও আপনার পুনবর্াসন থেরাপি পের্াগর্াম্টি ডিজাইন এবং সমনব্য় করতে সহায়তা করতে পারেন। আরো জানতে, 646-888-1929 নমব্রে পুনবর্াসন মেডিসিন (ফিজিয়য্াটির্)-এ কল করুন।
- আপনার সব্াভাবিক দৈনন্দিন কাজকমর্ করতে সমসয্া হলে একজন OT সাহাযয্ করতে পারেন। উদাহরণসব্রূপ, তিনি দৈনন্দিন কাজ সহজ করতে সহায়তা করার জনয্ সরঞ্জামের পরামশর্ দিতে পারেন। একজন PT আপনাকে শক্তি ও নমনীয়তা তৈরি করতে বয্ায়াম শেখাতে পারেন। আরো জানতে, 646-888-1900 নমব্রে পুনবর্াসন থেরাপি-তে কল করুন।

কয্ান্সারের পরে জীবনের জনয্ রিসোসর্ (RLAC) পের্াগর্াম
646-888-8106
MSK-এ, আপনার চিকিৎসার পর পরিচযর্া শেষ হয় না। যেসব রোগীরা এবং তাদের পরিবার চিকিৎসা শেষ করেছেন RLAC পের্াগর্াম তাদের জনয্।

এই পের্াগর্ামের অনেক পরিষেবা রয়েছে। আমরা সেমিনার, কমর্শালা, সহায়তা গর্ুপ এবং চিকিৎসার পরে জীবন সম্পকের্ পরামশর্ পর্দান করি। আমরা বিমা ও কমর্সংস্থানের বিষয়েও সহায়তা করতে পারি।

যৌন সব্াস্থয্ পের্াগর্াম
কয্ান্সার ও কয্ান্সারের চিকিৎসা আপনার যৌন সব্াস্থয্, পর্জনন ক্ষমতা বা উভয়কেই পর্ভাবিত করতে পারে। MSK-কে এর যৌন সব্াস্থয্ পের্াগর্াম আপনার চিকিৎসার আগে, চিকিৎসা চলাকালীন বা পরে আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

- আমাদের ফিমেল সেক্সুয়াল মেডিসিন অয্ান্ড উইমেনস হেলথ পের্াগর্াম যৌন সব্াস্থয্ সমসয্া যেমন অকাল মেনোপজ বা পর্জনন ক্ষমতার সমসয্ায় সাহাযয্ করতে পারে। আপনার MSK কেয়ার টিমের একজন সদসয্কে রেফারেলের জনয্ বলুন বা আরো জানতে 646-888-5076 নমব্রে কল করুন।
- আমাদের মেল সেক্সুয়াল অয্ান্ড রিপের্াডাক্টিভ মেডিসিন পের্াগর্াম যৌন সব্াস্থয্ সমসয্া, যেমন ইরেক্টাইল ডিসফাংশন (ED) এ সহায়তা করতে পারে। আপনার কেয়ার টিমের একজন সদসয্কে রেফারেলের জনয্ বলুন বা আরো জানতে 646-888-6024 নমব্রে কল করুন।

সমাজ কমর্ী
www.msk.org/socialwork
212-639-7020
সমাজকমর্ীরা রোগী, পরিবার ও বন্ধুদের কয্ান্সারে আকর্ান্ত বয্ক্তিদের জনয্ সাধারণ সমসয্া মোকাবেলায় সহায়তা করেন। তারা আপনার চিকিৎসা জুড়ে পৃথক পরামশর্ ও সহায়তা গোষ্ঠী পর্দান করেন। তারা আপনাকে শিশু ও পরিবারের অনয্ান্য সদসয্দের সাথে যোগাযোগ করতে সহায়তা করতে পারেন।

আমাদের সামজকমর্ীরা আপনাকে কমিউনিটি এজেন্সি ও পের্াগর্ামগুলোতে রেফার করতে সহায়তা করতে পারেন। যদি আপনার বিল পরিশোধ করতে সমসয্া হয়, তাদের কাছে আথির্ক রিসোসর্ সম্পকের্ও তথয্ রয়েছে। আরো জানতে উপরের নমব্রে কল করুন।

আধয্াত্মিক পরিচযর্া
212-639-5982
আমাদের চয্াপলিনরা (আধয্াত্মিক পরামশর্দাতারা) শুনতে, পরিবারের সদসয্দের সহায়তা করতে এবং পর্াথর্না করার জনয্ রয়েছেন। তারা কমিউনিটির পাদর্ী বা বিশব্াসী গোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, বা কেবল একজন সান্তব্নাদায়ক সহচর এবং আধয্াত্মিক উপস্থিতি হতে পারেন। যেকেউ আধয্াত্মিক পরিচযর্া চাইতে পারেন। আপনার কোনো ধমর্ীয় সম্পৃক্ততা (কোনো ধমের্র সাথে সংযোগ) থাকতে হবে না।

MSK-এর আন্তঃধমর্ীয় চয্াপেল মেমোরিয়াল হাসপাতালের পর্ধান লবির কাছে অবস্থিত। এটি দিনে 24 ঘণ্টা খোলা থাকে। আপনার যদি জরুরি অবস্থা থাকে তাহলে 212-639-2000 নমব্রে কল করুন। কলে চয্াপলিনকে চান।

টোবাকো টির্টমেন্ট পের্াগর্াম
www.msk.org/tobacco
212-610-0507
আপনি যদি ধুমপান তয্াগ করতে চান, MSK এর বিশেষজ্ঞ আছেন যারা সাহাযয্ করতে পারেন। আরো জানতে কল করুন।

ভাচুর্য়াল পের্াগর্াম
www.msk.org/vp
আমরা রোগী ও পরিচযর্াকারীদের জনয্ অনলাইনে শিক্ষা ও সহায়তা পর্দান করি। এগুলো লাইভ সেশন যেখানে আপনি কথা বলতে বা কেবল শুনতে পারেন। আপনি আপনার রোগ নিণর্য়, চিকিৎসার সময় কী আশা করবেন এবং কিভাবে আপনার কয্ান্সারের পরিচযর্ার জনয্ পর্স্তুতি নেবেন তা সম্পকের্ শিখতে পারেন।

সেশনগুলো বয্ক্তিগত, বিনামূলেয্ এবং বিশেষজ্ঞ কতৃর্ক পরিচালিত হয়। ভাচুর্য়াল পেরা্গরা্ম সম্পকের্ জানতে বা নিবন্ধন করতে আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন।

স্তন কয্ান্সার সহায়তা সেবা

ভাগ করা

www.sharecancersupport.org

৮৪৪-ASK-SHARE (২৭৫-৭৪২৭)

ময্ানহাটন, কুইন্স, বর্ুকলিন এবং স্টয্াটেন আইলয্ান্ডে স্তন কয্ান্সার, মেটাস্টয্াটিক স্তন কয্ান্সার এবং ওভারি (ডিমব্াশয়) কয্ান্সার থেকে বেঁচে থাকা বয্ক্তিদের জনয্ সহায়তা গর্ুপ পর্দান করে।

সুসান জি. কোমেন

www.komen.org

স্তন কয্ান্সারে আকর্ান্ত বয্ক্তিদের জনয্ তথয্ ও সহায়তা সেবা পর্দান করে।

টির্পল নেগেটিভ বের্স্ট কয্ান্সার ফাউন্ডেশন

www.tnbcfoundation.org

টির্পল নেগেটিভ স্তন কয্ান্সার সম্পকের্ মানুষকে বোঝাতে সাহাযয্ করার জনয্ তথয্ পর্দান করে।

বাহিয্ক সহায়তামূলক পরিষেবা

অয্াক্সেস-এ-রাইড

web.mta.info/nyct/paratran/guide.htm

877-337-2017

নিউ ইয়কর্ সিটিতে, পর্তিবন্ধী বয্ক্তি যারা পাবলিক বাস বা সাবওয়েতে যেতে পারেন না তাদের জনয্ MTA শেয়ার করা রাইড, ডোর-টু-ডোর পরিষেবা পর্দান করে।

এয়ার চয্ারিটি নেটওয়াকর্

www.aircharitynetwork.org

877-621-7177

চিকিৎসা কেন্দের্ যাতায়াতের বয্বস্থা করে।

আমেরিকান কয্ান্সার সোসাইটি (ACS)

www.cancer.org

800-ACS-2345 (800-227-2345)

কয্ান্সারের চিকিৎসার সময় রোগী ও শুশর্ুষাপর্দানকারীদের থাকার জনয্ বিনামূলেয্র জায়গা হোপ

লজ সহ বিভিন্ন তথ্য ও পরিষেবা পরদান করে।

কয্যান্সার ও কয্যারিয়ার
www.cancerandcareers.org
646-929-8032
কয্যান্সারে আকরান্ত কমরীদের জনয্ শিক্ষা, সরঞ্জাম এবং ইভেন্টের জনয্ একটি রিসোসর্।

কয্যান্সার*কেয়ার*
www.cancercare.org
800-813-4673
275 সেভেনথ অয্াভিনিউ (ওয়েস্ট 25তম ও 26তম স্ট্রিটের মধেয্)
নিউ ইয়কর্, NY 10001
কাউন্সেলিং, সাপোটর্ গরুপ, শিক্ষামূলক কমর্শালা, পর্কাশনা এবং আথির্ক সহায়তা পরদান করে।

কয্যান্সার সাপোটর্ কমিউনিটি
www.cancersupportcommunity.org
কয্যান্সারে আকরান্ত বয্ক্তিদের সহায়তা ও শিক্ষা পরদান করে।

কেয়ারগিভার অয্াকশন নেটওয়াকর্
www.caregiveraction.org
800-896-3650
দীঘর্স্থায়ী অসুস্থতা বা অকষমতাযুক্ত পিরয়জনদের পরিচযরা্ করা লোকদের জনয্ শিক্ষা ও সহায়তা পরদান করে।

কপের্ারেট অয্াঞ্জেল নেটওয়াকর্
www.corpangelnetwork.org
866-328-1313
কপের্ারেট জেটগুলোতে খালি আসন বয্বহার করে সারা দেশে চিকিৎসার জনয্ বিনামূলেয্ ভর্মণের সুযোগ পরদান করে।

গুড ডেস
www.mygooddays.org
877-968-7233
চিকিৎসার সময় কোপেমেন্ট পরদানের জনয্ আথির্ক সহায়তা পরদান করে। রোগীদের অবশয্ই চিকিৎসা বিমা থাকতে হবে, আয়ের মানদণ্ড পূরণ করতে হবে এবং গুড ডেজ ফমুর্লারির অংশ

হিসাবে ওষুধ নিধর্ারণ করতে হবে।

হেলথওয়েল ফাউন্ডেশন
www.healthwellfoundation.org
800-675-8416
নিদির্ষ্ট ওষুধ ও থেরাপির জনয্ কোপেমেন্ট, সব্াস্থয্সেবা পির্মিয়াম এবং কতর্নযোগয্ আওতাধীন করার জনয্ আথির্ক সহায়তা পর্দান করে।

জো'স হাউস
www.joeshouse.org
877-563-7468
কয্ান্সারে আকর্ান্ত বয্ক্তি ও তাদের পরিবারের জনয্ চিকিৎসা কেন্দের্র কাছাকাছি থাকার জায়গার একটি তালিকা পর্দান করে।

LGBT কয্ান্সার পর্জেক্ট
www.lgbtcancer.com
অনলাইন সহায়তা গোষ্ঠী এবং LGBT-বান্ধব কি্লনিকাল টর্ায়ালের একটি ডাটাবেস সহ LGBT কমিউনিটির জনয্ সহায়তা এবং সমথর্ন পর্দান করে।

লাইভস্টর্ং ফার্টির্লিটি
www.livestrong.org/fertility
855-744-7777
কয্ান্সারে আকর্ান্ত রোগী এবং বেঁচে থাকা বয্ক্তিদের পর্জনন তথয্ এবং সহায়তা পর্দান করে যাদের মেডিকেল চিকিৎসা বন্ধয্াতেব্র সাথে সম্পকির্ত ঝুঁকি রয়েছে।

লুক গুড ফিল বেটার পের্াগর্াম
www.lookgoodfeelbetter.org
800-395-LOOK (800-395-5665)
এই পের্াগর্ামটি আপনার চেহারা সম্পকের্ আরো ভালো বোধ করতে সহায়তা করার জনয্ আপনি যা করতে পারেন তা শিখতে কমর্শালা পর্দান করে। আরো তথেয্র জনয্ বা কোনো কমর্শালার জনয্ সাইন আপ করতে, উপরের নমব্রে কল করুন বা পের্াগর্ামের ওয়েবসাইটে যান।

নয্াশনাল কয্ান্সার ইনস্টিটিউট
www.cancer.gov
800-4-CANCER (800-422-6237)

নয্াশনাল কাউন্সিল অন এজিং (NCOA)

www.benefitscheckup.org
বয়স্কদের জনয্ তথয্ ও সহায়ক সম্পদ পর্দান করে। BenefitsCheckUp® নামের একটি বিনামূলেয্র অনলাইন টুল পর্দান করে, যা আপনাকে পের্সকির্পশন সহায়তা কমর্সূচির সঙ্গে যুক্ত করে, যার মধেয্ মেডিকেয়ারের Extra Help পের্াগর্ামও অন্তভুর্ক্ত।

নয্াশনাল LGBT কয্ান্সার নেটওয়াকর্
www.cancer-network.org
LGBT কয্ান্সার থেকে বেঁচে যাওয়া ও যারা ঝুঁকিতে রয়েছে তাদের জনয্ শিক্ষা, পর্শিক্ষণ ও সহায়তা পর্দান করে।

নিডি মেডস
www.needymeds.org
বর্য্যান্ড ও জেনেরিক নামের ওষুধের জনয্ রোগীর সহায়তা পের্াগর্ামের তালিকাভুক্ত করে।

NYRx
www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/pharmacy.htm
নিউ ইয়কর্ স্টেটে সরকারি খাতের নিয়োগকতর্াদের যোগয্ কমর্চারী ও অবসরপর্াপ্তদের পের্সকির্পশন সুবিধা পর্দান করে।

পেশেন্ট অয্াক্সেস নেটওয়াকর্ (PAN) ফাউন্ডেশন
www.panfoundation.org
866-316-7263
বিমা রয়েছে এমন রোগীদের জনয্ কোপেমেন্ট সহায়তা দেয়।

পেশেন্ট অয্াডভোকেট ফাউন্ডেশন
www.patientadvocate.org
800-532-5274
পরিচযর্া, আথির্ক সহায়তা, বিমা সহায়তা, চাকরি ধরে রাখার সহায়তা এবং জাতীয় অপযর্াপ্ত বিমা কভার থাকা রিসোসর্ ডিরেক্টরিতে অয্াক্সেস পর্দান করে।

রেড ডোর কমিউনিটি (সাধারণত গিল্ডা'স ক্লাব নামে পরিচিত)
www.reddoorcommunity.org
212-647-9700
এমন একটি জায়গা যেখানে কয্ান্সারে আকর্ান্ত বয্ক্তিরা নেটওয়াকির্ং, কমর্শালা, বক্তৃতা এবং সামাজিক কাযর্কলাপের মাধয্মে সামাজিক ও মানসিক সহায়তা পান।

RxHope

www.rxhope.com
877-267-0517
যে সকল মানুষ ওষুধ কিনতে আথির্ক সঙ্কটে পড়ে তাদের আথির্ক সহায়তা পর্দান করে।

টির্য়াজ কয্যান্সার
www.triagecancer.org
কয্যান্সার রোগীদের এবং তাদের পরিচযর্াকারীদের জনয্ আইনি, চিকিৎসা এবং আথির্ক তথয্ এবং রিসোসর্ পর্দান করে।

শিক্ষামূলক তথয্সূতর্

এই নিদের্শিকায় উল্লেখিত শিক্ষামূলক তথয্সূতের্র তালিকা এই বিভাগটি করে। এগুলো আপনার অস্তেরা্পচারের জনয্ পর্স্তুত হওয়া এবং আপনার অস্তেরা্পচারের পরে দর্ুত সুস্থ হওয়ার জনয্ আপনাকে সহায়তা করবে।

আপনি এই তথয্সূতর্ পড়ার সাথে সাথে আপনার সবা্স্থয্সেবা পর্দানকারীকে জিজ্ঞাসা করার জনয্ পর্শ্নাবলী লিখুন।

- *A Guide for Caregivers* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/guide-caregivers)
- *Advance Care Planning for People With Cancer and Their Loved Ones* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/advance-care-planning)
- *Call! Don't Fall!* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/call-dont-fall)
- *Caring for Your Jackson-Pratt Drain* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/caring-your-jackson-pratt-drain)
- *Clear Liquid Diet* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/clear-liquid-diet)
- *Common Questions About MSK's Recovery Tracker* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/mymsk-recovery-tracker)
- *Eating and Drinking Before Your Surgery or Procedure When Taking GLP-1 Medicines* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/eating-and-drinking-before-your-surgery-or-procedure-when-taking-glp-1-medicines)
- *মাস্টেকটমি বা স্তন পুনগর্ঠনের অস্তেরা্পচারের পর বয্ায়াম* (www.mskcc.org/bn/cancer-care/patient-education/exercises-after-

mastectomy-or-reconstruction)

- *Fertility Preservation Before Cancer Treatment: Options for People Born with Ovaries and a Uterus* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/fertility-preservation-females-starting-treatment)
- *Frequently Asked Questions About Walking After Your Surgery* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/frequently-asked-questions-about-walking-after-your-surgery)
- *Hand and Arm Guidelines After Your Axillary Lymph Node Dissection* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/hand-and-arm-care-after-removal-axillary-lymph-nodes)
- *Herbal Remedies and Cancer Treatment* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/herbal-remedies-and-treatment)
- *How To Be a Health Care Agent* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-be-health-care-agent)
- *How To Check if a Medicine or Supplement Has Aspirin, Other NSAIDs, Vitamin E, or Fish Oil* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids)
- *How To Use Your Incentive Spirometer* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-use-your-incentive-spirometer)
- *Resources, Clothing, and Support After Breast Surgery* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/resources-clothing-support-breast-surgery)
- লিমে্ফডিমা বোঝা
- *What You Can Do To Avoid Falling* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/what-you-can-do-avoid-falling)

আপনার কোনো পর্শ্ন বা উদেব্গ থাকলে আপনার সব্াস্থয্সেবা পর্দানকারীর সাথে যোগাযোগ করুন। আপনার পরিচযর্া দলের একজন সদসয্ সোমবার থেকে শুকর্বার পযর্ন্ত উত্তর দেবেন সকাল 9:00 টা থেকে বিকেল 5:00 টার পর এই সময়ের বাইরে, আপনি একটি বাতর্া রেখে যেতে পারেন বা অনয্ একজন MSK পর্দানকারীর সাথে কথা বলতে পারেন। কলে সবর্দা একজন ডাক্তার বা নাসর্কে পাবেন। আপনি যদি আপনার সব্াস্থয্সেবা পর্দানকারীর সঙ্েগ কীভাবে যোগাযোগ করবেন তা নিশ্চিত না হন, তাহলে ফোন করুন। ২১২-৬৩৯-২০০০.

আরো রিসোসের্র জনয্ www.mskcc.org/pe-এ ভিজিট করে আমাদের ভাচুর্য়াল লাইবের্রি দেখুন।

Memorial Sloan Kettering Cancer Center কতৃর্ক সবর্সব্তব্ সংরক্ষিত