



রোগী এবং শুরুরকারীর শিক্ষা

আপনার মাস্টেকটমি সম্পর্কে

এই নির্দেশিকাটি আপনাকে MSK-এ আপনার মাস্টেকটমি (স্তন অস্ত্রোপচার)-এর জন্য পরস্তুত হতে সাহায্য করবে। আপনি সুস্থ হয়ে ওঠার সময় কী হতে পারে তা জানতেও এটি আপনাকে সাহায্য করবে।

আপনার অস্ত্রোপচারের দিন পরন্ত তথ্যের সোর্স হিসেবে এই নির্দেশিকাটি ব্যবহার করুন। আপনার অস্ত্রোপচারের দিন এটি আপনার সাথে নিয়ে আসুন। আপনি এবং আপনার পরিচরাকারী দল এটি ব্যবহার করবেন যাতে আপনার আরোগ্য লাভ করা সম্পর্কে আরো জানতে পারেন।

আপনার মাস্টেকটমি সম্পর্কে

এই গাইডে বিভিন্ন ধরনের স্তন অস্ত্রোপচার সম্পর্কে তথ্য রয়েছে।
আপনার থাকতে পারে:

- একটি সম্পূর্ণ মাস্টেকটমি।
- একটি সম্পূর্ণ মাস্টেকটমি এবং সেন্টিনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি।
- একটি সম্পূর্ণ মাস্টেকটমি এবং সেন্টিনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি, সম্ভাব্য অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড ডিসেকশনসহ।
- একটি সম্পূর্ণ স্তন অপসারণ (মাস্টেকটমি) এবং বগলের (অ্যাক্সিলারি) লিম্ফ নোড অপসারণের অস্ত্রোপচার (যাকে মডিফাইড র‍্যাডিক্যাল মাস্টেকটমিও বলা হয়)।
- আরেকটি অনুরূপ অস্ত্রোপচার।

আপনি যদি স্তন পুনগঠন করান, তাহলে আপনার প্লাস্টিক সাজরন আপনাকে আরও তথ্য দেবেন।

সম্পূর্ণ মাস্টেকটমি

একটি টোটাল মাস্টেকটমি হলো আপনার স্তনের সমস্ত টিসুয় অপসারণের জন্য করা একটি অস্ত্রোপচার। এটি সাধারণত আপনার বুকে একটি চেরা (সাজিরক্যাল কাট) দিয়ে করা হয়, তবে এটি বিভিন্ন উপায়ে করা যেতে পারে। আপনার স্তন সাজরন আপনার সাথে আলোচনা করবেন কোন বিকল্পটি আপনার জন্য সঠিক।

আপনার অস্ত্রোপচারের সময়, আপনার সাজরন আপনার বগল থেকে এক বা একাধিক লিম্ফ নোডও অপসারণ করতে পারেন। একজন প্যাথলজিস্ট লিম্ফ নোড(গুলো) পরীক্ষা করবেন যাতে দেখা যায় ক্যান্সার সেগুলোতে ছড়িয়ে পড়েছে কি না।

সেনিটনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি

সেনিটনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি হলো যখন আপনার বগলের প্রথম লিম্ফ নোড(গুলো), যেগুলো স্তনের টিউমার থেকে নিঃসরণ গ্রহণ করে, সেগুলো অপসারণ করে ক্যান্সার কোষ আছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়। এই লিম্ফ নোডগুলোকে সেনিটনেল লিম্ফ নোড বলা হয়। যদি ক্যান্সার কোষ ছড়িয়ে পড়ে, তবে সেনিটনেল লিম্ফ নোডগুলো সাধারণত প্রথম স্থান যেখানে তারা যায়। আপনার সাজরন আপনার স্তনে একটি বিশেষ রং ইনজেক্ট করে সেনিটনেল নোড(গুলো) শনাক্ত করবেন।

আপনার যদি সেনিটনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি করা হয়, তাহলে আপনার অস্ত্রোপচারের অংশ হিসেবে লিম্ফ্যাটিক ম্যাপিং করা হতে পারে। এই প্রক্রিয়া সম্পর্কে আরও তথ্য এই গাইডের পরবর্তী অংশে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

আপনার অস্ত্রোপচারের সময় আপনার সাজরন সেনিটনেল লিম্ফ নোড(গুলি)

পরীক্ষার জন্য প্যাথলজিস্টের কাছে পাঠাতে পারেন। যদি প্যাথলজিস্ট কোনো ক্যান্সার কোষ দেখতে পান, তাহলে আপনার সাজর্ন তখন বগলের লিম্ফ নোড ডিসেকশন করতে পারেন।

বগলের লিম্ফ নোড অপসারণের অস্েত্রাপচার.

বগলের অধিকাংশ বা সব লিম্ফ নোড (লসিকা গর্ন্থ) অপসারণের অস্েত্রাপচারকে অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড ডিসেকশন বলা হয়। অপসারণ করা লিম্ফ নোডের সংখ্যা বয়্কিত ভেদে ভিন্ন হতে পারে।

আপনার লসিকাতন্তর্ (লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম) সম্পর্কে.

আপনার স্তন অস্েত্রাপচারের জন্য পরস্তুতি নেওয়া এবং অস্েত্রাপচারের পর সুস্থ হয়ে ওঠার সময় লসিকাতন্তর্ (লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম) কীভাবে কাজ করে তা বোঝা সহায়ক হতে পারে। আপনার লসিকাতন্তর্ (লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমের) ২টি প্রধান কাজ রয়েছে:


- এটি সংকর্মণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে।
- এটি আপনার শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে তরল নিষ্কাশনে সাহায্য করে।

আপনার লসিকাতন্তর্ (লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম) লিম্ফ নোড, লসিকানালী (লিম্ফ্যাটিক ভেসেল) এবং লসিকা তরল (লিম্ফ ফ্লুইড) নিয়ে গঠিত (চিত্র ১ দেখুন)।

- **লিম্ফ নোড (লসিকা গর্ন্থ).** লিম্ফ নোড হলো ছোট শিমের দানার মতো আকৃতির গর্ন্থ, যা আপনার লসিকানালীগুলোর (লিম্ফ্যাটিক ভেসেল) বরাবর অবস্থিত। আপনার লিম্ফ নোডগুলো লসিকা তরলকে পরিশোধন করে এবং সেখান থেকে ব্যাকটেরিয়া, ভাইরাস, ক্যান্সার কোষ ও অন্যান্য বজর্য পদার্থ দূর করে।
- **লসিকানালী (লিম্ফ্যাটিক ভেসেল).** এগুলো আপনার রক্তনালীর মতো কষুদর্ নালী, যা লসিকা তরলকে লিম্ফ নোডে নিয়ে যায় এবং সেখান থেকে

শরীরের অন্যান্য অংশে বহন করে।

- লসিকা তরল এটি একটি সবচ্ছ তরল যা আপনার লসিকা তন্তুর মধ্যে পর্বাহিত হয়। এটি এমন কোষ বহন করে যা সংকরমণ এবং অন্যান্য রোগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সাহায্য করে।



চিত্র 1. আপনার স্তন ও বগলের লসিকাতন্ত্র (লিম্ফ্যাটিক সিস্টেম).

মাস্টেকটমি (স্তন অপসারণের অস্ত্রোপচার) করার আগে।

এই বিভাগটি আপনাকে আপনার অস্ত্রোপচারের জন্য প্রস্তুত হতে সহায়তা করবে। আপনার অস্ত্রোপচারের সময় নির্ধারিত হলে এটি পড়ুন। আপনার অস্ত্রোপচারের সময় কাছাকাছি আসার সাথে সাথে এটি ব্যবহার করুন। প্রস্তুত হওয়ার জন্য কী করতে হবে তা সম্পর্কে এতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য রয়েছে।

আপনি এই বিভাগটি পড়ার সাথে সাথে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে

জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রশ্নাবলী লিখুন।

সাজরাঁর জনস্বপ্নস্তুতি নেওয়া

আপনার অস্বপ্নস্তুততার জন্য স্বপ্নস্তুত হতে আপনি এবং আপনার কেয়ার টিম একসাথে কাজ করবে। এই বিষয়গুলির কোনোটি আপনার কেবলত্ব স্বপ্নস্তুত কি না তা আমাদের জানিয়ে আপনাকে নিরাপদ রাখতে আমাদেরকে সাহায্য করুন, এমনকি আপনি নিশ্চিত না হলেও।

- আমি শুধু স্বপ্নস্তুতকরণের ঔষধ সেবন করি। স্বপ্নস্তুতকরণের ঔষধ হলো এমন ঔষধ যা আপনি শুধুমাত্র একজন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর স্বপ্নস্তুতকরণের মাধ্যমে পেতে পারেন।
উদাহরণ:
 - যেসব ঔষধ আপনি মুখে সেবন করেন।
 - যেসব ঔষধ আপনি ইনজেকশনের (শটের) মাধ্যমে নেন।
 - যেসব ঔষধ আপনি নিশ্বাসের সাথে গ্রহণ করেন (শ্বাস গ্রহণের সময়)।
 - যেসব ঔষধ আপনি তব্কে প্যাঁচ বা ক্রিমের মাধ্যমে গ্রহণ করেন।
- আমি প্যাঁচ এবং ক্রিম সহ যেকোনো ওভার-দাউন্টার ঔষধগুলি গ্রহণ করি। ওভার-দাউন্টারের ঔষধ হলো এমন ঔষধ যা আপনি স্বপ্নস্তুতকরণ ছাড়াই কিনতে পারেন।
- আমি যেকোনো ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট

আপনি যেসব ঔষধ এবং সাপ্লিমেন্ট সেবন করেন, আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীরা সেগুলো সম্পর্কে জানে এটা নিশ্চিত করুন।

আপনি যেসব ঔষধ এবং সাপ্লিমেন্ট সেবন করেন, সেগুলোর ভিত্তি করে সাজরাঁর আগে কিছু নির্দিষ্ট নির্দেশনা আপনাকে মেনে চলতে হতে পারে। এসব নির্দেশনা না মানলে, আপনার সাজরাঁর বিলম্বিত বা বাতিল হতে পারে।

গর্হণ করি, যেমন- ভেষজ, ভিটামিন, খনিজ বা পরাকৃতিক বা ঘরোয়া প্রতিষেধক।

- আমার পেসমেকার, অটোমেটিক ইমপ্ল্যান্টেবল কার্ডিওভাটার-ডিফিব্রিলেটর (AICD) বা অন্যান্য হার্ট ডিভাইস রয়েছে।
- অতীতে অ্যানেসথেসিয়া (A-nes-THEE-zhuh) নিয়ে আমার সমস্যা হয়েছিল। অ্যানেসথেসিয়া হলো অস্ত্রোপচার বা প্রক্রিয়ার সময় আপনাকে ঘুম পাড়ানোর ঔষধ।
- ল্যাটেক্স সহ নিদ্রিষ্ট কিছু ঔষধ বা উপকরণগুলিতে আমার অ্যালাজি রয়েছে।
- আমি রক্ত সঞ্চারণ গর্হণ করতে ইচ্ছুক নই।
- আমি গাঁজার মতো বিনোদনমূলক মাদক সেবন করি।

গর্ধারণ প্রতিরোধ.

অস্ত্রোপচারের আগে আপনার গর্ধারণের কোনো সম্ভাবনা থাকলে, অবশ্যই এমন একটি জন্মনিয়ন্ত্রণ (গর্ধারণ প্রতিরোধ) পদ্ধতি ব্যবহার করুন যাতে হরমোন থাকে না। উদাহরণস্বরূপ, আপনি কন্ডোম, ডায়াফ্রাম বা কপার (Paragard®) ইন্টারউটেরাইন ডিভাইস (IUD) ব্যবহার করতে পারেন।

জন্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে বা আপনার জন্য উপযুক্ত জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি বেছে নিতে সহায়তা প্রয়োজন হলে, আপনার স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের (গাইনোকোলজিস্ট) সঙ্গে পরামর্শ করুন।

প্রজননক্ষমতা সংরক্ষণ

চিকিৎসা চলাকালীন গর্ধারণ এড়িয়ে চলুন। যদি আপনার ডাক্তার কিছু সময়ের জন্য গর্ধারণ না করার পরামর্শ দিয়ে থাকেন এবং ভবিষ্যতে সন্তান নেওয়ার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আপনি আপনার ডিম্বাণু (এগ) সংরক্ষণ (ফ্রিজ করে রাখা) করার বিষয়টি বিবেচনা করতে পারেন। আরও জানতে,

পড়ুন। *Fertility Preservation Before Cancer Treatment: Options for People Born with Ovaries and a Uterus* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/fertility-preservation-females-starting-treatment).

ওজন কমানোর জন্য GLP-1 ওষুধ।

আপনি যদি GLP-1 ওষুধ গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে জানানো গুরুত্বপূর্ণ। আপনার অস্বাস্থ্যকর বা পরিকল্পিত আগের বিশেষ খাবার ও পানীয় সংক্রান্ত নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। এই নির্দেশাবলী অনুসরণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি এগুলো মেনে চলেন না, তাহলে আপনার অস্বাস্থ্যকর বা পরিকল্পিত বিলম্বিত বা বাতিল হতে পারে।

- আপনার অস্বাস্থ্যকর বা পরিকল্পিত আগের দিন পরিষ্কার তরল খাবারের ডায়েট অনুসরণ করুন। কোনো ধরনের শক্ত বা কঠিন খাবার গ্রহণ করবেন না। আরও তথ্য জানার জন্য [bXNrLW5vZGUtbGluazogMjAyNDg=] পড়ুন।
- আপনার আগমনের সময়ের ৮ ঘণ্টা আগে পানীয় পান বন্ধ করুন। এই সময়ের পরে কিছুই খাওয়া বা পান করা যাবে না, এমনকি পরিষ্কার তরলও। আপনি আপনার ওষুধের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে পানি পান করতে পারেন।

আরও তথ্য জানার জন্য [bXNrLW5vZGUtbGluazogMzE4MDM2] পড়ুন।

নিচে GLP-1 ওষুধের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। আরও কিছু আছে, তাই নিশ্চিত করুন যে আপনার সেবাদানকারী দল আপনার গ্রহণ করা সমস্ত ওষুধ সম্পর্কে জানে। কখনও কখনও, এগুলি ডায়াবেটিস বা অন্যান্য অবস্থার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করার জন্য নির্ধারিত হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে, এগুলি ওজন কমানোর জন্য নির্ধারিত হয়।

• Semaglutide (Wegovy®, Ozempic®, Rybelsus®) • Dulaglutide (Trulicity®)	• Tirzepatide (Zepbound®, Mounjaro®) • Liraglutide (Saxenda®, Victoza®)
--	--

মদ পান করা সম্পর্কিত তথ্য

আপনি কী পরিমাণ মদ পান করেন সে সম্পর্কে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সাথে কথা বলা গুরুত্বপূর্ণ। এটি আমাদেরকে আপনার পরিচয় সম্পর্কে পরিকল্পনা করতে সহায়তা করবে।

আপনি নিয়মিত মদ পান করলে আপনার অস্বস্তি/পচায়ে সময় এবং পরবর্তীতে আপনার অন্যান্য সমস্যার ঝুঁকি থাকতে পারে। এর মধ্যে রয়েছে রক্তপাত, সংকরমণ, হৃৎপিণ্ডের সমস্যা এবং দীর্ঘ সময় ধরে হাসপাতালে থাকা।

আপনি যদি নিয়মিত মদ পান করেন এবং হঠাৎ বন্ধ করে দেন, তাহলে এর কারণে খিঁচুনি, চিত্তবিভ্রম এবং মৃত্যু হতে পারে। আপনি এই সমস্যাগুলির ঝুঁকিতে রয়েছেন তা বুঝতে পারলে আমরা এগুলি প্রতিরোধে সহায়তা করার জন্য ওষুধ দিতে পারি।

আপনার অস্বস্তি/পচায়ে আগে সমস্যাগুলি এড়িয়ে যেতে আপনি যা করতে পারেন তা এখানে উল্লেখ করা হলো।

- আপনি কী পরিমাণ মদ পান করেন সে সম্পর্কে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সাথে সৎ থাকুন।
- আপনার অস্বস্তি/পচায়ে পরিকল্পনা করা হয়ে গেলে মদ পান করা বন্ধ করার চেষ্টা করুন। অবিলম্বে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে বলুন, যদি আপনার:
 - মাথাব্যথা হয়।
 - বমি বমি ভাব (কোনো কিছু উগরে দিচ্ছেন বলে মনে হওয়া) অনুভব হয়।

- সর্বাভাবিকের চেয়ে বেশি উদ্বিগ্নতা (নাভরাস বা চিন্তিত) অনুভব হয়।
- ঘুম না হয়।

এগুলি মদয্পান বন্ধ করার প্রাথমিক লক্ষণ যার চিকিৎসা করা যেতে পারে।

- আপনি মদয্পান বন্ধ করতে না পারলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে বলুন।
- মদয্পান এবং অস্বাস্থ্যকর সম্পর্কে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে প্রশ্ন করুন। বরাবরের মতো, আপনার চিকিৎসার সকল তথ্য গোপন রাখা হবে।

ধূমপান সম্পর্কিত তথ্য

আপনি যদি ধূমপান করেন বা ইলেকট্রনিক স্মোকিং ডিভাইস ব্যবহার করেন, তবে সাজরারির সময় আপনার শ্বাসকষ্ট হতে পারে। ইলেকট্রনিক স্মোকিং ডিভাইসের উদাহরণ হল ভেপ এবং ই-সিগারেটসমূহ। সাজরারির কিছুদিন আগেও ধূমপান বন্ধ করলে, তা সাজরারির সময় বা সাজরারির পরে শ্বাসকষ্টের সমস্যা প্রতিরোধে সহায়ক হতে পারে।

আপনি ধূমপান করলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী আপনাকে আমাদের [টোবাকো ট্রিটমেন্ট প্রোগ্রামে](#) পাঠাবেন। এছাড়াও আপনি 212-610-0507 নম্বরে কল করে প্রোগ্রামটিতে যুক্ত হতে পারেন।

স্লিপ অ্যাপনিয়া সম্পর্কিত তথ্য

স্লিপ অ্যাপনিয়া হলো একটি সাধারণ শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাধি। আপনার যদি স্লিপ অ্যাপনিয়া হয়, তাহলে আপনার ঘুমের মধ্যে কিছু সময়ের জন্য শ্বাস-প্রশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়। সবচেয়ে সাধারণ ধরন হলো অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া (OSA). OSA এর ক্ষেত্রে, ঘুমানোর সময় আপনার শ্বাসনালী সম্পূর্ণরূপে অবরুদ্ধ হয়ে যায়।

OSA অস্বাস্থ্যকর সময় এবং পরবর্তীতে গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করতে

পারে। আপনার সিল্প অয্যাপনিয়া থাকলে অথবা আপনি যদি মনে করেন যে আপনার এটি হতে পারে তাহলে আমাদেরকে বলুন। সিল্প অয্যাপনিয়ার জনয্য আপনি শব্বাস পরশব্বাসের যন্তর্ য়েমন CPAP মেশিন বয্যবহার করলে আপনার অসেত্ৰাপচারের দিন এটি সাথে নিয়ে আসুন।

MSK MyChart বয্যবহার করা

MSK MyChart (mskmychart.mskcc.org) হলো MSK-র রোগীর পোটার্ল। আপনার কেয়ার টিমকে বাতর্ পাঠাতে ও পড়তে, আপনার পরীক্ষার ফলাফল দেখতে, আপনার অয্যাপয়েন্টমেন্টের তারিখ ও সময় দেখতে এবং আরো অনেক কিছু করতে আপনি এটি বয্যবহার করতে পারেন। আপনি আপনার পরিচয্যরকারীকে তার নিজসব্ব অয্যাকাউন্ট তৈরি করার জনয্য আমন্তর্গ জানাতে পারেন যাতে তারা আপনার পরিচয্যর সম্পকির্ত তথয্য দেখতে পারে।

আপনার যদি MSK MyChart এ অয্যাকাউন্ট না থাকে, তবে আপনি mskmychart.mskcc.org ওয়েবসাইটে সাইন আপ করতে পারেন। আপনার কেয়ার টিমের সদস্যকেও ইনভাইটেশন পাঠাতে বলতে পারেন।

অয্যাকাউন্ট সম্পকির্ত কোন সাহাযেয্যর অনয্য, MSK MyChart হেল্পডেসেকর 646-227-2593 নমব্বরে কল করুন। সোমবার থেকে শূকরবার সকাল 9টা থেকে 5টা পয্যরন্ত (ইস্টানর্ টাইম) তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারবেন।

আপনার অসেত্ৰাপচারের 30 দিনের মধ্যে পির্সাজির্কাল টেস্টিং (PST)

অসেত্ৰাপচারের আগে আপনার একটি PST অয্যাপয়েন্টমেন্ট থাকবে। আপনি আপনার সাজর্নের অফিস থেকে অয্যাপয়েন্টমেন্টের তারিখ, সময় এবং ঠিকানা সহ একটি রিমাইন্ডার পাবেন। সমস্ত MSK অবস্থানে পাকির্ং বিষয়ক তথয্য এবং দিকনিদেরশনা পেতে www.msk.org/parking ভিজিট করুন।

আপনার PST অয্যাপয়েন্টমেন্টের দিন আপনি আপনার সব্বাভাবিক ওষুধ খেতে

এবং নিতে পারবেন।

অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় নিম্নলিখিত জিনিসগুলি আনা সহায়ক:

- পের্সকির্পশন এবং নিজে থেকে কেনা ওষুধ, প্যাচ এবং কির্ম সহ আপনি যে সকল ওষুধ গ্রহণ করছেন তার একটি তালিকা।
- বিগত বছরে MSK-এর বাইরে করা যেকোনো চিকিৎসা সংক্রান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফল, যদি আপনার কাছে থাকে। উদাহরণের মধ্যে রয়েছে কাডিরয়াক স্টের্স টেস্ট, ইকোকাডির্ওগরাম বা কয়ারোটড ডপলার স্টাডির ফলাফল।
- আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের নাম এবং টেলিফোন নম্বর।

আপনার PST অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় আপনি একজন অ্যাডভান্স পর্যাঁকটিস পেরাভাইডারের (APP) সাথে দেখা করবেন। তারা MSK-এর অ্যানেস্‌থেসিওলজি (A-nes-THEE-zee-AH-loh-jee) কমরীদের সাথে নিবিড়ভাবে কাজ করে। তারা অস্‌তের্পচার বা পর্কির্যার সময় অ্যানেস্‌থেশিয়া ব্যবহারে বিশেষ পর্শিক্ষণপরা্প্ত ডাক্তার।

আপনার APP আপনার সাথে আপনার চিকিৎসা এবং অস্‌তের্পচারের ইতিহাস পর্যালোচনা করবে। আপনার পরিচরার পরিকল্পনা করার জন্য আপনার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা হতে পারে, যেমন:

- আপনার হৃদস্পন্দন পরীক্ষা করার জন্য ইলেক্টরাকাদির্ওগরাম (EKG)।
- বুরের এক্স-রে।
- রক্ত পরীক্ষা।

আপনার APP আপনাকে অন্যান্য স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের সাথে দেখা করার পরামশর্দিতে পারে। আপনার অস্‌তের্পচারের দিন সকালে কোন ওষুধ(গুলি) গ্রহণ করতে হবে সে সম্পর্কেও তারা আপনার সাথে কথা বলবে।

আপনি যদি আপনার শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান বা বুকের দুধ সংগরহ (পাম্প) করে থাকেন, তাহলে আপনার নাসর্ পর্যাকটিশনারকে (NP) তা জানান।

আপনার পরিচয়কারীকে সনাক্ত করুন

আপনার পরিচয়রায় আপনার পরিচয়কারীর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। আপনার অস্েত্রাপচারের আগে, আপনি ও আপনার পরিচয়কারী আপনার স্বাস্থ্যসেবাপর্দানকারীর কাছ থেকে আপনার অস্েত্রাপচার সম্পর্কে জানবেন। আপনার অস্েত্রাপচারের পরে, আপনার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাওয়ার পর পরিচয়কারী আপনাকে বাড়িতে নিয়ে যাবেন। তারা আপনাকে বাড়িতে আপনার নিজের পরিচয় করতেও সাহায্য করবেন।

পরিচয়কারীদের জন্য



কযান্সারের চিকিৎসায় থাকা একজন বয়্কিত্র পরিচয়রায় অনেক দায়িত্ব থাকে। আপনাকে সেগুলো পরিচালনা করতে সহায়তা করার জন্য আমরা রিসোসর্ ও সহায়তা পর্দান করি। আরো জানতে www.msk.org/caregivers দেখুন বা *A Guide*

for Caregivers (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/guide-caregivers) পড়ুন।

একটি হেলথ কেয়ার পরক্সি ফরম পূরণ করুন

আপনি ইতোমধ্যে একটি হেলথ কেয়ার পরক্সি ফরম পূরণ না করে থাকলে আমরা আপনাকে এখনই পূরণ করার পরামশর্ দিচ্ছি। আপনি ইতোমধ্যে একটি পূরণ করে থাকলে অথবা আপনার যদি অনয্ কোনো অগির্ম নিদের্শনা থাকে তাহলে সেগুলো আপনার পরবতর্ অয্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আসবেন।

হেলথ কেয়ার পরক্সি একটি আইনি নথি। আপনি যদি নিজের জন্য যোগাযোগ করতে না পারেন তাহলে কে আপনার পক্ষে কথা বলবে তা এতে উল্লেখ থাকে। এই বয়্কিত্র হলো আপনার স্বাস্থ্যসেবা পর্তিনিধি।

- স্বাস্থ্যসেবা পরক্সি এবং অনযানয্ অগির্ম নিদের্শাবলী সম্পর্কে

জানতে *Advance Care Planning for People With Cancer and Their Loved Ones* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/advance-care-planning) পড়ুন।

- সর্বাংস্থায়ী সেবা প্রতিনিধি হওয়ার বিষয়ে জানতে *How to Be a Health Care Agent* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-be-health-care-agent) পড়ুন।

হেলথ কেয়ার প্রক্সি ফরম পূরণ করার বিষয়ে আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনার কেয়ার টিমের যেকোনো সদস্যের সাথে কথা বলুন।

আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জনস্ব কাউকে ঠিক করে রাখুন

অসুস্থতাপ্রচারের পর আপনাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জনস্ব একজন দায়িত্বশীল ব্যক্তি থাকতে হবে। দায়িত্ববান পরিচর্যা সহযোগী হলেন এমন ব্যক্তি যিনি আপনাকে নিরাপদে বাসায় নিয়ে যেতে সহায়তা করতে পারেন। তাদের কোনো উদ্বেগ থাকলে তারা যেন আপনার পরিচর্যাকারী দলের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। অসুস্থতাপ্রচারের দিনের আগে থেকেই এর ব্যবস্থা করে রাখুন।

আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জনস্ব আপনার যদি দায়িত্ববান পরিচর্যা সহযোগী না থাকে তবে নিচের একটি এজেন্সিকে কল করুন। আপনাকে সঙ্গ করে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জনস্ব তারা কাউকে পাঠাবে। এই পরিষেবার জনস্ব চার্জ করা হয় এবং আপনাকে যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। ট্যাক্সি বা গাড়ি পরিষেবা ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু তবুও আপনার সাথে কোনো দায়বদ্ধ পরিচর্যা সহযোগীকে থাকতে হবে।

নিউ ইয়র্কের এজেন্সিসমূহ

VNS হেলথ: 888-735-8913

পরিচর্যাকারী ব্যক্তিবর্গ: 877-227-4649

নিউ জার্সিতে এজেন্সিসমূহ

পরিচর্যাকারী ব্যক্তিবর্গ: 877-227-4649

4% কেলারহেক্সিডিন গ্লুকোনেট (CHG) দ্রবণ অ্যান্টিসেপটিক ত্বক পরিষ্কারক (যেমন Hibiclens®) কিনুন

4% CHG দ্রবণ হলো ত্বক পরিষ্কারক যা ব্যবহার করার পর 24 ঘণ্টা জীবাণু মেরে ফেলে। আপনার অস্ত্রোপচারের আগে এটি দিয়ে গোসল করা অস্ত্রোপচারের পরে আপনার সংক্রমণের ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়তা করবে। আপনি পেরস্কির্পশন ছাড়াই Evelyn H. Lauder Breast Center থেকে বের হওয়ার আগে বা আপনার নিকটস্থ ওষুধের দোকান থেকে 8% CHG (কেলারহেক্সিডিন গ্লুকোনেট) জীবাণুনাশক ত্বক পরিষ্কারক কিনতে পারেন।

৩২৫ মিলিগ্রাম অ্যাসিটামিনোফেন ট্যাবলেট কিনুন, যেমন Tylenol® Regular Strength।

অ্যাসিটামিনোফেন একটি পেরস্কির্পশন ছাড়াই পাওয়া যায় এমন ব্যথানাশক ওষুধ। অস্ত্রোপচারের পর বাড়িতে আপনার ব্যথা নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করার জন্য আপনি এটি ব্যবহার করবেন। এটি আগে থেকেই কিনে রাখা সুবিধাজনক হবে। আপনি এটি পেরস্কির্পশন ছাড়াই আপনার নিকটস্থ ওষুধের দোকান (ফার্মেসি) থেকে কিনতে পারেন। যেকোনো ওষুধ সেবনের সময় সবসময় ওষুধের পাতের দেওয়া নির্দেশনা বা আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর পরামর্শ অনুসরণ করুন।

আপনার অস্ত্রোপচারের 7 দিন আগে

অ্যাসপিরিন সেবন করা সম্পর্কে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর নির্দেশাবলি মেনে চলুন

অ্যাসপিরিন রক্তক্ষরণ ঘটাতে পারে। আপনি যদি অ্যাসপিরিন বা এমন কোনো ওষুধ খান যাতে অ্যাসপিরিন থাকে তাহলে আপনার অস্ত্রোপচারের 7 দিন আগে থেকে ডোজ পরিবর্তন করতে হতে পারে বা এটি খাওয়া বন্ধ করতে হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর নির্দেশাবলি মেনে চলুন। তাদের পরামর্শ ছাড়া অ্যাসপিরিন খাওয়া বন্ধ করবেন না।

আরো জানতে, পড়ুন *How To Check if a Medicine or Supplement Has*

Aspirin, Other NSAIDs, Vitamin E, or Fish Oil

(www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids)।

ভিটামিন ই, মালিটভিটামিন, ভেষজ পরিতিকার এবং অন্যান্য ডায়েটরি পরিপূরক সেবন বন্ধ করুন

ভিটামিন ই, মালিটভিটামিন, ভেষজ পরিতিকার এবং অন্যান্য ডায়েটরি পরিপূরক সেবন করলে রক্তপাত হতে পারে। আপনার অস্বেত্ৰাপচারের 7 দিন আগে থেকে এগুলো সেবন করা বন্ধ করুন। আপনার স্বাস্থ্যসেবা পৰ্দানকারী যদি আপনাকে অনয্ নিদেৰ্শাবলি পৰ্দান করেন তাহলে সেগুলো মেনে চলুন।

আরো জানতে *Herbal Remedies and Cancer Treatment*

(www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/herbal-remedies-and-treatment) পড়ুন।

আপনার অস্বেত্ৰাপচারের 2 দিন আগে

ননস্টেরয়েডাল অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ড্রাগস (NSAID) সেবন বন্ধ করুন

আইবুপেরোফেন (Advil® ও Motrin®) এবং ন্যাপেরোক্সেন (Aleve®) এর মতো NSAID সেবন করলে রক্তপাত হতে পারে। আপনার অস্বেত্ৰাপচারের 2 দিন আগে থেকে এগুলো সেবন করা বন্ধ করুন। আপনার স্বাস্থ্যসেবা পৰ্দানকারী যদি আপনাকে অনয্ নিদেৰ্শাবলি পৰ্দান করেন তাহলে সেগুলো মেনে চলুন।

আরো জানতে *How To Check if a Medicine or Supplement Has Aspirin, Other NSAIDs, Vitamin E, or Fish Oil*

(www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids) পড়ুন।

আপনার অস্বেত্ৰাপচারের 1 দিন আগে

আপনার সাজরারির সময়টি মাথায় রাখুন

একজন কমরী আপনার সাজরারির আগের দিন দুপুর ২টার পর আপনাকে কল করবেন। যদি আপনার অস্বেত্ৰাপচার সোমবারের জনয়্ নিধরারিত হয়, তবে তারা আপনাকে আগের শুকরবারে কল করবেন। আপনি যদি সন্ধ্যা ৭টা পযরন্ত কল না পান তাহলে ২১২-৬৩৯-৫০১৪ নমব্রে কল করুন।

অস্বেত্ৰাপচারের জনয়্ আপনাকে কখন হাসপাতালে আসতে হবে তা কমরী আপনাকে জানাবেন। আপনাকে কোথায় যেতে হবে সেটিও তারা স্মরণ করিয়ে দেবেন।

সমস্ত MSK অবস্থানে পাকিরং বিষয়ক তথয়্ এবং দিকনিদের্শনা পেতে www.msk.org/parking ভিজিট করুন।

লিম্ফ্যাটিক ময়্যাপিং (লসিকাতনেত্ৰর মানচিত্ৰায়ন).

যদি আপনার সেনিটনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি করা হয়, তবে অস্বেত্ৰাপচারের আগের দিন অথবা অস্বেত্ৰাপচারের দিন সকালে আপনার লিম্ফ্যাটিক ময়্যাপিং পর্কিরয়া করা হতে পারে। এটি আপনার সাজরনকে অস্বেত্ৰাপচারের সময়, সেনিটনেল লিম্ফ নোড(গুলো) শনাক্ত করতে সাহাযয়্ করবে।

লিম্ফ্যাটিক ময়্যাপিং পর্কিরয়ার সময়, আপনাকে পর্য ২০ মিনিট একটি হেলানো (রিক্লাইনিং) চেয়ারে শুয়ে থাকতে হবে। আপনি যখন রিক্লাইনিং চেয়ারে থাকবেন, তখন একজন সবাস্থয়সেবা পরদানকারী আকরন্ত স্তনের অয়্যরিওলার (বোঁটার চারপাশের গাঢ় অংশ) নিচের তব্কের মধ্যে অল্প পরিমাণ তেজসিকরয়্ তরল ইনজেকশন (সুইয়ের মাধ্যমে) দেবেন। ইনজেকশন দেওয়ার সময়, আপনার হালকা চিমটি লাগা বা জব্বালাপোড়ার অনুভূতি হতে পারে।

ইনজেকশন দেওয়ার পর আপনাকে ইনজেকশন দেওয়া স্থানটি ১০ মিনিট ধরে আলতোভাবে ময়্যাসাজ করতে হবে। এটি তেজসিকরয়্ তরলটিকে সেনিটনেল লিম্ফ নোড(গুলো) পযরন্ত পৌঁছাতে সাহাযয়্ করবে। এরপর একজন

পর্যুক্তবিদ (টেকনোলজিস্ট) আকরান্ত পাশের আপনার স্তন ও বগলে তেজস্কর্যতার মাতরা পরিমাপ করবেন, যাতে দেখা যায় তরলটির কতটা শোষিত হয়েছে। এটি করার জনয় তাদের ২টি পদ্ধতি রয়েছে:

- আপনার রেডিয়েশন পর্যুক্তবিদ (টেকনোলজিস্ট) Neoprobe® নামে একটি ছোট হাতে ধরা যন্তর্ ব্যবহার করতে পারেন।
- অথবা আপনার একটি ইমেজিং স্ক্যান করা হতে পারে, যার জনয় আপনাকে একটি বড় যন্তর্ উপর শুয়ে থাকতে হবে। এ সম্পর্কে আরও জানতে “Nuclear Medicine Scan” (নিউক্লিয়ার মেডিসিন স্ক্যান) অংশটি পড়ুন।

উভয় পদ্ধতিই সমানভাবে কাযরকর। আপনার সব্স্থয়সেবা পরদানকারী আপনাকে কী আশা করতে হবে তা জানাবেন।

নিউক্লিয়ার মেডিসিন স্ক্যান

ইনজেকশনের পর যদি আপনার ইমেজিং স্ক্যান করা হয়, তাহলে আপনার পর্যুক্তবিদ (টেকনোলজিস্ট) আপনাকে স্ক্যানিং কক্ষে নিয়ে যাবেন। ছবি তোলার সময় আপনাকে একটি টেবিলের উপর শুয়ে থাকতে হবে এবং পর্যুক্তবিদ (টেকনোলজিস্ট) ছবি তুলবেন। প্রতিটি ছবি সম্পূর্ণ করতে ৫ মিনিট সময় লাগে, এবং এই সময়ে আপনাকে খুব স্থির হয়ে শুয়ে থাকতে হবে। যদি আপনি কোনো অবস্থানে ৫ মিনিট থাকা অসব্স্থিতকর মনে করেন, তাহলে আপনার টেকনোলজিস্টকে আপনার জনয় সময় গণনা করে দিতে বলুন। স্ক্যানটি ১০ থেকে ১৫ মিনিট সময় নেবে।

আপনার স্ক্যানের সময় তোলা ছবিগুলোতে তেজস্কর্য তরলের পরবাহ দেখা যাবে। তারা এটাও দেখাবে কোন লিম্ফ নোডগুলো তরল শোষণ করে। এটি আপনার লসিকা তন্তর্ একটি “মানচিতর” তৈরি করে। আপনার সাজর্ন এই মানচিতরটি ব্যবহার করবেন আপনার অস্ত্রাপচারের সময় আপনার সেন্টিনেল লিম্ফ নোড(গুলো) খুঁজে বের করতে।

আপনার লিম্ফাটিক ম্যাপিংয়ের একই দিনে যদি আপনার সাজরা হয়, তাহলে একজন স্টাফ সদস্য আপনাকে স্ক্যানিং রুম থেকে অপারেশন রুমে নিয়ে যাবেন। আপনি যদি জোসি রবার্টসন সাজরা সেন্টার (JRSC)-এ অস্ত্রোপচার করান, তাহলে আপনার কেয়ার টিম আপনার পরিকল্পনার পর JRSC-তে যাওয়ার জন্য MSK ভ্যানে করে যাওয়ার ব্যবস্থা করবে। বেশিরভাগ অন্যান্য ক্ষেত্রে, আপনার লিম্ফাটিক ম্যাপিংয়ের পর আপনি বাড়ি চলে যাবেন।

4% CHG দ্রবণের অ্যান্টিসেপটিক ত্বক পরিষ্কারক, যেমন Hibiclens দিয়ে গোসল করুন


অস্ত্রোপচারের আগের রাতে বিছানায় যাওয়ার আগে 4% CHG দ্রবণের অ্যান্টিসেপটিক ত্বক পরিষ্কারক, যেমন Hibiclens দিয়ে গোসল করুন।

1. আপনার নিয়মিত শ্যাম্পু এবং কন্ডিশনার দিয়ে আপনার চুল ধুয়ে ফেলুন। আপনার মাথা ভালো করে ধুয়ে ফেলুন।
2. আপনার নিয়মিত ব্যবহার্য সাবান দিয়ে আপনার মুখ ও যৌনাঙ্গে (কুঁচকি) আশপাশ ধুয়ে নিন। গরম জল দিয়ে শরীর ভালো করে ধুয়ে ফেলুন।
3. 4% CHG দ্রবণের বোতলটি খুলুন। সামান্য পরিমাণ আপনার হাতে বা পরিষ্কার একটি ধোয়া কাপড়ে ঢালুন।
4. ঝরনা ধারা থেকে দূরে রাখুন। আপনার ঘাড় থেকে পা পর্যন্ত আপনার দেহে 4% CHG দ্রবণটি আলতোভাবে ঘষুন। আপনার মুখে বা যৌনাঙ্গে এটি দেবেন না।
5. 4% CHG দ্রবণটি ধুয়ে ফেলতে পুনরায় ঝরনা ধারার নিচে যান। গরম জল ব্যবহার করুন।
6. একটি পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে নিজেকে মুছে নিন।

গোসলের পর কোনো প্রকার লোশন, ক্রিম, ডিওডোরেন্ট, মেকআপ, পাউডার, পারফিউম বা কোলোন লাগাবেন না।

খাওয়া-দাওয়ার নিদেৰ্শনা

গুরুতব্পূৰ্ণৰ্: আপনি যদি ওজন কমানোৰ জনয্ GLP-1 ওষুধ গৰ্হণ কৰেন, তৰে এই নিদেৰ্শাবলী অনুসৰণ কৰবেন না। পৰিবতের্ [bXNrLW5vZGUtbGluazogMzE4MDM2]-এ থাকা নিদেৰ্শাবলী অনুসৰণ কৰুন।



আপনার অসেতৰ্পচাৰ বা পৰ্কিৰ্য্যার আগেৰ্ রাত ১২টায় খাবাৰ খাওয়া বন্ধ কৰুন। এর মধ্যেয্ শক্ত কযান্দি এবং গামও অন্তভূৰ্কত।

কখন খাওয়া বন্ধ কৰবেন, সে বয্যপারে আপনাৰ সব্স্থয্যসেবা পৰ্দানকাৰীরা অনয্ নিদেৰ্শনা দিয়ে থাকতে পারে। এরকম হলে, তাৰেৰ্ নিদেৰ্শনা মেনে চলুন। কিছু বয্কিতকে তাৰেৰ্ অসেতৰ্পচাৰ বা পৰ্কিৰ্য্যার আগে দীঘৰ্ সময় ধৰে উপবাস (খাবাৰ না খাওয়া) কৰতে হয়।

আপনাৰ অসেতৰ্পচাৰেৰ্ দিন পান কৰাৰ নিদেৰ্শনা

গুরুতব্পূৰ্ণৰ্: যদি আপনি একটি GLP-1 ওষুধ গৰ্হণ কৰেন, তাহলে এই নিদেৰ্শনাগুলি অনুসৰণ কৰবেন না। পৰিবতের্ [bXNrLW5vZGUtbGluazogMzE4MDM2]-এ থাকা নিদেৰ্শাবলী অনুসৰণ কৰুন।

আপনাৰ আগমনেৰ্ 2 ঘণ্টা আগে এবং মধ্যৰাতের মধ্যেয্ শুধুমাতৰ্ নিচের তালিকাভূৰ্কত তৰল পান কৰুন। আৰ কোনো কিছু খাবেন না বা পান কৰবেন না। আপনাৰ আগমনেৰ্ 2 ঘণ্টা আগে পান কৰবেন না।

- জল।
- আপেলের সব্চ্ছ জুস, আঙুরের সব্চ্ছ জুস বা কর্য়ানবেরির সব্চ্ছ জুস।
- Gatorade বা Powerade।
- ব্ল্যাক কফি বা সাধারণ চা। চিনি দিলেও কোনো সমস্যা নেই। আর কিছু দেবেন না।
 - কোনো ধরনের দুধ বা কির্মার দেবেন না। এর মধ্যে উদ্ভিজ্জ দুধ এবং কির্মার অন্তভুক্ত।
 - সব্দ্দযুক্ত কোনো সিরাপ যোগ করবেন না।

আপনার ডায়াবেটিস থাকলে, পানীয়তে আপনার চিনির পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত রাখুন। আপনি যদি এইসব পানীয়ের চিনি-ছাড়া, কম-চিনি বা কোনো চিনি নেই এমন উপাদানগুলো পান করেন তাহলে আপনার রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হবে।

অস্েত্রাপ্চার বা পর্কির্য়ার আগে শরীরে পযর্াপ্ত পানি বজায় রাখা উপকারী, তাই আপনি তৃষ্ণাতর্ হলে পানি পান করুন। পর্যোজনের চাইতে বেশি পান করবেন না। আপনার অস্েত্রাপ্চার বা পর্কির্য়ার সময় আপনাকে শিরায (আইভি) তরল দেওয়া হবে।



আপনার আগমনের 2 ঘণ্টা আগে পান করবেন না। পানিও এতে অন্তভুক্ত।

কখন পান করা বন্ধ করবেন, সে ব্যাপারে আপনার স্বাস্থ্যসেবা পর্দানকারীরা অনয্ নির্দেশনা দিয়ে থাকতে পারে। এরকম হলে, তাদের নির্দেশনা মেনে চলুন।

নির্দেশনা অনুযায়ী ওষুধ খান

আপনার কেয়ার টিমের একজন সদস্য আপনাকে জানাবেন যে আপনার

অস্বেত্ৰাপ্চাৰেৰ দিন সকালে কোন ওষুধগুলি খেতে হবে। শুধু এক চুমুক পানি দিয়ে সেই ওষুধগুলি খান। আপনি সাধাৰণত কী কী ওষুধ খান তাৰ উপৰ নিভৰুৱা কৰে, এগুলি আপনাৰ সকালেৰ সাধাৰণ ওষুধগুলিৰ সবকয়টি বা কয়েকটি হতে পাৰে বা তাৰ কোনোটিই নাও হতে পাৰে।

4% CHG দৰ্বেণেৰ অ্যান্টিসেপটিক তব্ক পৰিষ্কাৰক, যেমন Hibiclens দিয়ে গোসল কৰুন

হাসপাতাল ত্যাগ কৰাৰ আগে 4% CHG দৰ্বেণেৰ অ্যান্টিসেপটিক তব্ক পৰিষ্কাৰক দিয়ে গোসল কৰুন। আগের রাতে যেভাবে বয়ব্হাৰ কৰেছিলেন ঠিক সেভাবে বয়ব্হাৰ কৰুন।

গোসলেৰ পৰ কোনাে পৰ্কাৰ লোশন, কিৰ্ম, ডিওডোৰেন্ট, মেকআপ, পাউডাৰ, পাৰফিউম বা কোলোন লাগাবেন না।

যে জিনিসগুলি মনে রাখতে হবে

- আপনি যদি কন্ট্যাক্ট লেন্স পৰেন তাহলে তাৰ পৰিবতেৰ্ চশমা পৰুন। অস্বেত্ৰাপ্চাৰেৰ সময় কন্ট্যাক্ট লেন্স পৰা থাকলে তা আপনাৰ চোখেৰ ক্ৰতি কৰতে পাৰে।
- কোনাে ধাতব বস্তু পৰবেন না। শৰীৰে ফুটো কৰে পৰা গহনা সহ সকল গহনা খুলে ফেলুন। আপনাৰ অস্বেত্ৰাপ্চাৰেৰ সময় বয়ব্হত সৰঞ্জামগুলি ধাতুৰ সংস্পশেৰ্ এলে পুড়ে যেতে পাৰে।
- মূল্যবান জিনিস বাড়িতে রেখে আসুন।
- আপনাৰ ঋতুসৰ্ব (আপনাৰ মাসিক পিৰিয়ড) হলে টয়াম্পনেৰ পৰিবতেৰ্ সযান্টিটাৰি পযাড বয়ব্হাৰ কৰুন। পৰ্য্যোজন হলে আমৰা আপনাকে ডিসপোজেবল অন্তবৰ্াস এবং একটি পযাড পৰ্দান কৰব।

কী আনতে হবে

- একটি বোতাম-ডাউন বা ডিলেঢালা টপ।

- সিল্প অয্য্পনিয়ার জনয্ আপনার শব্বস পর্শব্বসের যন্তর্ (যেমন CPAP মেশিন), যদি আপনার থাকে।
- আপনার সব্বস্থয্ সেবার পর্কিস ফরম এবং অনয্যনয্ অগির্ম নিদের্শাবলী, যদি আপনি সেগুলি পূরণ করে থাকেন।
- আপনার সেল ফোন এবং চাজরার।
- ছোটখাটো কেনাকাটার জনয্ সামানয্ টাকা যদি আপনি কিনতে চান, যেমন সংবাদপতর্।
- আপনার বয্কিত্গত জিনিসপতের্ জনয্ একটি কেস, যদি আপনার থাকে। চশমা, শর্বণ সহায়ক যন্তর্, ডেঞ্চারে, কৃতির্ম যন্তর্, পরচুলা এবং ধমরীয় আনুষাঙিক হলো বয্কিত্গত সামগরীর উদাহরণ।
- এই নিদের্শিকা। অসেত্ৰাপচারের পর কিভাবে নিজের যত্ন নিতে হয় তা শিখতে আপনি এটি বয্বহার করবেন।

আপনি হাসপাতালে গেলে

অনেক কমরী আপনাকে আপনার নাম এবং জন্ম তারিখ বলতে ও বানান করতে বলবেন। এটি আপনার নিরাপত্তার জনয্। একই বা অনুরূপ নামের মানুষের একই দিনে অসেত্ৰাপচার হতে পারে।

অসেত্ৰাপচারের জনয্ আপনার পোশাক পরিবতর্ন করার সময় হলে আমরা আপনাকে একটি হসপিটাল গাউন, রোব এবং পিছল-নিরোধী মোজা পর্দান করব।

একজন নাসের্ সাথে দেখা করুন

অসেত্ৰাপচারের আগে আপনি একজন নাসের্ সাথে দেখা করবেন।

মধ্যরাতের (রাত 12টা) পরে আপনি কোনো ওষুধ সেবন করে থাকলে সেগুলোর ডোজ এবং কখন গ্রহণ করেছেন তা তাদেরকে বলুন। ওভার-দয্-কাউন্টার এবং পের্সকির্পশনের ওষুধ, পয্চ এবং কির্ম উল্লেখ করতে ভুলবেন না।

আপনার নাসর্ আপনার একটি শিরায় একটি ইন্টারভেনাস (IV) লাইন লাগাতে পারে যা সাধারণত আপনার বাহুতে বা হাতে। আপনার নাসর্ IV স্থাপন না করলে, আপনার অয়ানেসেথসিওলজিস্ট (A-nes-THEE-zee-AH-loh-jist) অপারেটিং রুমে এটি স্থাপন করবেন।

একজন অয়ানেসেথসিওলজিস্টের সাথে দেখা করুন

এছাড়াও অস্বেতর্পচারের আগে আপনি একজন অয়ানেসেথসিওলজিস্টের সাথে দেখা করবেন। তারা যা করবেন:

- আপনার সাথে আপনার চিকিৎসার বিস্তারিত পয়রলোচনা করবেন।
- অতীতে অয়ানেসেথসিয়া নিয়ে আপনার কোনো সমস্যা হয়েছে কি না তা জানতে চাইবেন। এর মধ্যে বমি বমি ভাব (ভিতর থেকে কোনো কিছু উগরে দিচ্ছেন বলে মনে হওয়া) অথবা বস্থা অন্তভুক্ত।
- আপনার অস্বেতর্পচারের সময় আপনার আরাম এবং সুরক্ষা সম্পকের আপনার সাথে কথা বলবেন।
- আপনি যে ধরনের অয়ানেসেথসিয়া নেবেন তা সম্পকের আপনার সাথে কথা বলবেন।
- অয়ানেসেথসিয়া সম্পকিত আপনার পরশনের উত্তর দেবেন।

আপনার অস্বেতর্পচারের স্থান চিহ্নিত করা

আপনার নাম ও জন্মতারিখ জিজ্ঞাসা করার পাশাপাশি, কমরীরা আপনার সাজরনের নাম কী, আপনি কোন অস্বেতর্পচার করাচ্ছেন এবং কোন পাশে অস্বেতর্পচার করা হবে তাও জিজ্ঞাসা করতে পারেন। আপনার সাজরন বা আপনার সাজির্কয়াল দলের অন্য কোনো সদস্য একটি মাকরার বয়বহার করে আপনার শরীরের সেই স্থানটি চিহ্নিত করবেন যেখানে অপারেশন করা হবে। এটি আপনার নিরাপত্তার জন্য। এটি নিশ্চিত করতে সাহায্য করে যে আপনার সাজির্কয়াল দলের সব সদস্য আপনার অস্বেতর্পচারের পরিকল্পনা সম্পকের জানেন।

অস্বেতৰূপচাৰেৰ জনয্ পৰস্তুতি নিন

আপনাৰ অস্বেতৰূপচাৰেৰ সময় হলে, আপনি আপনাৰ চশমা, শৰ্বণ সহায়ক যন্তৰ্, ডেঞ্চার, কৃতিৰ্ম ডিভাইস, পৰচুলা এবং ধমৰীয় আনুষাঙিক খুলে রাখবেন।

অপারেটিং রুমে আপনি হেঁটে যাবেন অথবা কোনো কমরী সদস্য স্বেটৰ্চাৰে আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবেন। অপারেটিং রুম টিমের একজন সদস্য আপনাকে অপারেটিং বেডে উঠতে সাহায্য করবেন। তারা আপনাৰ পায়েৰ নিচের অংশে কম্পেশন বুট লাগাবে। এগুলি আপনাৰ পায়ে রক্ত সঞ্চালনে সহায়তা করার জন্য আলতোভাবে ফুলে উঠে ও চুপসে যায়।

আপনি সব্চ্ছন্দ্য্ বোধ করলে, আপনাৰ অযানেস্বেথসিওলজিস্ট আপনাকে আপনাৰ আইভি (IV) লাইনের মাধ্যমে অযানেস্বেথসিয়া দিবেন এবং আপনি ঘুমিয়ে পড়বেন। এছাড়াও আপনাৰ অস্বেতৰূপচাৰেৰ সময় এবং পরে আপনাকে আইভি লাইনের মাধ্যমে তরল দেওয়া হবে।

আপনাৰ অস্বেতৰূপচাৰেৰ সময়

আপনি পুরোপুরি ঘুমিয়ে যাবার পরে, আপনাৰ কেযাৰ টিম আপনাৰ মুখের ভেতর দিয়ে আপনাৰ শব্াসনালীতে একটি শব্াস-পৰ্শব্াসের নল স্থাপন করবে। এটি আপনাৰ শব্াস-পৰ্শব্াসে সাহায্য করবে।

আপনি যদি সেনিটনেল লিম্ফ নোড বাযোপসি করান, আপনাৰ সাজৰ্ন আপনাৰ নিপলের নিচে বা টিউমাৰের কাছে অল্প পরিমাণ নীল রং ইনজেক্ট করবেন। এই রঞ্জক আপনাৰ লিম্ফাটিক তরলের মাধ্যমে সেনিটনেল নোড(গুলো)তে পৌঁছাবে এবং সেগুলোকে নীল রঙে রঞ্জিত করবে। যদি আপনাৰ লিম্ফাটিক ম্যাপিং করা হয়ে থাকে, তাহলে আপনাৰ সাজৰ্ন একটি ছোট যন্তৰ্ও ব্যবহার করবেন যা সেই পৰ্কিৰ্য়াৰ সময় ইনজেক্ট করা তরল থেকে নিগৰ্ত তেজস্কৰ্যতা পরিমাপ করে।

একবার তারা সেনিটনেল লিম্ফ নোড(গুলো) শনাক্ত করলে, আপনাৰ সাজৰ্ন

একটি কাটা দেবেন এবং সেগুলো অপসারণ করবেন। তারা আপনার অস্বেতরূপচারের সময় ক্যান্সার কোষ আছে কিনা তা পরীক্ষা করার জন্য সেগুলো প্যাথলজি বিভাগে পাঠাতে পারে। যদি প্যাথলজিস্ট ক্যান্সার কোষ দেখেন, তাহলে আপনার সাজর্ন আরও লিম্ফ নোড অপসারণ করতে পারেন। এটিকে অয়াক্সিলারি লিম্ফ নোড ডিসেকশন বলা হয়। আপনার সাজর্ন পরয়োজনে এটি আপনার সাথে আরও বিস্তারিতভাবে আলোচনা করবেন।

কারণ আপনার সেনিটনেল লিম্ফ নোড বায়োপসির সময় নীল রং ব্যবহার করা হয়েছিল, আপনার অস্বেতরূপচারের পর ১ থেকে ২ দিন পরন্ত আপনার তব্ক, পরসর্বা (পেশাব) এবং মল (পাখানা) নীলচে-সবুজ হতে পারে।

আপনার সাজর্ন আপনার অস্বেতরূপচার শেষ করার পর আপনার তব্কের নিচে সেলাই (সিটচ) দিয়ে আপনার কাটা অংশ(গুলো) বন্ধ করবেন। তারা আপনার চিরার উপর Steri-Strips™ (পাতলা সাজিরক্যাল টেপের টুকরো) বা Dermabond® (সাজিরক্যাল আঠা)ও লাগাতে পারে। তারা আপনার কাটা স্থান(গুলো) একটি ব্যান্ডেজ দিয়ে ঢেকে দিতে পারে।

সাধারণত অপারেটিং রুমে থাকা অবস্থায়ই আপনার কেয়ার টিম আপনার শ্বাস-পরশ্বাসের নলটি খুলে ফেলে।

আপনার কেয়ার টিম সাধারণত অপারেশন থিয়েটারেই থাকাকালীন আপনার শ্বাসনালীর টিউবটি খুলে ফেলবে।

এই বিভাগটি আপনাকে আপনার অস্বেতরূপচারের পরে কী হতে পারে তা জানতে সহায়তা করবে। হাসপাতাল ও বাড়ি উভয় জায়গা থেকে কিভাবে নিরাপদে সুস্থ হওয়া যায় আপনি তা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

আপনি এই বিভাগটি পড়ার সাথে সাথে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রশ্নাবলী লিখুন।

পোস্ট-অ্যানেস্থেসিয়া কেয়ার ইউনিট (PACU) বা আপনার রিকভারি রুমে


আপনি আপনার অস্বেত্রাপচারের পর জেগে উঠলে PACU বা আপনার রিকভারি রুমে থাকবেন। একজন নাসর্ আপনার তাপমাত্রা, নাড়ি, রক্তচাপ এবং অক্সিজেনের মাত্রা পর্যবেক্ষণ করতে থাকবেন। আপনি আপনার নাকের নিচে অংশে একটি টিউব দিয়ে অথবা আপনার নাক ও মুখের মাঝখানে একটি মাস্কের মাধ্যমে অক্সিজেন নিতে পারেন। এছাড়াও আপনার পায়ে নিচের অংশে কম্প্রেশন বুট থাকবে।

টিউব ও ডের্ন

আপনার বুকে একটি সাজির্ক্যাল বরা থাকবে যা আপনার সাজির্ক্যাল স্থান ঢেকে রাখবে এবং বরাটির সাথে অন্তত ১টি জয়কসন-পর্যাট (JP) ডের্ন (চিত্র ২ দেখুন) সংযুক্ত থাকবে। জেপি ডের্ন আপনার কাটা স্থান(গুলো) থেকে তরল বের করতে সাহায্য করবে এবং ফোলা প্রতিরোধ করবে। আপনি আপনার চেরা অংশ(গুলো) এবং ডের্ন(গুলো) এর যত্ন নিতে সাহায্য করার জন্য বাড়িতে নিয়ে যাওয়ার জন্য সরঞ্জাম এবং একটি অতিরিক্ত সাজির্ক্যাল বরা পাবেন।

আপনার ব্যথা থেকে উপশম পাওয়া

অস্বেত্রাপচারের পরে আপনার কিছুটা ব্যথা অনুভব হবে। এটি সামলাতে আপনাকে সাহায্য করার জন্য:



চিত্র ২. জেপি ডের্ন

- আপনার আইভি লাইনের মাধ্যমে আপনাকে বয়্খার ওষুধ দেওয়া হবে।
- আপনি যখন সব্ভাবিক খাবার খেতে পারবেন, তখন আপনাকে মুখে খাওয়ার বয়্খানাশক ওষুধ দেওয়া হবে (যে ওষুধ আপনি গিলে খান)।

আমরা আপনাকে পরায়শই আপনার বয়্খা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করব এবং পরয়োজন অনুযায়ী আপনাকে ওষুধ দিব। বয়্খা না কমলে আপনার সব্স্থসেবা পরদানকারীকে বলুন। আপনার বয়্খা নিয়ন্তরণ করা গুরুত্বপূর্ণ যাতে আপনি আপনার ইনসেনিটভ স্পিরোমিটার ব্যবহার করতে পারেন এবং চলাফেরা করতে পারেন। আপনার বয়্খা নিয়ন্তরণ আপনাকে আরো দ্রুত সুস্থ হতে সাহায্য করবে।

আমরা আপনাকে বাড়িতে নেওয়ার জন্য বয়্খার ওষুধও দেব। সম্ভাব্য পাশব্র্পরতিকির্যার বিষয়ে আপনার সব্স্থসেবা পরদানকারীর সাথে কথা বলুন। কখন ওভার-দয়্-কাউন্টার বয়্খানাশক ওষুধে সুইচ করা শুরু করতে হবে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করুন।

চলাফেরা ও হাঁটা

চলাফেরা ও হাঁটা আপনার রক্ত জমাট বাঁধা এবং নিউমোনিয়ার ঝুঁকি হ্রাস করতে সহায়তা করবে (ফুসফুসের সংকরমণ)। এটি আপনাকে গয়্াস নিগরত করা এবং পুনরায় মলতয়্গ করা (মলতয়্গ) শুরু করতে সহায়তা করবে। পরয়োজন হলে আপনার নাসর, ফিজিকয়্যাল থেরাপিস্ট বা অকুপেশনাল থেরাপিস্ট আপনাকে চলাফেরা করতে সহায়তা করবে।

কিভাবে হাঁটা আপনাকে সুস্থ হতে সাহায্য করতে পারে সে সম্পর্কে আরো জানতে *Frequently Asked Questions About Walking After Your Surgery* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/frequently-asked-questions-about-walking-after-your-surgery) পড়ুন।

হাসপাতালে থাকাকালীন নিরাপদ থাকতে এবং পড়ে যাওয়া থেকে বাঁচতে আপনাকে কী করতে হবে তা জানতে *Call! Don't Fall!*

(www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/call-dont-fall)

পড়ুন।

আপনার ফুসফুসের ব্যায়াম

আপনার ফুসফুসের ব্যায়াম করা গুরুত্বপূর্ণ যেন তা পুরোপুরি পরিসারিত হয়। এটি নিউমোনিয়া প্রতিরোধে সহায়তা করে।

- জেগে থাকা অবস্থায় আপনার ইনসেন্টিভ স্পাইরোমিটারটি প্রতি ঘণ্টায় 10 বার ব্যবহার করুন। আরো জানতে *How To Use Your Incentive Spirometer* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-use-your-incentive-spirometer) পড়ুন।
- কাশি এবং গভীর শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যায়াম করুন। কিভাবে করতে হয় তা আপনার পরিচর্যা দলের একজন সদস্য আপনাকে শেখাবেন।

খাওয়া ও পান করা

প্রথমে, আপনি পানি বা জুস পান করতে পারেন। তারপর, আপনি কর্ণারসের মতো শক্ত খাবার খেতে শুরু করতে পারেন। এরপর আপনি আপনার স্বাভাবিক খাবার আবার খেতে শুরু করতে পারেন, যখন আপনি সক্ষম হবেন। আপনার ডায়েট সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকলে, একজন ক্লিনিকাল ডায়েটিশিয়ান পুষ্টিবিদের সাথে দেখা করুন।

আপনার টিউব এবং ডের্নের যত্ন নেওয়া

আপনি অন্তত ১টি JP ডের্ন লাগানো অবস্থায় বাড়ি ফিরবেন। সাধারণত অস্ত্রোপচারের পর ২ সপ্তাহ পর ডের্নগুলো অপসারণ করা হয়, তবে প্রয়োজন হলে আরও বেশি সময় রাখা হতে পারে।

আপনি হাসপাতাল ছাড়ার আগে একজন নার্স আপনাকে ডের্নের যত্ন

কীভাবে নিতে হয় তা শেখাবেন। আপনার পরিচয়কারীও শিখলে তা সহায়ক হবে। এর ফলে তারা আরো সহজে আপনাকে বাড়িতে সাহায্য করতে পারবেন।

আরও জানার জন্য পড়ুন *Caring for Your Jackson-Pratt Drain* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/caring-your-jackson-pratt-drain).

ডিসচার্জের পরিকল্পনা

অস্ত্রোপচারের পর আপনার প্রথম অ্যাপয়েন্টমেন্ট সাধারণত হাসপাতাল ছাড়ার ১ থেকে ২ সপ্তাহের মধ্যে হবে। আপনার নাসর আপনাকে এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট কীভাবে করতে হবে তার নির্দেশনা দেবেন, যার মধ্যে কল করার ফোন নম্বরও থাকবে।

হাসপাতাল ত্যাগ করা

হাসপাতাল ছাড়ার আগে, আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীদের একজনের সাথে আপনার অস্ত্রোপচারের কাটা স্থান(গুলো) দেখে নিন। সেগুলি দেখতে কেমন তা জানলে পরে যেকোনও পরিবর্তন লক্ষ্য করতে পারবেন।

আপনি যাওয়ার আগে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী আপনার ছাড়পত্রের আদেশ এবং ওষুধের প্রেসক্রিপশন লিখে দেবেন। এছাড়াও আপনি লিখিত ডিসচার্জ নির্দেশাবলী পাবেন। আপনি চলে যাওয়ার আগে আপনার একজন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী আপনার সাথে সেগুলি পর্যালোচনা করবেন।

আপনাকে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার জন্য একজন দায়িত্বশীল পরিচয়কারী সঙ্গীর প্রয়োজন হবে।

বাড়িতে

বাড়িতে ও MSK-তে অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় আপনার পড়ে যাওয়া রোধ করতে যা করতে পারেন তা সম্পর্কে জানতে *What You Can Do to Avoid*

Falling (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/what-you-can-do-avoid-falling) পড়ুন।

আপনার সুস্থ হওয়ার টরয়্কার পূরণ করা

হাসপাতাল ত্যাগ করার পর আপনি কেমন অনুভব করছেন তা আমরা জানতে চাই। আপনার যত্ন নিতে আমাদের সাহায্য করতে, আপনার MSK MyChart অ্যাকাউন্টে আমরা কিছু প্রশ্ন পাঠাবো। আপনার ডিসচার্জ হওয়ার পর 10 দিনের জন্য আমরা প্রতিদিন সেগুলো পাঠাব। এই প্রশ্নাবলী আপনার সুস্থ হওয়ার টরয়্কার হিসাবে পরিচিত।

প্রতিদিন মধ্যরাতের আগে (রাত 12টা) আপনার সুস্থ হওয়ার টরয়্কারটি পূরণ করুন। এটি সম্পূর্ণ করতে মাত্র 2 থেকে 3 মিনিট সময় লাগে। এই প্রশ্নাবলীর আপনার উত্তর আমাদের বুঝতে সহায়তা করবে যে আপনি কেমন বোধ করছেন এবং আপনার কী প্রয়োজন।

আপনার উত্তরের উপর ভিত্তি করে, আমরা আরো তথ্যের জন্য আপনার সাথে যোগাযোগ করতে পারি। কখনো কখনো, আমরা আপনাকে আপনার সার্জনের অফিসে কল করতে বলতে পারি। আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনি সবসময় আপনার সার্জনের অফিসে যোগাযোগ করতে পারেন।

আরো জানতে *Common Questions About MSK's Recovery Tracker* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/mymsk-recovery-tracker) পড়ুন।

আপনার ব্যথা থেকে উপশম পাওয়া

ব্যথা বা অস্বস্তির সময়কাল ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। আপনি বাড়িতে যাওয়ার পরেও আপনার কিছুটা ব্যথা থাকতে পারে এবং ব্যথা কমানোর ওষুধ সেবন করতে হতে পারে। কিছু মানুষের অস্ত্রোপচারের কাটা স্থান(গুলো)র আশেপাশে ৬ মাস বা তারও বেশি সময় ধরে ব্যথা, টান বা পেশিতে ব্যথা থাকতে পারে। এর মানে এই নয় যে কোনো সমস্যা হয়েছে।

বাড়িতে আপনার বয়্খা উপশম করার বয়্খাপারে এই নিদেৰ্শাবলী অনুসরণ করুন।

- আপনাকে পরদান করা নিদেৰ্শনা এবং পরয়োজন অনুযায়ী ওষুধ সেবন করুন।
- পেৰ্সকরাইব করা ওষুধ সেবনের পরেও যদি বয়্খা না কমে, তাহলে আপনার সব্স্থসেবা পরদানকারীকে কল করুন।
- বয়্খা কমানোর জনয়্ পেৰ্সকির্পশনে উল্লেখ করা ওষুধ সেবনের সময় গাড়ি চালাবেন না বা মদ পান করবেন না। পেৰ্সকির্পশনের কিছু বয়্খার ওষুধ আপনাকে তন্দরাচ্ছন্ন করতে পারে (খুবই ঘুম পাওয়া)। অয়্যালকোহল তন্দরার পরভাবকে আরো তীবর করে তুলতে পারে।
- আপনার অসেত্রাপচারের কাটা স্থান সেরে যাওয়ার সাথে সাথে আপনার বয়্খা কমেতে থাকবে এবং বয়্খার জনয়্ কম ওষুধের পরয়োজন হবে। ওভার-দয়্-কাউন্টার বয়্খানাশক বয়্খা এবং অসব্স্থিত দূর করতে সাহাযয়্ করবে। অয়্যাসিটামিনোফেন (Tylenol®) এবং আইবুপেৰ্য়াফেন (Advil বা Motrin) হলো ওভার-দয়্-কাউন্টার বয়্খানাশক ওষুধের উদাহরণ।
 - আপনার পেৰ্সকির্পশনের বয়্খার ওষুধ বন্ধ করার জনয়্ আপনার সব্স্থসেবা পরদানকারীর নিদেৰ্শাবলী অনুসরণ করুন।
 - যেকোনো ওষুধ খুব বেশি খাবেন না। আপনার হেলথেকেয়ার পেৰ্ভাইডারের বা লেবেলে থাকা নিদেৰ্শাবলী অনুসরণ করুন।
 - আপনি যে সকল ওষুধ খাচ্ছেন তার লেবেলগুলি পড়ুন। আপনি যদি অয়্যাসিটামিনোফেন গ্রহণ করেন তাহলে এটি খুবই গুরুতব্পূর্ণ। অয়্যাসিটামিনোফেন অনেক ওভার-দয়্-কাউন্টার এবং পেৰ্সকির্পশনে ওষুধের একটি উপাদান। অতয়্যধিক সেবন করলে আপনার লিভারের ক্ৰতি হতে পারে। আপনার কেয়ার টিমের কোনো সদসেয়্ সাথে কথা না বলে অয়্যাসিটামিনোফেনযুক্ত একাধিক ওষুধ খাবেন না।

- বয়্খার ওষুধ আপনাকে আপনার সবাভাবিক কাজকমের্ ফিরে আসতে সাহায্য্ করবে। আরামদায়কভাবে আপনার কাজকমর্ এবং বয্যাম করার জনয্ যথেষ্ট পরিমাণে গরহণ করুন। আপনি বেশি সক্রিয় হতে শুরু করলে আপনার হয়তো একটু বেশি বয্খা হতে পারে।
- আপনি কখন বয়্খার ওষুধ সেবন করছেন, তার উপর নজর রাখুন। এটি সেবন করার 30 থেকে 45 মিনিট পরে এটি কাজ করে। বয্খা বেড়ে যাওয়ার জনয্ অপেক্ষা করার চেয়ে বরং যখন বয্খা শুরু হয়, তখনই ওষুধ সেবন করলে তা বেশি কাযর্কর হয়।

কিছু পের্সকির্পশন বয়্খার ওষুধ যেমন অপিয়য়েড (opioid) এর কারণে কোষ্ঠকাঠিনয্ হতে পারে। কোষ্ঠকাঠিনয্ হলো সবাভাবিকের তুলনায় কম ঘন ঘন মলতয্যগ করা, মলতয্যগ করার সময় কষ্ট হওয়া অথবা উভয়ই।

কোষ্ঠকাঠিনয্ প্রতিরোধ ও উপশম করা

কিভাবে আপনার কোষ্ঠকাঠিনয্ প্রতিরোধ ও উপশম করবেন, সে বিষয়ে আপনার সব্স্থয্সেবা পর্দানকারীর সাথে কথা বলুন। আপনি এই নিদের্শনাবলী অনুসরণ করতে পারেন।

- প্রতিদিন একই সময়ে বাথরুমে যান। সেই সময় বাথরুম যাওয়ার সাথে আপনার শরীর অভয্স্ত হয়ে উঠবে। তবে আপনি যদি বাথরুম যাওয়ার পর্য্যোজন বোধ করেন, তাহলে তা চেপে রাখবেন না।
- খাবার খাওয়ার 5 থেকে 15 মিনিট পরে বাথরুম ব্যবহার করার চেষ্টা করুন। সকালের নাস্তা খাবার পর বাথরুম যাওয়া ভালো। এই সময়ে আপনার কোলোনের কাযর্ক্ষমতা সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী থাকে।
- যদি পারেন, তাহলে বয্যাম করুন। হাঁটা একটি কাযর্কর বয্যাম যা কোষ্ঠকাঠিনয্ প্রতিরোধ ও উপশম করতে সাহায্য্ করতে পারে।
- সম্ভব হলে প্রতিদিন 8 থেকে 10 (8-আউন্স) কাপ (2 লিটার) পানীয় পান করুন। পানি, জুস (যেমন আলুবোখারার জুস) সুয্প এবং মিল্কশেক বেছে

নিন। ক্যাফেইনযুক্ত পানীয়, যেমন কফি এবং সোডা কম পান করুন।

ক্যাফেইন আপনার শরীর থেকে তরল বের করে দেয়।

- আপনার ডায়েটে ফাইবারের পরিমাণ ধীরে ধীরে, দিনপরি 25 থেকে 35 গ্রাম করে বাড়ান। খোসাযুক্ত ফল ও শাকসবজি গোটা শস্য এবং সিরিয়ালে ফাইবার (খাদ্য আঁশ) থাকে। আপনার যদি ওস্টমি থাকে বা সম্প্রতি অন্ত্রের অস্বস্তি পড়েছে, তাহলে আপনার ডায়েটে কোনো পরিবর্তন করার আগে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে কথা বলুন।
- কোষ্টিকাঠিন দূর করতে ওভার-দ্য-কাউন্টার এবং পেরিস্ক্রিপশনের ওষুধ উভয়ই ব্যবহার করা যেতে পারে। কোষ্টিকাঠিনের জনস্বাস্থ্যে কোনো ওষুধ খাওয়ার আগে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে কথা বলুন। আপনার যদি ওস্টমি থাকে বা অন্ত্রের অস্বস্তি পড়েছে তাহলে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার হেলথকেয়ার প্রভাইডারের বা লেবেলে থাকা নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। কোষ্টিকাঠিনের জনস্বাস্থ্যে ওভার-দ্য-কাউন্টার ওষুধের উদাহরণ হলো:
 - ডকুসেট সোডিয়াম (Colace®)। এটি মল নরমকারক (এমন ওষুধ যা আপনার মল নরম করে) যার সামান্য কিছু পাশবর্ষ প্রতিকিয়া আছে। কোষ্টিকাঠিন প্রতিরোধে আপনি এটি ব্যবহার করতে পারেন। এটি খনিজ তেলের সাথে সেবন করবেন না।
 - পলিএথিলিন গ্লাইকল (MiraLAX®)। এটি একটি রেচক (এমন ওষুধ যা আপনার মলত্যাগে সাহায্য করে) যার সামান্য কিছু পাশবর্ষ প্রতিকিয়া আছে। এটি 8 আউন্স (1 কাপ) লিকুইডের সাথে সেবন করুন। ইতোমধ্যে আপনার কোষ্টিকাঠিন হলেই কেবল এটি গ্রহণ করুন।
 - সেনা (Senokot®)। এটি একটি উত্তেজক রেচক, যার কারণে ক্র্যাম্পিং হতে পারে। বিছানায় যাওয়ার সময় এটি সেবন করা সবচেয়ে ভালো। ইতোমধ্যে আপনার কোষ্টিকাঠিন হলেই কেবল এটি গ্রহণ করুন।

এই ওষুধগুলির যেকোনোটির কারণে ডায়রিয়া (ঘন ঘন তরল বা পানির মতো মলত্যাগ) হলে এগুলি গ্রহণ করা বন্ধ করুন। পরয়োজন হলে আপনি পুনরায় শুরু করতে পারেন।

২ দিন ধরে মলত্যাগ না হলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ করুন।

সুস্থ হওয়ার পরিক্রিয়া এবং নতুন অনুভূতি

অস্বাস্থ্যের পর আপনি সেরে উঠতে থাকলে আপনার হাত, বক্ষ বা বুকের পরীক্ষার বিভিন্ন ধরনের অনুভূতি হতে পারে। আপনি কোমলতা, অবশ্যাব, হালকা খোঁচা লাগার মতো ব্যথা বা এই তিনটিই অনুভব করতে পারেন। আপনি এমন অনুভূতিও পেতে পারেন যেন আপনার হাত বেয়ে তরল নামছে, যদিও বাস্তবে কোনো তরল নেই। এটি হতে পারে কারণ অস্বাস্থ্যের সময় আপনার স্নায়ু কেটে গেছে।

আপনার মাস্টেকটমির পরও আপনি অনুভব করতে পারেন যে আপনার স্তন বা নিপল এখনও আছে। এটিকে ফ্যান্টম সেনসেশন (ভূতুড়ে অনুভূতি) বলা হয়।

এই অনুভূতিগুলো সাধারণত আসা-যাওয়া করে এবং অস্বাস্থ্যের পর প্রথম কয়েক মাসের মধ্যেই ভালো হয়ে যায়। কিছু অনুভূতি কয়েক মাস বা এমনকি ৫ বছর বা তারও বেশি সময় ধরে থাকতে পারে। এর কারণ হলো স্নায়ু আপনার শরীরের সবচেয়ে ধীরে সেরে ওঠা অংশ। বেশিরভাগ মানুষ বলেন এই অনুভূতিগুলো তীব্র বা কষ্টদায়ক নয়।

অনুভূতির পরিবর্তনের কারণে, আপনার অস্বাস্থ্যের স্থানে সরাসরি কোনো গরম বা ঠান্ডা জিনিস (যেমন গরম পানির বোতল, হিটিং প্যাড বা আইস প্যাক) রাখবেন না।

আপনি যখন সুস্থ হয়ে উঠতে থাকবেন, তখন আপনার অস্বাস্থ্যের কাটা স্থান(গুলো) বরাবর দাগের টিসুয় অনুভব করতে পারেন। এটি শক্ত মনে হবে।

এটি সাধারণ বয়্যাপার, এবং আগামী কয়েক মাসের মধ্যে এটি নরম হয়ে যাবে।

আপনার কাটা স্থান(গুলো)-এর যত্ন নেওয়া

আপনার কাটা স্থান(গুলো) তব্কেব নিচে সেলাই (সিউচার) দিয়ে বন্ধ করা থাকবে। এই সেলাইগুলো নিজে থেকেই গলে যায় এবং এগুলো অপসারণ করার পরয়োজন হয় না। যদি আপনার কাটা স্থান(গুলো)-এর উপর ছোট ছোট সাজির্কয়াল টেপ (Steri-Strips) থাকে, তাহলে আপনার সাজরন বা নাসর্ ফলো-আপ অয়্যপয়েন্টমেন্ট সেগুলো খুলে দেবেন। যদি আপনার কাটা স্থান(গুলো)-এর উপর সাজির্কয়াল গ্লু (Dermabond) থাকে, এটি সময়ের সাথে সাথে নিজে থেকেই গলে যাবে।

আপনার কাটা স্থান(গুলো) কতবার পরিষ্কার করতে হবে তা আপনার সব্স্থয়সেবা পরদানকারীর নিদেব্শনা অনুযায়ী অনুসরণ করুন।

অসেত্র্যপচারের এক বা দুই সপ্তাহ পরে, টিসুয় অপসারণ করা হয়েছে এমন আপনার বগল বা স্তনের তব্কেব নিচে তরলের একটি পকেট তৈরি হতে পারে। এটিকে সেরোমা বলা হয়, এবং এটি ক্ষতিকর নয়। সেই স্থানটি নরম ও ফোলা মনে হতে পারে। এটি স্পশেব্ বয়্যথায়ুক্তও মনে হতে পারে।

সেরোমা সাধারণত নিজে থেকেই সেরে যায়। যদি আপনার বড় সেরোমা হয় বা অসব্স্থিত লাগে, তাহলে আপনার চিকিৎসক বা নাসেব্ৰ সাথে আলোচনা করতে আপনার সব্স্থয়সেবা পরদানকারীর অফিসে যোগাযোগ করুন।

আপনার সব্স্থয়সেবা পরদানকারীকে ফোন করুন, যদি:

- আপনার কাটা স্থান(গুলো)-এর চারপাশের তব্ক খুব লাল হয়ে গেছে।
- আপনার কাটা স্থান(গুলো)-এর চারপাশের তব্ক আরও বেশি লাল হয়ে যাচ্ছে।
- পুঁজের মতো রস বেরোতে দেখছেন (গাড় ও দুধের মতো)।

খাওয়া ও পান করা

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী যদি আপনাকে অন্য কোনো নির্দেশ না দিয়ে থাকেন, তাহলে অস্ত্রোপচারের আগে যেসব খাবার খেতেন, তা খেতে পারবেন। অস্ত্রোপচারের পর সুস্থ হওয়ার জন্য অনেক ক্যালোরি এবং প্রোটিনযুক্ত ব্যালেন্সড ডায়েট সাহায্য করবে। পরে খাবারের সাথে পর্যাপ্ত পরিমাণ প্রোটিন খাওয়ার চেষ্টা করুন (যেমন মাংস, মাছ বা ডিম)। এছাড়া ফল, শাক-সব্জি এবং গোটা দানাশস্য খাওয়ার চেষ্টা করুন।

পর্যাপ্ত পরিমাণে পানীয় পান করা গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন ৪ থেকে ১০ (৪-আউন্স) কাপ তরল পানীয় পান করার চেষ্টা করুন। অ্যালকোহলবিহীন তরল বেছে নিন। ক্যাফেইনযুক্ত তরল সীমিত করুন।

আপনার ডায়েট সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকলে, একজন ক্লিনিকাল ডায়েটিশিয়ান পুষ্টিবিদের সাথে দেখা করুন।

গোসল করা

আপনার যদি স্তন পুনর্গঠন (ব্রেস্ট রিকনস্ট্রাকশন) হয়ে থাকে, তাহলে কখন গোসল করতে পারবেন এবং কোনো বিশেষ নির্দেশনা আছে কি না সে বিষয়ে আপনার প্লাস্টিক সার্জনের সাথে কথা বলুন। আপনার যদি পুনর্গঠন (রিকনস্ট্রাকশন) না হয়ে থাকে, তাহলে অস্ত্রোপচারের ২৪ ঘণ্টা পরে আপনি গোসল করতে পারবেন। বাড়ি যাওয়ার আগে, আপনার নাসর আপনাকে গোসল করার সময় কীভাবে ডের্নগুলো নিরাপদে রাখতে হয় তা শেখাবেন।

গোসল করার জন্য পরস্তুত হলে, আপনার সার্জিক্যাল বর্ড এবং কাটা স্থান(গুলো)-এর উপর থাকা যেকোনো গজ প্যাড খুলে ফেলুন। আপনার কাটা স্থান(গুলো)-তে যদি Steri-Strips বা Dermabond থাকে, তাহলে সেগুলো খুলবেন না।

সাবধানে সাবান ও পানি দিয়ে আপনার কাটা স্থান(গুলো) পরিষ্কার করুন এবং শাওয়ারের পানি সেগুলোর উপর দিয়ে বয়ে যেতে দিন।

পরিষ্কার তোয়ালে দিয়ে আস্তে করে জায়গাগুলো শুকিয়ে নিন। আপনার সাজির্ক্যাল বর্ন আবার পরে নিন এবং ডের্নগুলো বর্ন সাথে সুরক্ষিতভাবে লাগিয়ে রাখুন। যদি বেশি আরাম লাগে, তাহলে বর্ন নিচে আপনার কাটা স্থান(গুলো)-এর উপর একটি পরিষ্কার গজ প্যাড রাখতে পারেন।

আপনার সবস্বাস্থ্যসেবা পরদানকারী অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত গোসলের টব, হট টাব, সাউনা এবং সুইমিং পুল এড়িয়ে চলুন। এছাড়াও, আপনার অস্কেতর্যপচারের স্থানের আশেপাশে ডিওডোরান্ট, লোশন, পাউডার বা পারফিউম ব্যবহার করার আগে আপনার সবস্বাস্থ্যসেবা পরদানকারীর সাথে কথা বলুন।

বর্ন পরা

যদি আপনাকে সাজির্ক্যাল বর্ন দেওয়া হয়ে থাকে, তাহলে ডের্ন(গুলো) অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত এটি পরতে থাকুন। এর পরে কী পরবেন সে বিষয়ে আপনার সবস্বাস্থ্যসেবা পরদানকারীর সাথে কথা বলুন। আপনার সাজির্ক্যাল বর্ন সহায়তা দেবে, আপনাকে আরামদায়ক রাখবে এবং আপনার ডের্ন(গুলো)কে স্থানে ধরে রাখবে। আপনি ঘুমানোর সময় আপনার সাজির্ক্যাল বর্ন পরবেন, তবে গোসলের আগে এটি খুলে ফেলবেন।

আপনি যখন আপনার অস্কেতর্যপচারের পর সেরে উঠছেন বা স্তন পুনঃগঠনের বিভিন্ন ধাপ পার করছেন, তখন আপনার বর্ন-তে প্যাড ব্যবহার করে আপনার চেহারার ভারসাম্য বজায় রাখা যেতে পারে। বর্ন পূরণ করার একটি উপায় হলো নরম বেরস্ট ফর্ম (অস্থায়ী বেরস্ট পরস্কেসিস) ব্যবহার করা। এই বেরস্ট ফর্মটি একটি হালকা ওজনের নাইলন পাউচ। আপনি পাউচের ভিতরের তুলার পরিমাণ বাড়িয়ে বা কমিয়ে আপনার অন্তঃস্তনের সাথে মিলিয়ে এর আকার ঠিক করতে পারেন। আপনি নাইলন পাউচটি হালকা সাবান যেমন Woolite® বা Ivory® দিয়ে ধুয়ে নিয়ে তারপর বাতাসে শুকাতে দিতে পারেন।

অনেক ধরনের বেরস্ট পরস্কেসিস এবং বর্ন বিকির করে এমন বিশেষায়িত

দোকান রয়েছে। আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, এই পণ্যগুলো ওয়েবসাইট থেকে কিনতে পারেন। আপনি এগুলো স্থানীয় মাসটেকটমি বুটিক এবং লঞ্চারি সেটর থেকেও কিনতে পারেন। অনলাইন দোকান এবং আপনার এলাকার দোকানগুলোর তালিকা খুঁজে পেতে, পড়ুন *Resources, Clothing, and Support After Breast Surgery* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/resources-clothing-support-breast-surgery).

আপনি আপনার বরাযের ভেতর নরম গজও (gauze) রাখতে পারেন, যা আপনি নাসেরর কাছ থেকে সংগরহ করতে পারবেন। গজটি সবসময় পরিষ্কার রাখার জন্য নিয়মিত বদলাতে হবে।

স্তন ও নিপল পরস্েথসিস

বেরস্ট পরস্েথসিস হলো নরম নাইলন পাউচের তুলনায় বেশি স্থায়ী একটি বেরস্ট ফর্ম।

নিপল পরস্েথসিস হলো সিলিকন দিয়ে তৈরি একটি কৃতির্ম নিপল এবং অয়ারিওলা (নিপলের চারপাশের বৃত্তাকার অংশ)। এটি আঠা (বিশেষ গ্লু) ব্যবহার করে আপনার পুনগঠিত স্তন বা বেরস্ট পরস্েথসিসের সাথে লাগানো যায়। নিপল পরস্েথসিস বিভিন্ন আকার এবং তব্কের রঙে পাওয়া যায়, যাতে এটি আপনার পরাকৃতিক নিপলের সাথে মিলিয়ে নেওয়া যায়।

আপনার যদি স্তন পুনগঠন (বেরস্ট রিকনস্ট্রাকশন) না হয়ে থাকে, তাহলে সাধারণত অস্েত্রাপচারের পরায় ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ পরে আপনি বেরস্ট ও নিপল পরস্েথসিস পরা শুরু করতে পারেন।

আপনি যদি স্তন ও নিপল পরস্েথসিস (কৃতির্ম স্তন ও বোঁটা) ব্যবহার করতে আগরহী হন, তাহলে আপনার ডাক্তারের সঙ্গ কথা বলুন। আপনার ফলো-আপ অযাপযেন্টমেন্টের সময় তারা আপনাকে এই পরস্েথটিক ডিভাইসগুলোর জন্য একটি পেরস্কির্পশন দিতে পারবেন। আপনার

পর্যবেক্ষণিক ডিভাইসগুলোর জন্য কী কী খরচ বীমার আওতাধীন রয়েছে তা জানতে আপনার বীমা কোম্পানির সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

এমন বিশেষায়িত দোকান রয়েছে যেখানে বিভিন্ন ধরনের স্তন ও নিপল পরিস্থিতিসহ এবং বর্ন বিক্রি করা হয়। আপনি যেখানেই থাকুন না কেন, এই পণ্যগুলো ওয়েবসাইট থেকে কিনতে পারেন। আপনি এগুলো স্থানীয় মাসটেকটমি বুটিক এবং লঞ্চারি স্টোর থেকেও কিনতে পারেন। অনলাইন দোকান এবং আপনার এলাকার দোকানগুলোর তালিকা জানতে, পড়ুন। *Resources, Clothing, and Support After Breast Surgery* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/resources-clothing-support-breast-surgery).

শারীরিক কার্যকলাপ এবং ব্যায়াম

যদি আপনার স্তন পুনর্গঠন (ব্রেস্ট রিকনস্ট্রাকশন) করা হয়ে থাকে, তবে আপনার ডাক্তার নিরাপদ বলে না জানানো পর্যন্ত ৫ পাউন্ড (২.৩ কিলোগ্রাম) এর বেশি ওজনের কোনো বস্তু তুলবেন না। সাধারণত এটি পর্যা ৪ থেকে ৬ সপ্তাহ সময় লাগে। এছাড়াও, এই সময়ে কঠোর শারীরিক কার্যকলাপ (যেমন জগিং ও টেনিস) এবং সংস্পর্শমূলক খেলাধুলা (যেমন ফুটবল) এড়িয়ে চলুন।

আপনার অস্ত্রোপচারের কাটার স্থান(গুলো) সেরে ওঠার সময় কোন কোন ব্যায়াম ও নড়াচড়া করতে পারবেন, সে সম্পর্কে আপনার চিকিৎসা দলের একজন সদস্য আপনার সঙ্গে আলোচনা করবেন। তাদের নির্দেশনা এবং নির্দেশিকা দেওয়া নির্দেশনা অনুসরণ করুন। *Exercises After Your Mastectomy or Breast Reconstruction* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/exercises-after-mastectomy-or-reconstruction).

আপনার অস্ত্রোপচারের স্থানের চারপাশে যে দাগের টিসু (স্কার টিসু)

তৈরি হয়, তা আপনার হাত ও কাঁধের নড়াচড়ার পরিসর সীমিত করতে পারে। যদি আপনার পুনগঠন করা হয়ে থাকে, তবে আপনার পেশিতে বয়খা বা টানটান ভাবও থাকতে পারে। যদি আপনার অসবিস্ত হয়, তবে বয়খাম শুরু করার ৩০ মিনিট আগে বয়খানাশক ওষুধ গ্রহণ করা সহায়ক হতে পারে।

অস্বেত্ৰাপ্চারের পর সবা্ভাবিকের চেয়ে কম শক্তি থাকবে এটাই সবা্ভাবিক বিষয়। বয়্কিত ভেদে আরোগয় লাভ করার সময় ভিন্ হয়। আপনার সামথরয় অনুযায়ী পর্তিদিন আপনার কাযরকলাপ বাড়ান। সবসময় বিশরামের সময়কালের সাথে কাযরকলাপের সময়সীমার ভারসাময় বজায় রাখুন। অয্ারোবিক বয়খাম করুন, যেমন হাঁটা এবং সিঁড়িতে ওঠা যা আপনাকে শক্তি পেতে ও ভালো বোধ করতে সাহাযয় করবে।

যৌন কাযরকলাপ

আপনি যখন নিজেকে পরস্তুত মনে করবেন, তখন আবার যৌন কাযরকলাপ শুরু করতে পারেন। যৌন সম্পকর্ স্থাপন আপনার অস্বেত্ৰাপ্চারের স্থানে কোনো ক্ষতি করবে না।

অস্বেত্ৰাপ্চারের পর অল্প সময়ের মধ্যেই আপনার সঙ্গীকে আপনার কাটার স্থান(গুলো) দেখতে দেওয়া সহায়ক হতে পারে। এটি আপনাদের উভয়েরই যেকোনো উদেব্গ কমাতে সহায়তা করতে পারে। আপনার সঙ্গীকে জানান কী আপনার জনয় আরামদায়ক এবং কী নয়। অস্বেত্ৰাপ্চারের পর পরথম কয়েক সপ্তাহে অস্বেত্ৰাপ্চারের স্থানে চাপ পড়া এড়িয়ে চলুন। অস্বেত্ৰাপ্চারের স্থানের ওপর একটি ছোট বালিশ বা তোয়ালে রাখার চেষ্টা করুন। আপনার কোনো পরশ্ন থাকলে, আপনার নাসের্ সঙ্গে কথা বলুন।

কযান্সার এবং এর চিকিৎসা আপনার চেহারা বা যৌনতার ওপর কী পর্ভাব ফেলতে পারে তা নিয়ে আপনার উদেব্গ থাকতে পারে। আমাদের [নারী যৌন চিকিৎসা ও নারীর সবস্থয় কমরসুচি](#) আপনাকে সাহাযয় করার জনয় উপলব্ধ রয়েছে। আরও তথ্যের জনয় ৬৪৬-৮৮৮-৫০৭৬ নমব্রে কল করুন।

আপনার গভর্ধারণের সম্ভাবনা থাকলে, অবশ্যই জন্মনিয়ন্তরণ ব্যবহার করুন। কোনো ধরনের হরমোনাল জন্মনিয়ন্তরণ ব্যবহার করবেন না। আপনার জন্মনিয়ন্তরণের বিকল্পগুলো হলো:

- পুরুষ কনডম
- ডায়াফরাম
- কপার টি আইইউডি (Copper T IUD) আপনি যদি এই পদ্ধতিতে আগরহী হন, তাহলে আপনার স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞের সঙ্গে কথা বলুন। এই ধরনের আইইউডি ১০ বছর পর্যন্ত রাখা যেতে পারে অথবা আগেই অপসারণ করা যেতে পারে।

আপনার চিকিৎসার সময় এবং আপনার ডাক্তার গভর্ধারণের চেষ্টা করা নিরাপদ বলে না বলা পর্যন্ত জন্মনিয়ন্তরণ ব্যবহার চালিয়ে যান।

গাড়ি চালানো

অধিকাংশ লোক অস্বেতরূপচারের পর ৬ সপ্তাহের মধ্যে পুনরায় গাড়ি চালানো শুরু করতে পারেন। পেরস্কির্পশনে দেওয়া ব্যথানাশক ওষুধ সেবন করার সময় গাড়ি চালাবেন না। এই ওষুধগুলো আপনাকে ঘুমঘুম বা তন্দরাচ্ছন্ন করে তুলতে পারে, যার ফলে গাড়ি চালানো আপনার জন্য নিরাপদ নাও হতে পারে। আপনি হাসপাতাল ছেড়ে যাওয়ার পর যাত্রী হিসেবে যেকোনো সময় গাড়িতে চড়তে পারবেন।

এছাড়াও, নিম্নলিখিত অবস্থাগুলো না হওয়া পর্যন্ত গাড়ি চালাবেন না:

- আপনার ডের্ন(গুলো) অপসারণ করা হয়েছে।
- আপনার সম্পূর্ণ নড়াচড়ার ক্ষমতা (রেঞ্জ অফ মোশন) পুনরুদ্ধার হয়েছে।
- আপনি সব্চ্ছন্দে সিটয়ারিং হুইল ঘোরাতে পারেন।

আপনার জনন্ কখন গাডি চালানো নিরাপদ হবে সে সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন থাকলে, আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সঙ্গে কথা বলুন।

কাজে ফিরে যাওয়া

আপনার কাজ সম্পর্কে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে কথা বলুন। আপনি যে কাজ করেন তার উপর ভিত্তি করে আপনার জনন্ আবার কাজ শুরু করা কখন নিরাপদ হতে পারে সেই বিষয়ে তারা আপনাকে জানাবে। যদি আপনাকে প্রচুর নড়াচড়া করতে হয় বা ভারী জিনিস উত্তোলন করতে হয়, তাহলে আপনাকে হয়তো আরো কিছু সময় কাজ করা থেকে বিরত থাকতে হতে পারে। যদি আপনাকে ডেস্ক বসে থাকতে হয়, তাহলে আপনি হয়তো আরো দ্রুত কাজে ফিরে যেতে পারবেন।

লিম্ফডেমা সম্পর্কে

কখনও কখনও লিম্ফ নোড অপসারণ করলে আপনার লিম্ফ্যাটিক সিস্টেমের সঠিকভাবে তরল নিষ্কাশন করা কঠিন হয়ে যেতে পারে। এটি হলে, যেখান থেকে লিম্ফ নোডগুলো অপসারণ করা হয়েছে সেই স্থানে লিম্ফ্যাটিক তরল জমে যেতে পারে। এই অতিরিক্ত তরল জমার কারণে যে ফোলাভাব হয় তাকে লিম্ফডেমা বলা হয়।

লিম্ফডেমা আপনার আক্রান্ত পাশে (যে পাশে লিম্ফ নোড অপসারণ করা হয়েছে) হাত, কনুই, স্তন বা দেহের অংশে হতে পারে।

বেশিরভাগ মানুষের লিম্ফডেমা হয় না, তবে কিছু মানুষের হতে পারে।

লিম্ফডেমা হওয়ার ঝুঁকি একজন ব্যক্তির ক্ষেত্রে কতটা, তা নির্ধারণ করা কঠিন, কারণ:


- লিম্ফডেমা নির্ণয়ের জনন্ কোনো মানসম্মত পরীক্ষা নেই।
- লিম্ফ নোড অপসারণ বা কৃতিগরস্ত হওয়া মানুষের ওপর ভিন্নভাবে প্রভাব ফেলে।

- লিম্ফেডেমা অস্ত্রোপচারের অল্প সময় পরও হতে পারে, আবার অনেক বছর পরেও হতে পারে।
- বর্তমান লিম্ফেডেমার কিছু ক্ষেত্রে পুরনো চিকিৎসা পদ্ধতির কারণে এটি হতে পারে।

•

লিম্ফেডেমা হওয়ার আপনার ঝুঁকি নিভর করে আপনার লিম্ফ নোডগুলো কীভাবে অপসারণ করা হয়েছে তার ওপর (চিত্র ৩ দেখুন)।

সেনিটনেল লিম্ফ নোড বায়োপসির সময়, আপনার বগল থেকে ১টি থেকে কয়েকটি লিম্ফ নোড অপসারণ করা হয় এবং ক্যান্সার কোষ আছে কিনা তা পরীক্ষা করা হয়। সেনিটনেল লিম্ফ নোড বায়োপসির পরে লিম্ফেডেমা হওয়ার ঝুঁকি কম। সেনিটনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি করা পর্যায়ে ১০০ জনের মধ্যে ০ থেকে ৭ জনের লিম্ফেডেমা হতে পারে।



অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড ডিসেকশনের সময়, আপনার বগল থেকে কয়েকটির বেশি লিম্ফ নোড অপসারণ করা হয়। এটি করা হয় এমন অতিরিক্ত লিম্ফ নোড অপসারণের জন্য, যেগুলোতে ক্যান্সার কোষ থাকতে পারে। অ্যাক্সিলারি

লিম্ফ নোড ডিসেকশনের পর লিম্ফেডেমা হওয়ার ঝুঁকি সেনিটনেল নোড বায়োপসির তুলনায় বেশি। অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড ডিসেকশন করা পর্যায়ে ১০০ জনের মধ্যে ১৫ থেকে ২৫ জনের লিম্ফেডেমা হতে পারে।

চিত্র ৩. লিম্ফেডেমা হওয়ার আনুমানিক ঝুঁকি

কার লিম্ফেডেমা হবে তা নিশ্চিতভাবে জানার কোনো উপায় নেই।

লিম্ফডেমা হওয়ার ঝুঁকি কমানো

নিম্নলিখিত কাজগুলো করা লিম্ফডেমা হওয়ার ঝুঁকি কমাতে সহায়তা করতে পারে:

- সর্বস্বস্থ্যকর শরীরের ওজন বজায় রাখুন অথবা নিরাপদভাবে তা অজরনের চেষ্টা করুন।
- নিয়মিত ব্যায়াম করুন এবং আপনার পেশিগুলো পরসারিত (স্ট্রেচ) করুন। আপনার জনস্বকোন ব্যায়ামগুলো উপযুক্ত, তা নিয়ে আপনার সাজরন বা নাসেরর সঙ্গ কথা বলুন।
 - আপনি যখন আবার ব্যায়াম ও শারীরিক কাযরকলাপ শুরু করবেন, তখন ধীরে ধীরে ও পযর্যকরমে তা বাড়ান। আপনি যদি অসব্সিত অনুভব করেন, তাহলে থেমে যান এবং বিরতি নিন। ব্যায়াম ব্যথা সৃষ্টি করা উচিত নয়।
- আপনার হাত ও বাহুতে সংকরমণের ঝুঁকি যতটা সম্ভব কমানোর চেষ্টা করুন। কাটা, আঁচড় এবং পোড়ার যত্ন কীভাবে সবচেয়ে ভালোভাবে নেওয়া যায়, তা আপনার সর্বস্বস্থ্যসেবা পরদানকারীর কাছে জিজ্ঞাসা করুন।

আপনার যদি সেনিটনেল লিম্ফ নোড বায়োপসি করা হয়ে থাকে:

- রক্ত নেওয়া, ইনজেকশন (শট), আইভি লাইন এবং রক্তচাপ মাপার জনস্ব আপনার আকরন্ত বাহু ব্যবহার করা ঠিক আছে। আপনার সর্বস্বস্থ্যসেবা পরদানকারীদের অনুরোধ করুন, যদি সম্ভব হয় তবে তারা যেন আপনার অপরভাবিত বাহু ব্যবহার করার চেষ্টা করেন।
- আপনি যদি লিম্ফডেমার কোনো লক্ষণ লক্ষস্ব করতে শুরু করেন, তবে সবসময় আপনার অপরভাবিত বাহু ব্যবহার করুন। এটি যদি সম্ভব না হয়, তাহলে কোন বাহু ব্যবহার করা সবচেয়ে নিরাপদ হবে তা নিয়ে আপনার সর্বস্বস্থ্যসেবা পরদানকারীর সাথে কথা বলুন।

আপনার যদি অ্যাক্সিলারি লিম্ফ নোড ডিসেকশন করা হয়ে থাকে:

- পড়ুন। *Hand and Arm Guidelines After Your Axillary Lymph Node Dissection* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/hand-and-arm-care-after-removal-axillary-lymph-nodes) আপনার পরিকর্যার পর লিম্ফডিমার ঝুঁকি কমানোর বিষয়ে জানতে।

লিম্ফডিমার লক্ষণ

অস্েত্রাপচারের পর সামান্য ফোলা সবা্ভাবিক। ফোলাভাব সবেৰ্চ্চ ৬ সপ্তাহ পযর্ন্ত থাকতে পারে। এটি সাধারণত সাময়িক এবং ধীরে ধীরে সেরে যাবে। অস্েত্রাপচারের পর আপনি বয্খা বা অনয্ানয্ অনুভূতিও পেতে পারেন, যেমন হঠাৎ খোঁচা লাগার মতো অনুভূতি এবং ঝিনঝিন করা। এই অনুভূতিগুলো সাধারণ এবং এগুলো অবশ্যই লিম্ফডিমার লক্ষণ নয়।

আপনি যদি লিম্ফডিমা হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন, তাহলে আপনার আকর্ন্ত হাত, বাহু স্তন এবং শরীরের ধড়ে এই লক্ষণগুলোর দিকে নজর রাখুন:

- ভারী লাগা, বয্খা বা যন্তর্গা অনুভব করা
- তব্কে টানটান ভাব অনুভব করা
- কম নমনীয়তা
- তব্কের পরিবতর্ন, যেমন টানটান ভাব বা পিটিং (চাপ দিলে যে তব্কে দাগ পড়ে যায় এবং পরে সেই দাগ থেকে যায়)

আপনার যদি লিম্ফডিমার কোনো লক্ষণ থাকে বা আপনি নিশ্চিত না হন, তাহলে আপনার সবাস্থ্যসেবা পরদানকারীর সাথে যোগাযোগ করুন।

লিম্ফডিমা সম্পকের্ আরও তথেষ্ জনয্, আপনি নিউ ইয়র্ক স্েট্ ডিপার্টমেন্ট অফ হেলথের রিসোসর্টিও পড়তে পারেন। [লিম্ফডিমা বোঝা](#)।

আপনার অনুভূতি নিয়ন্ত্রণ করুন

গুরুতর অসুস্থতার কারণে অস্বেতরূপচারের পরে আপনার নতুন এবং বিরক্তিকর অনুভূতি হতে পারে। অনেকে জানিয়েছেন তারা কখনও না কখনও কান্না, দুঃখিত, চিন্তিত, নাভরাস, বিরক্ত বা রাগান্বিত বোধ করেছিল। আপনি হয়তো বুঝতে পারবেন যে এই ধরনের কিছু অনুভূতি আপনি নিয়ন্ত্রণ করতে পারছেন না। এমনটি ঘটলে মানসিক সহায়তা খোঁজা একটি ভালো ধারণা। আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী আপনাকে MSK-এর কাউন্সেলিং সেন্টারে পাঠাতে পারেন। আপনি 646-888-0200 নম্বরে কল করে তাদের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

আপনি কেমন অনুভব করছেন সে সম্পর্কে কথা বলাই হলো মোকাবেলা করার প্রথম ধাপ। বন্ধুবান্ধব ও পরিবারের সদস্যরা সাহায্য করতে পারেন। আমরা আপনাকে আশ্বস্ত করতে, সহায়তা করতে এবং নির্দেশনা প্রদান করতে পারি। আপনি, আপনার পরিবার এবং আপনার বন্ধুরা মানসিকভাবে কেমন অনুভব করছেন তা আমাদেরকে অবহিত করা সবসময়ই গুরুত্বপূর্ণ। আপনার এবং আপনার পরিবারের জন্য অনেক রিসোর্স রয়েছে। আমরা আপনাকে এবং আপনার পরিবার ও বন্ধুদের আপনার অসুস্থতার মানসিক দিকগুলি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সহায়তা করতে এখানে এসেছি। আপনি হাসপাতালে বা বাড়িতে যেখানেই থাকুন না কেন আমরা আপনাকে সাহায্য করতে পারব।

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে যখন ফোন করবেন

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে ফোন করুন, যদি:

- আপনার জ্বর 100.8°F (38°C) বা তার বেশি।
- আপনার কাটার জায়গা (অস্বেতরূপচারের ক্ষত) থেকে তরল বের হচ্ছে।
- আপনার শ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে।
- আপনার কাটার জায়গার আশেপাশের ত্বক্ স্বেচ্ছিকভাবে চোখে বেশি উষ্ণ।
- আপনার কাটার জায়গার আশেপাশে অস্বস্তি বেড়ে গেছে।

- আপনার কাটার জায়গার আশেপাশের তব্ক সব্ভাবিকের চেয়ে বেশি লাল হয়ে গেছে।
- আপনার কাটার জায়গার আশেপাশের অংশে ফোলাভাব শুরু হচ্ছে।
- আপনার কাটার জায়গার আশেপাশের ফোলাভাব আরও বেড়ে যাচ্ছে।
- আপনার কোনো পরশ্ন বা উদেব্গ থাকে।

যোগাযোগের তথ্য

আপনার কোনো পরশ্ন বা উদেব্গ থাকলে আপনার সব্স্থয্সেবা পর্দানকারীর সাথে যোগাযোগ করুন। আপনার সেবাপর্দানকারী দলের একজন সদস্য সোমবার থেকে শুরুর সন্ধ্যা ৭ টা থেকে বিকাল ৫ টা পর্যন্ত উত্তর দেবেন। এই সময়ের বাইরে, আপনি একটি বাতর্ পাঠাতে পারেন বা অনয্ MSK পর্দানকারীর সাথে কথা বলতে পারেন। কলে সবর্দা একজন ডাক্তার বা নাসর্কে পাবেন।

আপনার সব্স্থয্সেবা পর্দানকারীর সাথে কীভাবে যোগাযোগ করবেন তা আপনি নিশ্চিত না হলে, 212-639-2000 নমব্রে কল করুন।

সহায়তামূলক পরিষেবা

এই বিভাগে সহায়তামূলক পরিষেবাসমূহের একটি তালিকা রয়েছে। আপনি যখন আপনার অস্তর্পচারের জনয্ পরস্তুত হন এবং আপনার অস্তর্পচারের পরে দরুত সুস্থ করেন তখন তারা আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

আপনি এই বিভাগটি পড়ার সাথে সাথে আপনার সব্স্থয্সেবা পর্দানকারীকে জিজ্ঞাসা করার জনয্ পরশ্নাবলী লিখুন।

MSK সহায়তামূলক পরিষেবা

ভতির্ সংকরন্ত অফিস

212-639-7606

আপনার হাসপাতালে ভর্তি সম্পর্কে আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে, যেমন একটি ব্যক্তিগত কক্ষ চাইলে কল করুন।

অয়ানেসেথসিয়া

212-639-6840

অয়ানেসেথসিয়া সম্পর্কিত আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে কল করুন।

ব্লাড ডোনার রুম

212-639-7643

আপনি যদি **রক্ত বা প্লেটলেট দান** করতে আগ্রহী হন তাহলে তথ্যের জন্য কল করুন।

Bobst International Center

www.msk.org/international

888-675-7722

আমরা বিশ্বের সকল দেশের রোগীদের স্বাগত জানাই এবং বিভিন্ন রকমের সেবাদান করে থাকি। আপনি যদি একজন আন্তর্জাতিক রোগী হন তাহলে আপনার পরিচর্যার ব্যবস্থা করতে সহায়তার জন্য কল করুন।

কাউন্সেলিং সেন্টার

www.msk.org/counseling

646-888-0200

অনেকে কাউন্সেলিং সাভিসটিকে সহায়ক বলে মনে করেন। আমাদের কাউন্সেলিং সেন্টার ব্যক্তিগত, দম্পতি, পরিবার এবং গোষ্ঠীর জন্য কাউন্সেলিং পরিষেবা প্রদান করে। আপনি যদি উদ্ভিগ্ন বা বিষণ্ণতা বোধ করেন তাহলে আমরা সাহায্য করার জন্য ওষুধও লিখে দিতে পারি।

অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে, আপনার কেয়ার টিমের একজন সদস্যকে রেফারেলের জন্য বলুন বা উপরের নম্বরে কল করুন।

ফুড প্যানিটর পেরাগরাম

646-888-8055

ক্যান্সারের চিকিৎসার সময় আমরা অভাবী ব্যক্তিদের খাবার দিই। আরো জানতে আপনার কেয়ার টিমের একজন সদস্যদের সাথে কথা বলুন বা উপরের নম্বরে কল করুন।

ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন ও ওয়েলনেস সাভির্স

www.msk.org/integrativemedicine

আমাদের ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন ও ওয়েলনেস সাভির্স ঐতিহ্যগত চিকিৎসাগত পরিচর্যার পরিপূরক (এর মতো) অনেক পরিষেবা অফার করে। উদাহরণস্বরূপ, মিউজিক থেরাপি, মাইন্ড/বডি থেরাপি, ড্যান্স অ্যান্ড মুভমেন্ট থেরাপি, যোগব্যায়াম এবং টাচ থেরাপি। এই পরিষেবাগুলোর জন্য একটি অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে, 646-449-1010 নম্বরে কল করুন।

এছাড়াও আপনি ইন্টিগ্রেটিভ মেডিসিন ও ওয়েলনেস সাভির্সে একজন স্বাস্থ্য সেবাদানকারীর সাথে পরামর্শের সময়সূচীও নিধারণ করতে পারেন। তারা একটি স্বাস্থ্যকর জীবনধারা গঠন এবং পাশবর্পর্তিকির্য়া নিয়ন্তরণ করার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরিতে আপনার সাথে কাজ করবেন। পরামর্শের জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিধারণ করতে 646-608-8550 নম্বরে কল করুন।

MSK লাইব্রেরি

library.mskcc.org

আপনি আমাদের লাইব্রেরির ওয়েবসাইটে ঘুরে আসতে পারেন বা লাইব্রেরির রেফারেন্স কর্মীদের সাথে কথা বলতে ইমেইল করতে পারেন asklibrarian@mskcc.org ঠিকানায়। তারা আপনাকে এক ধরনের ক্যান্সার সম্পর্কে আরো তথ্য খুঁজে পেতে সহায়তা করতে পারেন। আপনি লাইব্রেরির [রোগী শিক্ষা রিসোসর্ গাইড](#)ও দেখতে পারেন।

পুষ্ট বিষয়ক পরিষেবা

www.msk.org/nutrition

212-639-7312

আমাদের পুষ্টি বিষয়ক পরিষেবা আমাদের ক্লিনিকাল ডায়েটিশিয়ান পুষ্টিবিদদের মধ্যে একজনের সাথে পুষ্টি বিষয়ক পরামর্শ প্রদান করে। আপনার ক্লিনিকাল ডায়েটিশিয়ান পুষ্টিবিদ আপনার খাদ্যাভাস সম্পর্কে আপনার সাথে কথা বলবেন। চিকিৎসার সময় ও পরে কী খাওয়া উচিত সে বিষয়েও তিনি পরামর্শ দিতে পারেন। অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে, আপনার কেয়ার টিমের একজন সদস্যকে রেফারেলের জন্য ব্লুন বা উপরের নম্বরে কল করুন।

রোগী ও কমিউনিটির শিক্ষা

www.msk.org/pe

শিক্ষামূলক তথ্যসূত্র, ভিডিও এবং অনলাইন পেরাগ্রাম অনুসন্ধান করতে আমাদের রোগী ও কমিউনিটির শিক্ষা সম্পর্কিত ওয়েবসাইটটি দেখুন।

রোগীর বিল

646-227-3378

আপনার বিমা কোম্পানির সাথে প্রাক-অনুমোদন সম্পর্কে আপনার প্রশ্ন থাকলে কল করুন। একে প্রাক-অনুমোদনও বলা হয়।

রোগীর প্রতিনিধি অফিস

212-639-7202

হেলথ কেয়ার প্রক্সি ফর্ম বা আপনার পরিচয় সম্পর্কে উদ্বেগ বিষয়ক আপনার যদি কোনো প্রশ্ন থাকে তাহলে কল করুন।

পেরিঅপারেটিভ নাসর্ লিয়াজেঁ

212-639-5935

আপনার অস্ত্রোপচারের সময় MSK কোনো তথ্য প্রকাশ করার বিষয়ে আপনার প্রশ্ন থাকলে কল করুন।

ব্যক্তিগত কতর্ব্যত নাসর্ ও সহচর

646-357-9272

আপনি হাসপাতালে ও বাড়িতে আপনার পরিচর্যার জনয়্ বয়্কিতগত নাসর্ বা সহচরদের অনুরোধ করতে পারেন। আরো জানতে কল করুন।

পুনবর্াসন পরিষেবা

www.msk.org/rehabilitation

কযান্সার ও কযান্সারের চিকিৎসা আপনার শরীরকে দুবর্ল, শক্ত বা টান অনুভব করাতে পারে। কিছু লিমেফডেমা (ফোলাভাব) হতে পারে। আমাদের ফিজিওথেরাপিস্ট (পুনবর্াসন মেডিসিন ডাক্তার), পেশাগত থেরাপিস্ট (OT) এবং ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট (PT) আপনাকে আপনার সব্ভাবিক কাজকমের্ ফিরে যেতে সহায়তা করতে পারেন।

- পুনবর্াসন মেডিসিন ডাক্তাররা এমন সমসয্ নিগর্য় করে এবং চিকিৎসা করে যা আপনার চলাফেরা ও কাযর্কলাপকে পর্ভাবিত করে। তারা MSK-কে বা বাড়ির কাছাকাছি কোথাও আপনার পুনবর্াসন থেরাপি পের্গর্ামটি ডিজাইন এবং সমনব্য় করতে সহায়তা করতে পারেন। আরো জানতে, 646-888-1929 নমব্রে পুনবর্াসন মেডিসিন (ফিজিয়য্টির্)-এ কল করুন।
- আপনার সব্ভাবিক দৈনন্দিন কাজকমর্ করতে সমসয্ হলে একজন OT সাহাযয্ করতে পারেন। উদাহরণসব্ৰূপ, তিনি দৈনন্দিন কাজ সহজ করতে সহায়তা করার জনয্ সরঞ্জামের পরামশর্ দিতে পারেন। একজন PT আপনাকে শকিত ও নমনীয়তা তৈরি করতে বয্য়াম শেখাতে পারেন। আরো জানতে, 646-888-1900 নমব্রে পুনবর্াসন থেরাপি-তে কল করুন।

কযান্সারের পরে জীবনের জনয্ রিসোসর্ (RLAC) পের্গর্াম

646-888-8106

MSK-এ, আপনার চিকিৎসার পর পরিচর্য শেয হয় না। যেসব রোগীরা এবং তাদের পরিবার চিকিৎসা শেয করেছেন [RLAC পের্গর্াম](#) তাদের জনয্।

এই পের্গর্ামের অনেক পরিষেবা রয়েছে। আমরা সেমিনার, কমর্শালা, সহায়তা

গরুপ এবং চিকিৎসার পরে জীবন সম্পর্কে পরামর্শ প্রদান করি। আমরা বিমা ও কমরসংস্থানের বিষয়েও সহায়তা করতে পারি।

যৌন স্বাস্থ্য পের্গরাম

ক্যান্সার ও ক্যান্সারের চিকিৎসা আপনার যৌন স্বাস্থ্য, প্রজনন ক্ষমতা বা উভয়কেই প্রভাবিত করতে পারে। MSK-কে এর যৌন স্বাস্থ্য পের্গরাম আপনার চিকিৎসার আগে, চিকিৎসা চলাকালীন বা পরে আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

- আমাদের [ফিমেল সেক্সুয়াল মেডিসিন অ্যান্ড উইমেনস হেলথ পের্গরাম](#) যৌন স্বাস্থ্য সমস্যা যেমন অকাল মেনোপজ বা প্রজনন ক্ষমতার সমস্যায় সাহায্য করতে পারে। আপনার MSK কেয়ার টিমের একজন সদস্যকে রেফারেলের জন্য বলুন বা আরো জানতে 646-888-5076 নম্বরে কল করুন।
- আমাদের [মেল সেক্সুয়াল অ্যান্ড রিপেরডাক্টিভ মেডিসিন পের্গরাম](#) যৌন স্বাস্থ্য সমস্যা, যেমন ইরেক্টাইল ডিসফাংশন (ED) এ সহায়তা করতে পারে। আপনার কেয়ার টিমের একজন সদস্যকে রেফারেলের জন্য বলুন বা আরো জানতে 646-888-6024 নম্বরে কল করুন।

সমাজ কর্মরী

www.msk.org/socialwork

212-639-7020

সমাজকর্মরীরা রোগী, পরিবার ও বন্ধুদের ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য সাধারণ সমস্যা মোকাবেলায় সহায়তা করেন। তারা আপনার চিকিৎসা জুড়ে প্রথমে পরামর্শ ও সহায়তা গোষ্ঠী প্রদান করেন। তারা আপনাকে শিশু ও পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের সাথে যোগাযোগ করতে সহায়তা করতে পারেন।

আমাদের সামাজিককর্মরীরা আপনাকে কমিউনিটি এজেন্সি ও পের্গরামগুলোতে রেফার করতে সহায়তা করতে পারেন। যদি আপনার বিল পরিশোধ করতে

সমস্যা হয়, তাদের কাছে আর্থিক রিসোর্স সম্পর্কেও তথ্য রয়েছে। আরো জানতে উপরের নম্বরে কল করুন।

আধ্যাত্মিক পরিচর্যা

212-639-5982

আমাদের চ্যাপলিনরা (আধ্যাত্মিক পরামর্শদাতারা) শুনতে, পরিবারের সদস্যদের সহায়তা করতে এবং পরামর্শ দেওয়ার জন্যে রয়েছে। তারা কমিউনিটির পাদরী বা বিশবাসী গোষ্ঠীর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন, বা কেবল একজন সান্ত্বনাদায়ক সহচর এবং আধ্যাত্মিক উপস্থিতি হতে পারেন। যেকোনো **আধ্যাত্মিক পরিচর্যা** চাইতে পারেন। আপনার কোনো ধর্মীয় সম্পৃক্ততা (কোনো ধর্মের সাথে সংযোগ) থাকতে হবে না।

MSK-এর আন্তঃধর্মীয় চ্যাপেল মেমোরিয়াল হাসপাতালের প্রধান লবির কাছে অবস্থিত। এটি দিনে 24 ঘণ্টা খোলা থাকে। আপনার যদি জরুরি অবস্থা থাকে তাহলে 212-639-2000 নম্বরে কল করুন। কলে চ্যাপলিনকে চান।

টোবাকো ট্রিটমেন্ট প্রোগ্রাম

www.msk.org/tobacco

212-610-0507

আপনি যদি ধূমপান ত্যাগ করতে চান, MSK এর বিশেষজ্ঞ আছেন যারা সাহায্য করতে পারেন। আরো জানতে কল করুন।

ভার্চুয়াল প্রোগ্রাম

www.msk.org/vp

আমরা রোগী ও পরিচর্যাকারীদের জন্য অনলাইনে শিক্ষা ও সহায়তা প্রদান করি। এগুলো লাইভ সেশন যেখানে আপনি কথা বলতে বা কেবল শুনতে পারেন। আপনি আপনার রোগ নির্ণয়, চিকিৎসার সময় কী আশা করবেন এবং কিভাবে আপনার ক্যান্সারের পরিচর্যার জন্য পরামর্শ নেবেন তা সম্পর্কে শিখতে পারেন।

সেশনগুলো বয়স্কিতগত, বিনামূলেয়্ এবং বিশেষজ্ঞ কতৃক পরিচালিত হয়।
ভাচুর্যাল পের্গরাম সম্পকের্ জানতে বা নিবন্ধন করতে আমাদের ওয়েবসাইট দেখুন।

স্তন কয়ান্সার সহায়তা সেবা

ভাগ করা

www.sharecancersupport.org

৮৪৪-ASK-SHARE (২৭৫-৭৪২৭)

ময়ানহাটন, কুইন্স, বরুকলিন এবং স্ট্যাটেন আইলয়ান্ড স্তন কয়ান্সার, মেটাস্ট্যাটিক স্তন কয়ান্সার এবং ওভারি (ডিমব্শয়) কয়ান্সার থেকে বেঁচে থাকা বয়স্কিতদের জনয়্ সহায়তা গ্রুপ পর্দান করে।

সুসান জি. কোমেন

www.komen.org

স্তন কয়ান্সারে আকরান্ত বয়স্কিতদের জনয়্ তথয়্ ও সহায়তা সেবা পর্দান করে।

টির্পল নেগেটিভ বেরস্ট কয়ান্সার ফাউন্ডেশন

www.tnbcfoundation.org

টির্পল নেগেটিভ স্তন কয়ান্সার সম্পকের্ মানুষকে বোঝাতে সাহাযয়্ করার জনয়্ তথয়্ পর্দান করে।

বাহিয়্ক সহায়তামূলক পরিষেবা

অয়াকেসস-এ-রাইড

web.mta.info/nyct/paratran/guide.htm

৪৭৭-৩৩৭-২০১৭

নিউ ইয়কর্ সিটিতে, পর্তিবন্ধী বয়স্কিত যারা পাবলিক বাস বা সাবওয়েতে যেতে পারেন না তাদের জনয়্ MTA শেয়ার করা রাইড, ডোর-টু-ডোর পরিষেবা পর্দান করে।

এয়ার চ্যারিটি নেটওয়ার্ক

www.aircharitynetwork.org

877-621-7177

চিকিৎসা কেন্দ্র যাতায়াতের ব্যবস্থা করে।

আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি (ACS)

www.cancer.org

800-ACS-2345 (800-227-2345)

ক্যান্সারের চিকিৎসার সময় রোগী ও শুরুরূপার্দানকারীদের থাকার জন্য বিনামূল্যের জায়গা হোপ লজ সহ বিভিন্ন তথ্য ও পরিষেবা প্রদান করে।

ক্যান্সার ও ক্যারিয়ার

www.cancerandcareers.org

646-929-8032

ক্যান্সারে আক্রান্ত কর্মীদের জন্য শিক্ষা, সরঞ্জাম এবং ইভেন্টের জন্য একটি রিসোর্স।

ক্যান্সার কেয়ার

www.cancercare.org

800-813-4673

275 সেভেনথ অ্যাভিনিউ (ওয়েস্ট 25তম ও 26তম স্ট্রিটের মধ্যে)

নিউ ইয়র্ক, NY 10001

কাউন্সেলিং, সাপোর্ট গ্রুপ, শিক্ষামূলক কর্মশালা, প্রকাশনা এবং আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

ক্যান্সার সাপোর্ট কমিউনিটি

www.cancersupportcommunity.org

ক্যান্সারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের সহায়তা ও শিক্ষা প্রদান করে।

কেয়ারগিভার অ্যাকশন নেটওয়ার্ক

www.caregiveraction.org

800-896-3650

দীঘরস্থায়ী অসুস্থতা বা অক্ষমতায়ুক্ত পিরয়জনদের পরিচযরা করা লোকদের জনয শিক্ষা ও সহায়তা পরদান করে।

কপেরারেট অ্যাঞ্জেল নেটওয়ার্ক

www.corpangelnetwork.org

866-328-1313

কপেরারেট জেটগুলোতে খালি আসন বযবহার করে সারা দেশে চিকিৎসার জনয বিনামূলেয ভরমণের সুযোগ পরদান করে।

গুড ডেস

www.mygooddays.org

877-968-7233

চিকিৎসার সময় কোপেমেন্ট পরদানের জনয আথির্ক সহায়তা পরদান করে। রোগীদের অবশযই চিকিৎসা বিমা থাকতে হবে, আয়ের মানদণ্ড পূরণ করতে হবে এবং গুড ডেজ ফমুর্লারির অংশ হিসাবে ওষুধ নিধর্রণ করতে হবে।

হেলথওয়েল ফাউন্ডেশন

www.healthwellfoundation.org

800-675-8416

নিদিরষ্ট ওষুধ ও থেরাপির জনয কোপেমেন্ট, সবস্থযসেবা পিরমিয়াম এবং কতরনযোগয আওতাধীন করার জনয আথির্ক সহায়তা পরদান করে।

জো'স হাউস

www.joeshouse.org

877-563-7468

কযান্সারে আকরান্ত বয্কিত ও তাদের পরিবারের জনয চিকিৎসা কেন্দর্র

কাছাকাছি থাকার জায়গার একটি তালিকা পরদান করে।

LGBT ক্যান্সার পরজেক্ট

www.lgbtcancer.com

অনলাইন সহায়তা গোষ্ঠী এবং LGBT-বান্ধব ক্লিনিকাল ট্রায়ালের একটি ডাটাবেস সহ LGBT কমিউনিটির জনস্বাস্থ্য সহায়তা এবং সমর্থন পরদান করে।

লাইভস্ট্রং ফাটির্লিটি

www.livestrong.org/fertility

855-744-7777

ক্যান্সারে আক্রান্ত রোগী এবং বেঁচে থাকা ব্যক্তিদের প্রজনন তথ্য এবং সহায়তা পরদান করে যাদের মেডিকেল চিকিৎসা বন্ধযাতাব্র সাথে সম্পর্কিত ঝুঁকি রয়েছে।

লুক গুড ফিল বেটার পের্গরাম

www.lookgoodfeelbetter.org

800-395-LOOK (800-395-5665)

এই পের্গরামটি আপনার চেহারা সম্পর্কে আরো ভালো বোধ করতে সহায়তা করার জন্য আপনি যা করতে পারেন তা শিখতে কর্মশালা পরদান করে। আরো তথ্যের জন্য বা কোনো কর্মশালার জন্য সাইন আপ করতে, উপরের নম্বরে কল করুন বা পের্গরামের ওয়েবসাইটে যান।

ন্যাশনাল ক্যান্সার ইনস্টিটিউট

www.cancer.gov

800-4-CANCER (800-422-6237)

ন্যাশনাল কাউন্সিল অন এজিং (NCOA)

www.benefitscheckup.org

বয়স্কদের জন্য তথ্য ও সহায়ক সম্পদ পরদান করে। BenefitsCheckUp® নামের একটি বিনামূল্যের অনলাইন টুল পরদান করে, যা আপনাকে

পের্সকির্পশন সহায়তা কমরসূচির সঙেগ যুক্ত করে, যার মধ্যে মেডিকেয়ারের Extra Help পের্গরামও অন্তভুক্ত।

ন্যাশনাল LGBT ক্যান্সার নেটওয়ার্ক

www.cancer-network.org

LGBT ক্যান্সার থেকে বেঁচে যাওয়া ও যারা ঝুঁকিতে রয়েছে তাদের জন্য শিক্ষা, প্রশিক্ষণ ও সহায়তা প্রদান করে।

নিডি মেডস

www.needymeds.org

ব্র্যান্ড ও জেনেরিক নামের ওষুধের জন্য রোগীর সহায়তা পের্গরামের তালিকাভুক্ত করে।

NYRx

www.health.ny.gov/health_care/medicaid/program/pharmacy.htm

নিউ ইয়র্ক স্টেট সরকারি খাতের নিয়োগকর্তাদের যোগ্য কর্মচারী ও অবসরপ্রাপ্তদের পের্সকির্পশন সুবিধা প্রদান করে।

পেশেন্ট অ্যাক্সেস নেটওয়ার্ক (PAN) ফাউন্ডেশন

www.panfoundation.org

866-316-7263

বিমা রয়েছে এমন রোগীদের জন্য কোপেমেন্ট সহায়তা দেয়।

পেশেন্ট অ্যাডভোকেট ফাউন্ডেশন

www.patientadvocate.org

800-532-5274

প্রিচযরা, আর্থিক সহায়তা, বিমা সহায়তা, চাকরি ধরে রাখার সহায়তা এবং জাতীয় অপঘরপ্ত বিমা কভার থাকা রিসোসর্ ডিরেক্টরিতে অ্যাক্সেস প্রদান করে।

রেড ডোর কমিউনিটি (সাধারণত গিল্ডা'স ক্লাব নামে পরিচিত)

www.reddoorcommunity.org

212-647-9700

এমন একটি জায়গা যেখানে ক্যান্সারে আক্রান্ত বয়স্কিতরা নেটওয়ার্কিং, কমরশালা, বক্তৃতা এবং সামাজিক কাযরকলাপের মাধ্যমে সামাজিক ও মানসিক সহায়তা পান।

RxHope

www.rxhope.com

877-267-0517

যে সকল মানুষ ওষুধ কিনতে আর্থিক সঙ্কটে পড়ে তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করে।

ট্রিয়াজ ক্যান্সার

www.triagecancer.org

ক্যান্সার রোগীদের এবং তাদের পরিচর্যাকারীদের জন্য আইনি, চিকিৎসা এবং আর্থিক তথ্য এবং রিসোসর্ প্রদান করে।

শিক্ষামূলক তথ্যসূত্র

এই নির্দেশিকায় উল্লেখিত শিক্ষামূলক তথ্যসূত্রের তালিকা এই বিভাগটি করে। এগুলো আপনার অস্বাস্থ্যের জন্য পরামর্শ হওয়া এবং আপনার অস্বাস্থ্যের পরে দ্রুত সুস্থ হওয়ার জন্য আপনাকে সহায়তা করবে।

আপনি এই তথ্যসূত্র পড়ার সাথে সাথে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে জিজ্ঞাসা করার জন্য প্রশ্নাবলী লিখুন।

- *A Guide for Caregivers* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/guide-caregivers)
- *Advance Care Planning for People With Cancer and Their*

Loved Ones (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/advance-care-planning)

- *Call! Don't Fall!* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/call-dont-fall)
- *Caring for Your Jackson-Pratt Drain* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/caring-your-jackson-pratt-drain)
- *Clear Liquid Diet* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/clear-liquid-diet)
- *Common Questions About MSK's Recovery Tracker* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/mymsk-recovery-tracker)
- *Eating and Drinking Before Your Surgery or Procedure When Taking GLP-1 Medicines* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/eating-and-drinking-before-your-surgery-or-procedure-when-taking-glp-1-medicines)
- *Exercises After Your Mastectomy or Breast Reconstruction* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/exercises-after-mastectomy-or-reconstruction)
- *Fertility Preservation Before Cancer Treatment: Options for People Born with Ovaries and a Uterus* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/fertility-preservation-females-starting-treatment)
- *Frequently Asked Questions About Walking After Your Surgery* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/frequently-asked-questions-about-walking-after-your-surgery)

- *Hand and Arm Guidelines After Your Axillary Lymph Node Dissection* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/hand-and-arm-care-after-removal-axillary-lymph-nodes)
- *Herbal Remedies and Cancer Treatment* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/herbal-remedies-and-treatment)
- *How to Be a Health Care Agent* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-be-health-care-agent)
- *How To Check if a Medicine or Supplement Has Aspirin, Other NSAIDs, Vitamin E, or Fish Oil* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids)
- *How To Use Your Incentive Spirometer* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-use-your-incentive-spirometer)
- *Resources, Clothing, and Support After Breast Surgery* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/resources-clothing-support-breast-surgery)
- [লিমেফডিমা বোঝা](#)
- *What You Can Do to Avoid Falling* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/what-you-can-do-avoid-falling)

আপনার কোনো প্রশ্ন বা উদ্বেগ থাকলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা
প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ করুন। আপনার পরিচর্যা দলের একজন
সদস্য সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত উত্তর দেবেন সকাল 9:00 টা
থেকে বিকেল 5:00 টার পর এই সময়ের বাইরে, আপনি একটি বাতর রাখেন
যেতে পারেন বা অন্য একজন MSK প্রদানকারীর সাথে কথা বলতে
পারেন। কলে সর্বদা একজন ডাক্তার বা নার্সকে পাবেন। আপনি যদি
আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করবেন তা
নিশ্চিত না হন, তাহলে ফোন করুন। ২১২-৬৩৯-২০০০.

আরো রিসোর্সের জন্য www.mskcc.org/pe-এ ভিজিট করে আমাদের
ভাচুয়াল লাইব্রেরি দেখুন।

About Your Mastectomy - Last updated on May 2, 2026

Memorial Sloan Kettering Cancer Center কতর্ক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত