



রোগী এবং শুরুরকারীর শিক্ষা

আপনার আপার-এন্ডোস্কোপি সম্পর্কে

এই তথ্য আপনাকে আপনার আপার এন্ডোস্কোপির জন্য পরস্তুত হতে সহায়তা করবে। আপার এন্ডোস্কোপি হলো আপনার খাদ্যনালী (খাদ্য পাইপ), পাকস্থলী এবং আপনার কন্ডুরান্টের পরথম অংশটি দেখার জন্য একটি পরীক্ষা।

আপনার আপার এন্ডোস্কোপির সময়, আপনার স্বাস্থ্যসেবা পরদানকারী এন্ডোস্কোপ নামে একটি নমনীয় নল ব্যবহার করবেন। এটি তাদের একটি ভিডিও স্ক্রিনে আপনার খাদ্যনালী, পাকস্থলী এবং কন্ডুরান্টের ভিতরের অংশ দেখতে দেয়। এছাড়াও তারা একটি ছোট টিসুয়র নমুনা নিতে পারে বা একটি পলিপ (টিসুয়র বৃদ্ধি) অপসারণ করতে পারে। এই পরিক্রিয়াটিকে বায়োপসি বলা হয়।

আপনার পরিক্রিয়াটি শুরুর 1 সপ্তাহ আগে

আপনার ওষুধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন

পরিক্রিয়াটির আগে আপনাকে আপনার নিয়মিত কিছু ওষুধ খাওয়া বন্ধ করতে হতে পারে। অথবা, আপনাকে স্বাভাবিকের তুলনায় ভিন্ন মাত্রা (পরিমাণ) নিতে হতে পারে। আপনার পরিক্রিয়ার আগে কীভাবে ওষুধ গ্রহণ করবেন সে সম্পর্কে আপনার স্বাস্থ্যসেবা পরদানকারীর সঙ্গে কথা বলুন। স্বাস্থ্যসেবা পরদানকারীর সঙ্গে কথা না বলে আপনার ওষুধ গ্রহণের পদ্ধতি পরিবর্তন করবেন না।

এই অংশে কিছু ওষুধের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আরও অনেকগুলি রয়েছে। নিশ্চিত করুন যে আপনার পরিচর্যা দল আপনার সমস্ত পেরস্ক্রিপশন ওষুধ, ওভার-দয়-কাউন্টার ওষুধ এবং ডায়েটারি সাপ্লিমেন্ট সম্পর্কে জানে। পেরস্ক্রিপশনের ওষুধ হলো এমন ওষুধ যা আপনি শুধুমাত্র একজন স্বাস্থ্যসেবা পরদানকারীর পেরস্ক্রিপশনের মাধ্যমে পেতে পারেন। ওভার-দয়-কাউন্টারের ওষুধ হলো এমন ওষুধ যা আপনি পেরস্ক্রিপশন ছাড়াই কিনতে পারেন।



আপনার পরিক্রিয়ার আগে কয়েকদিনে আপনার ওষুধ এবং সাপ্লিমেন্ট সঠিকভাবে গ্রহণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি না করেন, তাহলে আমাদেরকে আপনার পরিক্রিয়া পুনঃনির্ধারণ করতে হতে পারে।

অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্টস (রক্ত পাতলা করে)

ব্লাড থিনার হলো রক্ত পাতলা করার ঔষধ যা আপনার রক্ত জমাট বাঁধার পরিক্রিয়ায় বাঁধা দেয়। হাটর্ অ্যাটাক, সেট্রাক বা রক্ত জমাট বাঁধা জনিত অন্যান্য সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে ব্লাড থিনার দেয়া হয়।

আপনি যদি ব্লাড থিনার সেবন করেন, তবে যারা এই পরিক্রিয়ার সময় নিধরারণ করেছেন এবং আপনাকে এটা নেয়ার পরামশর্ দিয়েছেন সেইসব সবাস্থ্যসেবা পরদানকারীকে অবহিত করুন। আপনার পদ্ধতির আগে তাদের কী করতে হবে তা জিজ্ঞাসা করুন। এই পরিক্রিয়া শুরুর কিছুদিন পূর্বে তারা হয়তো আপনাকে ঔষধ সেবন বন্ধ করার পরামশর্ দিতে পারেন। পরিক্রিয়ার ধরন এবং ব্লাড থিনার নেয়ার উদ্দেশ্যের উপর এটা নিভরর করে।

এখানে কিছু রক্ত পাতলা করার ওষুধের উদাহরণ দেওয়া হলো। আরও কিছু আছে, তাই নিশ্চিত করুন যে আপনার সেবাদানকারী দল আপনার গ্রহণ করা সমস্ত ওষুধ সম্পর্কে জানে। আপনার কেয়ার টিমের কোনো সদস্যের সাথে কথা না বলে রক্ত পাতলা করা গ্রহণ বন্ধ করবেন না।

<ul style="list-style-type: none">• এপিক্সাবান (Eliquis®)• অ্যাসপিরিন• সেলেকক্সিব (Celebrex®)• সিলোস্টাজল (Pletal®)• ক্লপিডগরেল (Plavix®)• দবিগাতরান (Pradaxa®)• ডাল্টপারিন (Fragmin®)• ডিপাইরিডামোল (Persantine®)• এডোক্সাবান (Savaysa®)• এনোক্সাপারিন (Lovenox®)• ফন্ডাপারিনাক্স (Arixtra®)• হেপারিন ইনজেকশন (শট)	<ul style="list-style-type: none">• মেলোক্সিকাম (Mobic®)• ননস্টেরয়েডাল অ্যান্টি-ইনফেলমেটরি ডর্গস (NSAID), যেমন আইবুপেরাফেন (Advil®, Motrin®) এবং ন্যাপেরাক্সেন (Aleve®)• পেন্টক্সিফাইলাইন (Trental®)• পরসুগেরল (Effient®)• রিভারোক্সাবান (Xarelto®)• সালফাসালাজিন (Azulfidine®, Sulfazine®)• টিকাগেরল (Brilinta®)• টিঞ্জাপারিন (Innohep®)• ওয়ারফারিন (Jantoven®, Coumadin®)
--	---

অন্যান্য ঔষধ এবং সাপ্লিমেন্টও আপনার রক্ত জমাট বাঁধার পরিক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটাতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ভিটামিন ই, মাছের তেল, নন-স্টেরইডাল আনিট-ইনফেলম্যাটরি ডর্গস (NSAIDs)। আইবুপেরাফেন (Advil®, Motrin®) এবং ন্যাপেরাক্সেন (Aleve®) হ'ল NSAIDs-এর উদাহরণ, তবে এমন আরও অনেকগুলি আছে।

How To Check if a Medicine or Supplement Has Aspirin, Other NSAIDs, Vitamin E, or Fish Oil (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids) পড়ুন। পরিক্রিয়া শুরুর পূর্বে কোন কোন ঔষধ এবং সাপ্লিমেন্ট সেবন এড়িয়ে চলতে হবে, সেগুলো জানতে

এটা আপনাকে সাহায্য করবে।

ডায়াবেটিসের ওষুধ

আপনি যদি ইনসুলিন বা অন্যান্য মধুমেহের ওষুধ গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার MSK স্বাস্থ্যসেবা পরদানকারী এবং যিনি এই ওষুধ লিখে দিয়েছেন সেই স্বাস্থ্যসেবা পরদানকারীর সাথে আলোচনা করুন। আপনার অস্বস্তি বা পরিক্রমার আগে কী করতে হবে তা তাদের জিজ্ঞাসা করুন। আপনার এটি গ্রহণ বন্ধ করতে হতে পারে অথবা সর্বাভাবিকের চেয়ে ভিন্ন ডোজ (পরিমাণ) নিতে হতে পারে। আপনার অস্বস্তি বা পরিক্রমার আগে আপনাকে ভিন্ন খাবার ও পানীয় সংক্রান্ত নির্দেশনাও অনুসরণ করতে হতে পারে। আপনার স্বাস্থ্যসেবা পরদানকারীর নির্দেশাবলি মেনে চলুন।

আপনার যত্ন দল আপনার অস্বস্তি বা পরিক্রমার সময় রক্তের চিনি (গ্লুকোজ) পর্যবেক্ষণ করবে।

ওজন কমানোর জন্য GLP-1 ওষুধ।

আপনি যদি GLP-1 ওষুধ গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা পরদানকারীকে জানানো গুরুত্বপূর্ণ। আপনার অস্বস্তি বা পরিক্রমার আগে বিশেষ খাবার ও পানীয় সংক্রান্ত নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। এই নির্দেশাবলী অনুসরণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি এগুলো মেনে চলেন না, তাহলে আপনার অস্বস্তি বা পরিক্রমা বিলম্বিত বা বাতিল হতে পারে।

- আপনার অস্বস্তি বা পরিক্রমার আগের দিন পরিষ্কার তরল খাবারের ডায়েট অনুসরণ করুন। কোনো ধরনের শক্ত বা কঠিন খাবার গ্রহণ করবেন না। আরও তথ্য জানার জন্য [bXNrLW5vZGUtbGluazogMjAyNDg=] পড়ুন।
- আপনার আগমনের সময়ের ৮ ঘণ্টা আগে পানীয় পান বন্ধ করুন। এই সময়ের পরে কিছুই খাওয়া বা পান করা যাবে না, এমনকি পরিষ্কার তরলও। আপনি আপনার ওষুধের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে পানি পান করতে পারেন।

আরও তথ্য জানার জন্য [bXNrLW5vZGUtbGluazogMzE4MDM2] পড়ুন।

নিচে GLP-1 ওষুধের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। আরও কিছু আছে, তাই নিশ্চিত করুন যে আপনার সেবাদানকারী দল আপনার গ্রহণ করা সমস্ত ওষুধ সম্পর্কে জানে। কখনও কখনও, এগুলি ডায়াবেটিস বা অন্যান্য অবস্থার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করার জন্য নির্ধারিত হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে, এগুলি ওজন কমানোর জন্য নির্ধারিত হয়।

- Semaglutide (Wegovy®, Ozempic®, Rybelsus®)
- Dulaglutide (Trulicity®)

- Tirzepatide (Zepbound®, Mounjaro®)
- Liraglutide (Saxenda®, Victoza®)

আপনার AICD থাকলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে বলুন

আপনার একটি অটোমেটিক ইমপ্ল্যান্টবেল কাডির্ওভাটরার-ডিফিব্রিলেটর (AICD) থাকলে তা আপনার MSK স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে বলুন।

পর্যোজন হলে, আপনার ডাক্তারের থেকে একটি চিঠি করিয়ে নিন

- আপনার একটি অটোমেটিক ইমপ্ল্যান্টবেল কাডির্ওভাটরার-ডিফিব্রিলেটর (AICD) থাকলে, পরিক্রিয়াটির আগে আপনাকে আপনার কাডির্ওলজিস্টের (হাটের ডাক্তার) থেকে একটি ছাড়পত্র নিতে হবে। ছাড়পত্র হল একটি পত্র যাতে লেখা থাকে যে আপনি নিরাপদে পরিক্রিয়াটি করতে পারবেন।
- আপনার কোনো বুকো ব্যথা, মাথা ঘোরা, শ্বাসকষ্ট হলে অথবা গত 6 সপ্তাহের মধ্যে আপনি অজ্ঞান হয়ে থাকলে, আপনাকে আপনার ডাক্তার দিয়ে পরীক্ষা করিয়ে নিতে হবে এবং আপনার পরিক্রিয়ার আগে আপনার ডাক্তারের কাছ থেকে একটি ছাড়পত্র সংগ্রহ করতে হবে।

আপনার MSK ডাক্তারের অফিসে আপনার পরিক্রিয়ার অন্তত 1 দিন আগে এই ছাড়পত্রটি পৌঁছে যেতে হবে।

আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কাউকে ঠিক করে রাখুন

আপনার পরিক্রিয়ার পরে আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সঙ্গে অবশ্যই একজন দায়িত্ববান পরিচর্যা সহযোগীকে থাকতে হবে। দায়িত্ববান পরিচর্যা সহযোগী হলেন এমন ব্যক্তি যিনি আপনাকে নিরাপদে বাসায় নিয়ে যেতে সহায়তা করতে পারেন। তাদের কোনো উদ্বেগ থাকলে তারা যেন আপনার পরিচর্যাকারী দলের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার পরিক্রিয়ার আগের দিন নিশ্চিতভাবে বিষয়টির পরিকল্পনা করে রাখুন।

আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার যদি দায়িত্ববান পরিচর্যা সহযোগী না থাকে তবে নিচের একটি এজেন্সিকে কল করুন। আপনাকে সঙ্গে করে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা কাউকে পাঠাবে। এই পরিষেবার জন্য চার্জ করা হয় এবং আপনাকে যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। ট্যাক্সি বা গাড়ি পরিষেবা ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু তবুও আপনার সাথে কোনো দায়বদ্ধ পরিচর্যা সহযোগীকে থাকতে হবে।

নিউ ইয়র্কের এজেন্সিসমূহ

নিউ জার্সিতে এজেন্সিসমূহ

আপনার পরকির্যাটি শুরুর 3 দিন আগে

একজন এনেডাস্কাপি নাসর্ আপনার পরকির্যার 3 দিন আগে সকাল 8টা থেকে সন্ধ্যা 6টার মধ্যে আপনাকে কল করবেন। তারা এই গাইডের নিদের্শাবলী আপনার সাথে পয়র্লোচনা করবেন এবং আপনার চিকিৎসার ইতিহাস নিয়ে পরশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন। নাসর্ আপনার ওষুধগুলিও পয়র্লোচনা করবেন। তারা আপনাকে বলে দেবেন পরকির্যা করার দিন সকালে কোন ওষুধগুলি খেতে হবে।

সেগুলি লিখে রাখতে নিচের জায়গাটি বয়বহার করুন।

আপনার পরকির্যাটি শুরুর আগের দিন

আপনার পরকির্যার সময়টি নোট করুন

আপনার পরকির্যার আগের দিন দুপুর 12টার পরে একজন কমরী সদসয় আপনাকে ফোন করবেন। আপনার পরকির্যাটির জনয় আপনাকে কখন আসতে হবে তা সেই কমরী সদসয় আপনাকে বলে দেবেন। কোনো সোমবার আপনার পরকির্যাটির দিন সিথর হলে, তারা আপনাকে তার আগের শুরুর ফোন করবেন। আপনি কল না পেয়ে থাকলে, আপনার সবস্থয়সেবা পরদানকারীর অফিসে ফোন করুন।

যদি আপনার পরকির্যা বাতিল করতে হয়, তাহলে GI সময়সূচী নিধর্রণের অফিসে 212-639-5020 নমব্রে কল করুন।

খাওয়া-দাওয়ার নিদের্শনা

গুরুত্বপূর্ণ: আপনি যদি ওজন কমানোর জন্য GLP-1 ওষুধ গ্রহণ করেন, তবে এই নিদেৰ্শাবলী অনুসরণ করবেন না। পরিবর্তে [bXNrLW5vZGUtbGluazogMzE4MDM2]-এ থাকা নিদেৰ্শাবলী অনুসরণ করুন।



আপনার অসেত্ৰাপচার বা পর্কির্য়ার আগের রাত ১২টায় খাবার খাওয়া বন্ধ করুন। এর মধ্যে শক্ত ক্যান্ডি এবং গামও অন্তর্ভুক্ত।

কখন খাওয়া বন্ধ করবেন, সে ব্যাপারে আপনার স্বাস্থ্যসেবা পৰ্দানকারীরা অন্য নিদেৰ্শনা দিয়ে থাকতে পারে। এরকম হলে, তাদের নিদেৰ্শনা মেনে চলুন। কিছু ব্যক্তিকে তাদের অসেত্ৰাপচার বা পর্কির্য়ার আগে দীর্ঘ সময় ধরে

উপবাস (খাবার না খাওয়া) করতে হয়।

আপনার পর্কির্য়টি শুরুর দিন

পান করার নিদেৰ্শনা

গুরুত্বপূর্ণ: যদি আপনি একটি GLP-1 ওষুধ গ্রহণ করেন, তাহলে এই নিদেৰ্শনাগুলি অনুসরণ করবেন না। পরিবর্তে [bXNrLW5vZGUtbGluazogMzE4MDM2]-এ থাকা নিদেৰ্শাবলী অনুসরণ করুন।

আপনার আগমনের 2 ঘণ্টা আগে এবং মধ্যরাতের মধ্যে শুধুমাত্র নিচের তালিকাভুক্ত তরল পান করুন। আর কোনো কিছু খাবেন না বা পান করবেন না। আপনার আগমনের 2 ঘণ্টা আগে পান করবেন না।

- জল।
- আপেলের সব্চ্ছ জুস, আঙুরের সব্চ্ছ জুস বা কের্য়ানবেরির সব্চ্ছ জুস।
- Gatorade বা Powerade।
- ব্ল্যাক কফি বা সাধারণ চা। চিনি দিলেও কোনো সমস্যা নেই। আর কিছু দেবেন না।
 - কোনো ধরনের দুধ বা কের্য়াম দেবেন না। এর মধ্যে উদ্ভিজ্জ দুধ এবং কের্য়াম অন্তর্ভুক্ত।
 - সব্দ্য়ুক্ত কোনো সিরাপ যোগ করবেন না।

আপনার ডায়াবেটিস থাকলে, পানীয়তে আপনার চিনির পরিমাণ নিয়ন্ত্রিত রাখুন। আপনি যদি এইসব পানীয়ের চিনি-ছাড়া, কম-চিনি বা কোনো চিনি নেই এমন উপাদানগুলো পান করেন তাহলে আপনার রক্তের গ্লুকোজের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখা সহজ হবে।

অস্বেত্রপচার বা পরকির্যার আগে শরীরে পয়রাপ্ত পানি বজায় রাখা উপকারী, তাই আপনি তৃষ্ণাতর্ হলে পানি পান করুন। পরয়োজনের চাইতে বেশি পান করবেন না। আপনার অস্বেত্রপচার বা পরকির্যার সময় আপনাকে শিরায (আইভি) তরল দেওয়া হবে।



আপনার আগমনের 2 ঘণ্টা আগে পান করবেন না। পানিও এতে অন্তর্ভুক্ত।

কখন পান করা বন্ধ করবেন, সে ব্যাপারে আপনার স্বাস্থ্যসেবা পর্দানকারীরা অনয্ নিদের্শনা দিয়ে থাকতে পারে। এরকম হলে, তাদের নিদের্শনা মেনে চলুন।

যে জিনিসগুলি মনে রাখতে হবে

- আপনার পরকির্যার দিন সকালে আপনার স্বাস্থ্যসেবা পর্দানকারী আপনাকে যে ওষুধগুলি খেতে বলেছে শুধু সেগুলিই খান। কয়েক চুমুক জল দিয়ে সেগুলি খান।
- কোনো ধরনের লোশন, কির্ম, পাউডার, মেকআপ, পারফিউম বা কোলোন ব্যবহার করবেন না।
- শরীরে ফুটো করে পরা যে কোনো গহনা সহ সমস্ত গহনা খুলে রাখুন।
- মূল্যবান বস্তু (যেমন - কের্ডিট কাডর্ এবং গহনা) বাড়িতে রেখে যান।
- আপনি যদি কন্ট্যাক্ট লেন্স পরেন তাহলে তার পরিবর্তে চশমা পরুন।

কী আনতে হবে

- পয্চ এবং কির্ম সহ বাড়িতে আপনি যা যা ওষুধ খান তার একটি তালিকা।
- আপনার যদি কোনো রেসকিউ ইনহেলার (যেমন- হাঁপানির জনয্ আলবুটেরল) থাকে তাহলে সেটি।
- আপনার চশমার জনয্ একটি কেস।
- আপনার হেলথ কেয়ার পরকিস্ ফরম, যদি আপনার পূরণ করা থাকে।

কোথায় যাবেন

আপনার আপার এনেডাসেকাপি এই অবস্থানগুলির মধ্যে একটিতে হবে:

- ডেভিড এইচ. কোচ সেন্টার
530 East 74th সড়ক

নিউ ইয়র্ক, NY 10021

লিফট দিয়ে 8th ফেয়ারে যান।

- মেমোরিয়াল হাসপাতালের এন্ডোস্কপি স্যুট (MSK-এর প্রধান হাসপাতাল)
1275 ইয়র্ক এভিনিউ (East 67th and East 68th সড়কের মধ্যবর্তী স্থানে)
নিউ ইয়র্ক, NY 10065
লিফট B দিয়ে 2nd ফেয়ারে যান। ডানে বাঁক নিন এবং কাঁচের দরজা ঠেলে
এন্ডোস্কপি/সাজিরক্যাল ডে হাসপাতাল সুইটে ঢুকুন।
- MSK Monmouth
480 রেড হিল রোড
মিডল টাউন, NJ 07748

সমস্ত MSK অবস্থানে পাকিং বিষয়ক তথ্য এবং দিকনির্দেশনা পেতে www.msk.org/parking ভিজিট করুন।

কী আশা করতে পারেন

আপনি পৌঁছেলে

আপনি পৌঁছে গেলে, আপনাকে আপনার নাম, নামের বানান এবং জন্ম তারিখ অনেকবার বলতে বলা হবে। এটি আপনার নিরাপত্তার জন্য। একই নামের বা অনুরূপ নামের ব্যক্তিবর্গের সেই একই দিনে পরিকর্যা থাকতে পারে।

হাসপাতালের গাউন পরিধান করার পর, আপনি আপনার নাসের সাথে দেখা করবেন। তারা আপনার শিরায় একটি ইন্টারভেনাস (IV) ক্যাথেটার লাগাতে পারে, সাধারণত আপনার হাতে বা বাহুতে। আপনার পরিকর্যা চলাকালীন আপনাকে অ্যানেস্থেসিয়া (আপনার ঘুমানোর ওষুধ) দিতে IV ব্যবহার করা হবে। আপনার পরিকর্যাটির আগে আপনি IV এর মাধ্যমে তরলও পেতে পারেন।

আপনার পরিকর্যার আগে আপনার ডাক্তারের সাথে আপনি কথা বলবেন। তারা পরিকর্যাটি ব্যাখ্যা করবেন এবং আপনার প্রশ্নের উত্তর দেবেন।

আপনার পরিকর্যাটির সময়

আপনার পরিকর্যার সময় হলে, আপনি পরিকর্যা কক্ষে যাবেন এবং পরীক্ষার টেবিলের উপর শোয়ানো হবে। আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী আপনার হার্ট, শ্বাসপ্রশ্বাস এবং রক্তচাপ মনিটর করার জন্য সরঞ্জাম সেট আপ করবেন। আপনি আপনার নাকের নিচে অবস্থিত একটি পাতলা নলের মাধ্যমে অক্সিজেন পাবেন। আপনার দাঁত রক্ষা করার জন্য আপনার দাঁতের উপরে মাউথ গার্ড পরানো হবে।

আপনাকে আপনার IV এর মাধ্যমে অ্যানেস্থেসিয়া দেওয়া হবে, যা আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। আপনি ঘুমিয়ে গেলে, আপনার ডাক্তার আপনার মুখ দিয়ে এন্ডোস্কোপি পরবেশ করবেন। এটি আপনার খাদ্যনালীতে, আপনার পাকস্থলী এবং আপনার ক্রুরান্তর্ চলে যাবে। পরয়োজনে আপনার ডাক্তার টিসুয় নমুনা পেতে বায়োপসি করবেন। তারপর তারা এন্ডোস্কোপি অপসারণ করবেন।

আপনার পরিকর্যাটির পরে

আপনার নাসর আপনার হার্ট, শ্বাসপ্রশ্বাস এবং রক্তচাপ মনিটর করে যাবেন। আপনি আপনার গলায় ব্যথা অনুভব করতে পারেন। আপনি যদি তা করেন তবে এই ব্যথা 1 থেকে 2 দিনের মধ্যে চলে যাবে।

আপনি পুরোপুরি জেগে ওঠার পরে, আপনার নাসর্ আপনার IV খুলে দেবেন। আপনি বাড়িতে যাওয়ার আগে আপনার নাসর্ আপনাকে আপনার ডিসচার্জের নির্দেশাবলী বুঝিয়ে দেবেন।

বাড়িতে

আপনার পরিক্রমার পরে 24 ঘণ্টা (1 দিন) কোনো অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় পান করবেন না।

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে যখন ফোন করবেন

আপনার নিম্নলিখিত কোনো সমস্যা হলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে ফোন করুন:

- 101 °ফা (38.3 °সে) বা তার বেশি জ্বর
- বৃক্ক বন্ধ বা শ্বাসকষ্ট (শ্বাস নিতে কষ্ট হয়)
- আপনার তলপেটে (পেট) গুরুতর বন্ধ, কঠোরতা বা ফোলাভাব
- আপনার বমিতে রক্ত (কোনো কিছু উগরে দিচ্ছেন)
- দুর্বলতা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া অথবা উভয়ই
- অন্য কোনো প্রশ্ন বা উদ্বেগ

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

আরো রিসোর্সের জন্য www.mskcc.org/pe-এ ভিজিট করে আমাদের ভার্চুয়াল লাইবেররি দেখুন।

About Your Upper Endoscopy - Last updated on November 24, 2025

Memorial Sloan Kettering Cancer Center কতর্ক সবরসব্ৎ সংরক্ষিত