



রোগী এবং শূশরুযাকারীর শিক্ষা

স্তন অস্বেতৰূপচাৰেৰ আগে তেজস্কিৰ্য বীজের সাহাযেয় ক্ৰতস্থানের অবস্থান নিধৰ্ৱাৰণ।

এই তথ্যে মেমোরিয়াল স্লোন কেটারিং (MSK)-এ আপনাত স্তন অস্বেতৰূপচাৰেৰ আগে তেজস্কিৰ্য বীজের সাহাযেয় ক্ৰতস্থানের অবস্থান নিধৰ্ৱাৰণ (ৰেডিওঅয়াকটিভ সিড লোকালাইজেশন) পদ্ধতি সম্পকেৰ্ বয়খয় করা হযেছে।

স্তনে সিড লোকালাইজেশন সম্পকেৰ্

বেরস্ট সিড লোকালাইজেশন হলো একটি পদ্ধতি, যেখানে অসব্ভাবিক স্তন টিসুয়ৰ অবস্থান চিহ্নিত করার জনয় ছোট তিলের দানার মতো আকারের একটি ক্ৰদুৰ্ ধাতব সিড সেখানে স্থাপন করা হয়। অসব্ভাবিক টিসুয়টি যদি এতটাই ছোট হয় যে হাত দিয়ে অনুভব করা বা শনাক্ত করা সম্ভব না হয়, তবে এই পদ্ধতিটি করা হতে পারে। সিডটিতে অল্প পরিমাণ তেজস্কিৰ্য পদার্থ থাকে।

আপনাত অস্বেতৰূপচাৰেৰ সময়, সাজৰ্ন একটি বিশেষ যন্তৰ্ বয়বহার করে বেরস্ট সিড এবং এর চারপাশের অসব্ভাবিক টিসুয়ৰ অবস্থান নিৰ্ণয় করবেন। এরপর তারা সিড এবং টিসুয়টি অপসারণ করবেন।

আপনাত চিকিৎসক আপনাকে এই পদ্ধতিটি সম্পকেৰ্ বয়খয় করবেন এবং আপনাত পরশ্নগুলোর উত্তর দেবেন।

আপনাত পর্কিৰ্যটি শুরুর আগে

আপনাত সব্স্থয়সেবা পর্দানকারীর সঙ্গে কথা বলুন।

আপনি যে সমস্ত ওষুধ গৰ্হণ করছেন, যাত মধ্যেয় পয়চ এবং কিৰ্মও অন্তভূৰ্কত, সেগুলো সম্পকেৰ্ আপনাত চিকিৎসককে জানান। আপনাত বেরস্ট সিড লোকালাইজেশন পদ্ধতির আগে কিছু নিদিৰ্ষ্ট ওষুধ গৰ্হণ বন্ধ করতে হতে পারে।

আপনি যদি বতরমানে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান, তাহলে আপনার চিকিৎসককে জানান। আপনি বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে পারেন এমন একটি ভিন্‌ন ধরনের বেরস্ট সিড লোকালাইজেশন পদ্ধতি করা সম্ভব হতে পারে।

আপনার তব্‌ক থেকে ডিভাইস অপসারণ করুন

আপনি আপনার তব্‌কে কিছু ডিভাইস লাগাতে পারেন। আপনার পর্কির্‌য়া, অস্‌ত্‌রাপ্‌চার, বা স্‌ক্‌য়ানের আগে, কিছু ডিভাইস পরস্‌তুতকারক পরামশর্‌ দেন যে আপনি আপনার নিম্নলিখিতগুলো সরিয়ে নিন:

- কন্‌টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটর (CGM)
- ইনসুলিন পাম্প

আপনার ডিভাইস পরিবর্তন করার তারিখের কাছাকাছি সময়ে আপনার অ্যাপয়েন্‌টমেন্টের সময় নিধর্রণ সম্পকের্‌ আপনার সর্‌বাস্‌থ্‌য়্‌ সেবাদানকারীর সাথে কথা বলুন। আপনার পর্কির্‌য়া, অস্‌ত্‌রাপ্‌চার বা স্‌ক্‌য়ানের পরে ব্‌য়ব্‌হার করার জন্‌য়্‌ অতিরিক্‌ত একটি ডিভাইস সঙ্‌গে নিয়ে আসা নিশ্‌চিত করুন।

আপনার ডিভাইস বন্‌ধ থাকার সময় আপনি কীভাবে আপনার গ্লুকোজ (রক্‌ত চিনি) নিয়ন্‌তর্‌ণ করবেন তা নিশ্‌চিত নাও হতে পারেন। এমনটি হলে, আপনার অ্যাপয়েন্‌টমেন্টের আগে আপনার ডায়াবেটিসের যত্ন নেওয়া সর্‌বাস্‌থ্‌য়্‌ সেবাদানকারীর সাথে কথা বলুন।

আপনার পর্কির্‌য়াটি শুরুর দিন

- আপনার স্‌তন, স্‌তনব্‌ন্‌ত বা বগলের নিচে কোনো কিছু লাগাবেন না। এর মধ্যে স্‌ট্‌য়াল্‌কম পাউডার, ডিওডোরেন্ট, সুগন্‌ধি, কোলোন এবং কির্‌ম অন্‌তর্‌ভুক্ত।
- এমন একটি জামা পরুন যা সহজে খুলে ফেলা যায়।
- আপনার পদ্ধতিটি যিনি সম্পন্‌ন করবেন সেই চিকিৎসককে জানান, যদি আপনার কোনো ওষুধে অ্যালাজির্‌ থাকে।

আপনার পর্কির্‌য়াটির সময়

আপনার বেরস্ট সিড লোকালাইজেশন পদ্ধতিটি ম্‌য়ামোগর্‌মের সময় করা হবে, যেখানে আপনার স্‌তন চেপে ধরা অবস্‌থায় থাকবে; অথবা যদি আল্‌ট্‌রাস্‌উন্‌ড্‌ টিসুয়্‌টি আরও সহজে দেখা যায়, তাহলে আল্‌ট্‌রাস্‌উন্‌ড্‌র মাধ্যম্‌ এই পদ্ধতিটি করা হবে।

পর্যমে, আপনার চিকিৎসক ময়ামোগরাম বা আলট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে আপনার স্তনের একটি ছবি নেবেন। অস্বাভাবিক টিসুয়র অবস্থান শনাক্ত করার পর, আপনার চিকিৎসক সেই স্থানের কাছাকাছি একটি স্থানীয় অবশকারী ওষুধ (লোকাল অ্যানেসথেটিক—যে ওষুধ কোনো নিদ্রিষ্ট অংশকে অবশ করে দেয়) ইনজেকশনের মাধ্যমে পর্যোগ করবেন।

স্থানটি অবশ হয়ে যাওয়ার পর, আপনার চিকিৎসক সিডিটি ভেতরে থাকা একটি সূচ (নিডল) আপনার স্তনের মধ্যে পরবেশ করাবেন। সূচটি পরবেশ করানোর পর, তারা আপনার স্তনের আরও কিছু ছবি নেবেন। পর্যোজন হলে, সূচটির অবস্থান পরিবর্তন করা হবে এবং আরও কিছু ছবি নেওয়া হবে।

যখন সূচটি সঠিক স্থানে থাকবে, তখন সিডিটি টিসুয়র মধ্যে স্থাপন করা হবে এবং আপনার চিকিৎসক সূচটি বের করে নেবেন। সিডিটি আপনার অস্ত্রোপচার পয়রন্ত আপনার স্তনের মধ্যে থাকবে। সিডিটির সঠিক অবস্থান দেখানোর জন্য আপনার আরও কিছু ছবি নেওয়া হবে। পরে, আপনার সাজরন এই ছবিগুলোকে একটি মানচিত্র হিসেবে বয়বহার করে আপনার অস্ত্রোপচার পরিচালনা করবেন।

যদি আপনার বেরস্ট সিড লোকালাইজেশন আলট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে, তাহলে পদ্ধতিটি সম্পন্ন হওয়ার পরপরই আপনার একটি ময়ামোগরাম করা হবে। এটি আপনার সাজরনকে সিডিটি কোথায় অবস্থিত তা দেখতে সাহায্য করবে।

যেখানে সূচটি পরবেশ করানো হয়েছিল, সেই স্থানটি সাজিরক্যাল টেপ (যেমন Steri-Strip™) দিয়ে ঢেকে দেওয়া হবে এবং সাজিরক্যাল টেপের ওপর একটি ছোট বয়ান্ডেজ (যেমন Band-Aid®) লাগানো হবে।

গোসল করার আগে বয়ান্ডেজটি খুলে ফেলুন, তবে স্টিরপগুলো আপনার তব্কে লাগানো অবস্থায় রেখে দিন। গোসল করার বিষয়ে আপনার সাজরনের নিদের্শনা অনুসরণ করুন। আপনার সাজরন আপনার জন্য স্টিরপগুলো খুলে দেবেন।

আপনার বেরস্ট সিড লোকালাইজেশন পদ্ধতিটি সম্পন্ন হতে পরায় ৩০ মিনিট সময় লাগবে।

আপনার পর্কিরয়াটির পরে

- পরবতরী এক মাস (৩০ দিন) অথবা অস্ত্রোপচারের সময় সিডিটি অপসারণ না হওয়া পয়রন্ত, পর্তিদিন ৩০ মিনিটের বেশি সময় ধরে কোনো শিশু বাচ্চা বা ছোট পরাণীকে আপনার বুকের সঙ্গে ধরে রাখবেন না।
- আপনি যে জিনিসগুলো স্পশ করবেন এবং যে কাপড় পরবেন, সেগুলো তেজস্কিয় হয়ে যাবে না। যারা আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ শারীরিক সংস্পশে থাকবেন, তারা খুব অল্প পরিমাণ

তেজস্ক্রিয়তার সংস্পর্শে আসতে পারেন। এই ধরনের সংস্পর্শ কষ্টকর—এমন কোনো পরমাণ নেই।

আপনার কোনো প্রশ্ন বা উদ্বেগ থাকলে, অনুগ্রহ করে মেডিকেল ফিজিক্স বিভাগের রেডিয়েশন সেফটি সাভিসের সঙ্গে 212-639-7391 নম্বরে যোগাযোগ করুন।

আপনার কোনো প্রশ্ন বা উদ্বেগ থাকলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ করুন। আপনার পরিচর্যা দলের একজন সদস্য সোমবার থেকে শুরুর পযন্ত উত্তর দেবেন সকাল 9:00 টা থেকে বিকেল 5:00 টার পর এই সময়ের বাইরে, আপনি একটি বাতর্ রেখে যেতে পারেন বা অন্য একজন MSK প্রদানকারীর সাথে কথা বলতে পারেন। কলে স্বর্দা একজন ডাক্তার বা নাসকে পাবেন। আপনি যদি আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করবেন তা নিশ্চিত না হন, তাহলে ফোন করুন। ২১২-৬৩৯-২০০০.

আরো রিসোর্সের জন্য www.mskcc.org/pe-এ ভিজিট করে আমাদের ভাচুয়াল লাইবেরি দেখুন।

Radioactive Seed Localization Before Breast Surgery - Last updated on January 22, 2025
Memorial Sloan Kettering Cancer Center কতৃক স্ববস্ব সংরক্ষিত