



রোগী এবং শুরুরকারীর শিক্ষা

স্তন অস্বেতৰূপচাৰেৰ আগে তেজসিকৰ্য. বীজের সাহায্যে ক্ৰতস্থানের অবস্থান নিধৰ্ৱাৰণ।

এই তথ্যে মেমোরিয়াল সেলান কেট্যারিং (MSK)-এ আপনাত স্তন অস্বেতৰূপচাৰেৰ আগে তেজসিকৰ্য বীজের সাহায্যে ক্ৰতস্থানের অবস্থান নিধৰ্ৱাৰণ (ৰেডিওঅয়াকটিভ সিড লোকালাইজেশন) পদ্ধতি সম্পকেৰ্ বয়খয় করা হযেছে।

স্তনে সিড লোকালাইজেশন সম্পকেৰ্

বের্‌স্ট সিড লোকালাইজেশন হলো একটি পদ্ধতি, যেকানে অসব্‌ভাবিক স্তন টিসুয়ৰ অবস্থান চিহ্নিত করার জনয় ছোট তিলের দানার মতো আকারের একটি ক্ৰদুৰ্ ধাতব সিড সেখানে স্থাপন করা হয়। অসব্‌ভাবিক টিসুয়টি যদি এতটাই ছোট হয় যে হাত দিয়ে অনুভব করা বা শনাক্ত করা সম্ভব না হয়, তবে এই পদ্ধতিটি করা হতে পারে। সিডটিতে অল্প পরিমাণ তেজসিকৰ্য পদাথৰ্ থাকে।

আপনাত অস্বেতৰূপচাৰেৰ সময়, সাজৰ্‌ন একটি বিশেষ যন্তৰ্ বয়বহার করে বের্‌স্ট সিড এবং এর চারপাশের অসব্‌ভাবিক টিসুয়ৰ অবস্থান নিগৰ্য করবেন। এরপর তারা সিড এবং টিসুয়টি অপসারণ করবেন।

আপনাত চিকিৎসক আপনাকে এই পদ্ধতিটি সম্পকেৰ্ বয়খয় করবেন এবং আপনাত পরশ্নগুলোর উত্তর দেবেন।

আপনার পর্কির্যাটি শুরুর আগে

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সঙ্গে কথা বলুন।

আপনি যে সমস্ত ওষুধ গ্রহণ করছেন, যার মধ্যে প্যাচ এবং ক্রিমও অন্তর্ভুক্ত, সেগুলো সম্পর্কে আপনার চিকিৎসককে জানান। আপনার বেস্ট সিড লোকালাইজেশন পদ্ধতির আগে কিছু নির্দিষ্ট ওষুধ গ্রহণ বন্ধ করতে হতে পারে।

আপনি যদি বর্তমানে শিশুকে বুকের দুধ খাওয়ান, তাহলে আপনার চিকিৎসককে জানান। আপনি বুকের দুধ খাওয়ানো চালিয়ে যেতে পারেন এমন একটি ভিন্ন ধরনের বেস্ট সিড লোকালাইজেশন পদ্ধতি করা সম্ভব হতে পারে।

আপনার ত্বক থেকে ডিভাইস অপসারণ করুন

আপনি আপনার ত্বকে কিছু ডিভাইস লাগাতে পারেন। আপনার পর্কির্যা, অস্কেতর্যপচার, বা স্ক্যানের আগে, কিছু ডিভাইস পরস্তুতকারক পরামর্শ দেন যে আপনি আপনার নিম্নলিখিতগুলো সরিয়ে নিন:

- কন্টিনিউয়াস গ্লুকোজ মনিটর (CGM)
- ইনসুলিন পাম্প

আপনার ডিভাইস পরিবর্তন করার তারিখের কাছাকাছি সময়ে আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময় নিধারণ সম্পর্কে আপনার স্বাস্থ্য সেবাদানকারীর সাথে কথা বলুন। আপনার পর্কির্যা, অস্কেতর্যপচার বা স্ক্যানের পরে ব্যবহার করার জন্য অতিরিক্ত একটি ডিভাইস সঙ্গে নিয়ে আসা নিশ্চিত করুন।

আপনার ডিভাইস বন্ধ থাকার সময় আপনি কীভাবে আপনার গ্লুকোজ

(রকেত চিনি) নিয়ন্ত্রণ করবেন তা নিশ্চিত নাও হতে পারেন। এমনটি হলে, আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টের আগে আপনার ডায়াবেটিসের যত্ন নেওয়া সব্‌স্থায় সেবাদানকারীর সাথে কথা বলুন।

আপনার পর্কির্যাটি শুরুর দিন

- আপনার স্তন, স্তনবৃত্ত বা বগলের নিচে কোনো কিছু লাগাবেন না। এর মধ্যে ট্যালকম পাউডার, ডিওডোরেন্ট, সুগন্ধি, কোলোন এবং ক্রিম অন্তর্ভুক্ত।
- এমন একটি জামা পরুন যা সহজে খুলে ফেলা যায়।
- আপনার পদ্ধতিটি যিনি সম্পন্ন করবেন সেই চিকিৎসককে জানান, যদি আপনার কোনো ওষুধে অ্যালাজির্ থাকে।

আপনার পর্কির্যাটির সময়

আপনার বেরস্ট সিড লোকালাইজেশন পদ্ধতিটি ময়ামোগ্রামের সময় করা হবে, যেখানে আপনার স্তন চেপে ধরা অবস্থায় থাকবে; অথবা যদি আল্ট্রাসাউন্ডে টিসুয়টি আরও সহজে দেখা যায়, তাহলে আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে এই পদ্ধতিটি করা হবে।

পর্যবেক্ষণ, আপনার চিকিৎসক ময়ামোগ্রাম বা আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে আপনার স্তনের একটি ছবি নেবেন। অস্বাভাবিক টিসুয় অবস্থান শনাক্ত করার পর, আপনার চিকিৎসক সেই স্থানের কাছাকাছি একটি স্থানীয় অবশ্যকারী ওষুধ (লোকাল অ্যানেসথেটিক—যে ওষুধ কোনো নির্দিষ্ট অংশকে অবশ করে দেয়) ইনজেকশনের মাধ্যমে পর্যবেক্ষণ করবেন।

স্থানটি অবশ হয়ে যাওয়ার পর, আপনার চিকিৎসক সিডটি ভেতরে থাকা

একটি সূচ (নিডল) আপনার স্তনের মধ্য পর্বশ করাবেন। সূচটি পর্বশ করানোর পর, তারা আপনার স্তনের আরও কিছু ছবি নেবেন। পর্যোজন হলে, সূচটির অবস্থান পরিবর্তন করা হবে এবং আরও কিছু ছবি নেওয়া হবে।

যখন সূচটি সঠিক স্থানে থাকবে, তখন সিডটি টিসুয়র মধ্য স্থাপন করা হবে এবং আপনার চিকিৎসক সূচটি বের করে নেবেন। সিডটি আপনার অস্েত্রাপচার পযরন্ত আপনার স্তনের মধ্য থাকবে। সিডটির সঠিক অবস্থান দেখানোর জন্য আপনার আরও কিছু ছবি নেওয়া হবে। পরে, আপনার সাজরন এই ছবিগুলোকে একটি মানচিত্র হিসেবে ব্যবহার করে আপনার অস্েত্রাপচার পরিচালনা করবেন।

যদি আপনার বেরস্ট সিড লোকালাইজেশন আল্ট্রাসাউন্ডের মাধ্যমে করা হয়ে থাকে, তাহলে পদ্ধতিটি সম্পন্ন হওয়ার পরপরই আপনার একটি ময়ামোগরাম করা হবে। এটি আপনার সাজরনকে সিডটি কোথায় অবস্থিত তা দেখতে সাহায্য করবে।

যেখানে সূচটি পর্বশ করানো হয়েছিল, সেই স্থানটি সাজিরক্যাল টেপ (যেমন Steri-Strip™) দিয়ে ঢেকে দেওয়া হবে এবং সাজিরক্যাল টেপের ওপর একটি ছোট বয়ান্ডেজ (যেমন Band-Aid®) লাগানো হবে।

গোসল করার আগে বয়ান্ডেজটি খুলে ফেলুন, তবে স্িট্রপগুলো আপনার তব্কে লাগানো অবস্থায় রেখে দিন। গোসল করার বিষয়ে আপনার সাজরনের নির্দেশনা অনুসরণ করুন। আপনার সাজরন আপনার জন্য স্িট্রপগুলো খুলে দেবেন।

আপনার বেরস্ট সিড লোকালাইজেশন পদ্ধতিটি সম্পন্ন হতে পর্য ৩০ মিনিট সময় লাগবে।

আপনার পর্কিরয়াটির পরে

- পরবতরী এক মাস (৩০ দিন) অথবা অসেতর্পচারের সময় সিডিটি অপসারণ না হওয়া পর্যন্ত, প্রতিদিন ৩০ মিনিটের বেশি সময় ধরে কোনো শিশু বাচ্চা বা ছোট পরাণীকে আপনার বুকের সঙ্গে ধরে রাখবেন না।
- আপনি যে জিনিসগুলো স্পর্শ করবেন এবং যে কাপড় পরবেন, সেগুলো তেজস্কর্য হয়ে যাবে না। যারা আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ শারীরিক সংস্পর্শ থাকবেন, তারা খুব অল্প পরিমাণ তেজস্কর্যতার সংস্পর্শে আসতে পারেন। এই ধরনের সংস্পর্শ ক্রমিক—এমন কোনো পরমাণ নেই।

আপনার কোনো প্রশ্ন বা উদ্বেগ থাকলে, অনুগ্রহ করে মেডিকেল ফিজিক্স বিভাগের রেডিয়েশন সেফটি সাভিসের সঙ্গে 212-639-7391 নম্বরে যোগাযোগ করুন।

আপনার কোনো প্রশ্ন বা উদ্বেগ থাকলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ করুন। আপনার পরিচর্যা দলের একজন সদস্য সোমবার থেকে শুক্রবার পর্যন্ত উত্তর দেবেন সকাল 9:00 টা থেকে বিকেল 5:00 টার পর এই সময়ের বাইরে, আপনি একটি বাতর রাখতে পারেন বা অন্য একজন MSK প্রদানকারীর সাথে কথা বলতে পারেন। কলে সর্বদা একজন ডাক্তার বা নার্সকে পাবেন। আপনি যদি আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করবেন তা নিশ্চিত না হন, তাহলে ফোন করুন। ২১২-৬৩৯-২০০০.

আরো রিসোর্সের জন্য www.mskcc.org/pe-এ ভিজিট করে আমাদের ভাচুয়াল লাইব্রেরি দেখুন।

Radioactive Seed Localization Before Breast Surgery - Last updated on January 22, 2025

Memorial Sloan Kettering Cancer Center কতর্ক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত