



রোগী এবং শূশরুযাকারীর শিক্ষা

MiraLAX® বয্‌বহার করে কীভাবে আপনার কোলোনোস্কাপিৰ জনয্‌ পরস্তুত হবেন

এই তথয্‌বলী আপনাকে পলিএথিলিন গ্লাইকল (MiraLAX) বয্‌বহার করে আপনার কোলনোস্কাপিৰ জনয্‌ আপনাকে তৈরি হতে সহায়তা করবে।

আপনার কোলোনোস্কাপি সম্পকের

কোলনোস্কাপি হল একটি পরীক্ষা যা আপনার ডাক্তারকে আপনার কোলনের (বৃহদান্তর) ভিতরটা দেখার সুযোগ দেয়। আপনার ডাক্তার আপনার কোলনের ভিতরের অংশটি দেখতে একটি কোলনোস্কাপি বয্‌বহার করবেন। এটি একটি নমনীয় টিউব যার শেষ পরানেত একটি কয্‌মেরা রয়েছে। ছবিগুলো একটি ভিডিও মনিটরে দেখা যাবে।

পরকিরয্‌টিৰ সময়, আপনার ডাক্তার য়েগুলি করতে পারেন:

- পরীক্ষার জনয্‌ টিসুয্‌ (বায়োপসি) একটি ছোটো নমুনা অপসারণ।
- একটি পলিপ (টিসুয্‌ বৃদ্ধি) অপসারণ।
- আপনার কোলনের ভিতরের অংশের ছবি তোলা।

আপনার পরকিরয্‌টিৰ সম্পনের জনয্‌ আপনার কোলন খালি থাকতে হবে। আপনার কোলনের ভিতরে মল (পায়খানা) থাকলে আপনার ডাক্তার পলিপ বা অনয্‌নয্‌ পরকিরয্‌টিৰ সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন না। এমনটি ঘটলে আপনাকে আবার পরকিরয্‌টিৰ সম্পনের পরয্‌য়োজন হতে পারে।

মনোয্‌োগ সহকারে এই নিদেৰ্শাবলী অনুসরণ করুন। আপনার কোনো পরশ্ন থাকলে, আপনার ডাক্তারের অফিসে য়োগায্‌োগ করুন।

আপনার কোলোনোস্কাপিৰ 1 সপ্তাহ আগে

আপনার ওষুধ সম্পকের জিজ্ঞাসা করুন

পরকিরয্‌টিৰ আগে আপনাকে আপনার নিয়মিত কিছু ওষুধ খাওয়া বন্ধ করতে হতে পারে। কোন

ওষুধগুলো বন্ধ করলে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না সে সম্পর্কে আপনার স্বাস্থ্যসেবা পরদানকারীর সাথে কথা বলুন।

নিচে আমরা কিছু ওষুধের উদাহরণ দিয়েছি, তবে আরও অনেক রয়েছে। আপনার পরিষেবা পরদানকারী দলের কাছে যেন আপনি যেসকল ওভার-দয়-কাউন্টার এবং পেরস্ক্রিপশনের ওষুধ গ্রহণ করে সেগুলোর সকল তথ্য থাকে তা নিশ্চিত করুন। পেরস্ক্রিপশনের ওষুধ হলো এমন ওষুধ যা আপনি শুধুমাত্র একজন স্বাস্থ্যসেবা পরদানকারীর পেরস্ক্রিপশনের মাধ্যমে পেতে পারেন। ওভার-দয়-কাউন্টারের ওষুধ হলো এমন ওষুধ যা আপনি পেরস্ক্রিপশন ছাড়াই কিনতে পারেন।



আপনার পরিক্রমার আগে কয়েকদিন সঠিকভাবে আপনার ওষুধ গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি না করেন, তাহলে আমাদেরকে আপনার পরিক্রমা পুনঃনির্ধারণ করতে হতে পারে।

অ্যান্টিকোয়াগুল্যান্টস (রক্ত পাতলা করে)

ব্লাড থিনার হলো এমন ওষুধ যা আপনার রক্ত জমাট বাঁধার পরিক্রমাকে পরভাবিত করে। রক্ততঞ্চনের চিকিৎসায় বা কোনো হার্ট অ্যাটাক বা স্ট্রোকের প্রতিরোধে আপনি কোনো রক্ত পাতলা করার ওষুধ খেলে, ওষুধটির পেরস্ক্রাইব করেছেন যে ডাক্তার, তাকে জিজ্ঞাসা করুন কখন এই ওষুধটি খাওয়া বন্ধ করা যাবে।

এখানে কিছু রক্ত পাতলা করার ওষুধের উদাহরণ দেওয়া হলো। আরও কিছু আছে, তাই নিশ্চিত করুন যে আপনার সেবাদানকারী দল আপনার গ্রহণ করা সমস্ত ওষুধ সম্পর্কে জানে। আপনার কেয়ার টিমের কোনো সদস্যের সাথে কথা না বলে রক্ত পাতলা করা গ্রহণ বন্ধ করবেন না।

- এপিক্সাবান (Eliquis®)
- অ্যাসপিরিন
- সেলেকক্সিব (Celebrex®)
- সিলোস্টাজল (Pletal®)
- ক্লপিডগরেল (Plavix®)
- দবিগাতরান (Pradaxa®)
- ডালেটপারিন (Fragmin®)
- ডিপাইরিডামোল (Persantine®)
- এডোক্সাবান (Savaysa®)
- এনোক্সাপারিন (Lovenox®)
- ফন্ডাপারিনাক্স (Arixtra®)
- হেপারিন ইনজেকশন (শট)

- মেলোক্সিকাম (Mobic®)
- ননস্টেরয়েডাল অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ড্রাগস (NSAID), যেমন আইবুপেরোফেন (Advil®, Motrin®) এবং ন্যাপেরোক্সেন (Aleve®)
- পেনটক্সিফাইলাইন (Trental®)
- পরসুগেরল (Effient®)
- রিভারোক্সাবান (Xarelto®)
- সালফাসালাজিন (Azulfidine®, Sulfazine®)
- টিকাগেরল (Brilinta®)
- টিএঞ্জাপারিন (Innohep®)
- ওয়ারফারিন (Jantoven®, Coumadin®)

ডায়াবেটিসের ওষুধ

আপনি যদি ইনসুলিন বা ডায়াবেটিসের অন্যান্য ওষুধ গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার ডোজ পরিবর্তন করার পরয়োজন হতে পারে। যে ডাক্তার আপনার ডায়াবেটিসের ওষুধ নিধারণ করেন, পরিক্রয়ার আগের দিন এবং পরিক্রয়ার সকালে কী করতে হবে তা তাঁর কাছে জিজ্ঞাসা করুন।

আপনার পরিক্রয়ার আগের দিন এবং পরিক্রয়ার দিন এই ওষুধগুলো গ্রহণ করবেন না:

- মেটফরমিন, যেমন গ্লুকোফেজ® (Glucophage®) বা গ্লুমিটজা® (Glumetza®)।
- যে ওষুধে মেটফরমিন থাকে, যেমন জানুমিট® (Janumet®)।

ওজন কমানোর জন্য GLP-1 ওষুধ।

আপনি যদি GLP-1 ওষুধ গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে জানানো গুরুত্বপূর্ণ। আপনার অস্বাস্থ্যকর বা পরিক্রয়ার আগে বিশেষ খাবার ও পানীয় সংক্রান্ত নির্দেশনা মেনে চলতে হবে। এই নির্দেশাবলী অনুসরণ করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি এগুলো মেনে চলেন না, তাহলে আপনার অস্বাস্থ্যকর বা পরিক্রয়া বিলম্বিত বা বাতিল হতে পারে।

- আপনার অস্বাস্থ্যকর বা পরিক্রয়ার আগের দিন পরিষ্কার তরল খাবারের ডায়েট অনুসরণ করুন। কোনো ধরনের শক্ত বা কঠিন খাবার গ্রহণ করবেন না। আরও তথ্য জানার জন্য [bXNrLW5vZGUtbGluazogMjAyNDg=] পড়ুন।
- আপনার আগমনের সময়ের ৮ ঘণ্টা আগে পানীয় পান বন্ধ করুন। এই সময়ের পরে কিছুই খাওয়া বা পান করা যাবে না, এমনকি পরিষ্কার তরলও। আপনি আপনার ওষুধের সঙ্গে সামান্য পরিমাণে পানি পান করতে পারেন।

আরও তথ্য জানার জন্য [bXNrLW5vZGUtbGluazogMzE4MDM2] পড়ুন।

নিচে GLP-1 ওষুধের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। আরও কিছু আছে, তাই নিশ্চিত করুন যে আপনার সেবাদানকারী দল আপনার গ্রহণ করা সমস্ত ওষুধ সম্পর্কে জানে। কখনও কখনও, এগুলি ডায়াবেটিস বা অন্যান্য অবস্থার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করার জন্য নিধারিত হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে, এগুলি ওজন কমানোর জন্য নিধারিত হয়।

- Semaglutide (Wegovy®, Ozempic®, Rybelsus®)
- Dulaglutide (Trulicity®)

- Tirzepatide (Zepbound®, Mounjaro®)
- Liraglutide (Saxenda®, Victoza®)

আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কাউকে ঠিক করে রাখুন

আপনার পরিক্রয়ার পরে আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সঙ্গে অবশ্যই একজন

দায়িত্ববান পরিচর্যা সহযোগীকে থাকতে হবে। দায়িত্ববান পরিচর্যা সহযোগী হলেন এমন বয়্কিত্ত যিনি আপনাকে নিরাপদে বাসায় নিয়ে যেতে সহায়তা করতে পারেন। তাদের কোনো উদেব্গ থাকলে তারা যেন আপনার পরিচর্যাকারী দলের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার পর্কির্যার আগের দিন নিশ্চিতভাবে বিষয়টির পরিকল্পনা করে রাখুন।

আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জনয়্ আপনার যদি দায়িত্ববান পরিচর্যা সহযোগী না থাকে তবে নিচের একটি এজেনিসকে কল করুন। আপনাকে সঙেগ করে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জনয়্ তারা কাউকে পাঠাবে। এই পরিষেবার জনয়্ চাজর্ করা হয় এবং আপনাকে যাতায়াতের বয়্বস্থা করতে হবে। টয়্কিস্ বা গাড়ি পরিষেবা বয়্বহার করা যেতে পারে, কিন্তু তবুও আপনার সাথে কোনো দায়বদ্ধ পরিচর্যা সহযোগীকে থাকতে হবে।

নিউ ইয়র্কের এজেনিসসমূহ

VNS হেলথ: 888-735-8913

পরিচর্যাকারী বয়্কিত্তবগর্: 877-227-4649

নিউ জার্সিতে এজেনিসসমূহ

পরিচর্যাকারী বয়্কিত্তবগর্: 877-227-4649

পরয়োজন হলে, আপনার ডাক্তারের থেকে একটি চিঠি করিয়ে নিন

আপনার পর্কির্যাটির আগে আপনাকে একটি ছাড়পতর্ নিতে হতে পারে। ছাড়পতর্ হল একটি পতর্ যাতে লেখা থাকে যে আপনি নিরাপদে পর্কির্যাটি করতে পারবেন। আপনার MSK ডাক্তারের অফিসে আপনার পর্কির্যার অন্তত 1 দিন আগে এই ছাড়পতর্টি পৌঁছে যেতে হবে।

অটোমেটিক ইমপ্ল্যান্টবেল কাডির্ওভাটর্-ডিফির্বিলেটর (AICD)

আপনার কোনো AICD থাকলে আপনার MSK ডাক্তারকে তা বলুন। আপনার কাডির্ওলজিস্ট (হাটের্ ডাক্তার) এর নিকট থেকে একটি ছাড়পতর্ সংগর্হের পরয়োজন হবে।

অনয়নয় উপসগর্

যদি গত 6 সপ্তাহের মধ্যে নিম্নোক্তগুলোর মধ্যে আপনার কোনোটি হয়ে থাকে তাহলে আপনার ডাক্তারের নিকট থেকে একটি ছাড়পতর্ সংগর্হের পরয়োজন হবে:

- বুক্ বয়্থা।
- শব্-পরশব্বে সমসয়্ যা নতুন বা দিন দিন আরো খারাপ হয়েছ্।
- অজ্ঞান হয়ে যাওয়া।

সামগর্গুলা কিনুন

পেট পরিষ্কার করার বনেদাবস্ত করতে আপনাকে এই সামগর্গুলা কিনতে হবে। পেট পরিষ্কার করাকে পরায়শই bowel prep বলা হয়।

- বিসাকোডিলের (Dulcolax®) 4টি (5 mg) ট্যাবলেট। এগুলি সাধারণত 10টি ট্যাবলেটের একটি বক্সে বিক্রি হয়।
- 1 (238-গ্রাম) পলিথিন গ্লাইকোলের (MiraLAX®) বোতল
- 64 আউন্সের যেকোনো সব্চ্ছ তরল যা লাল, বেগুনী বা কমলা নয়। আপনাকে এটি MiraLAX এর সাথে মেশাতে হবে। এটি সর্বাভাবিক তাপমাত্রায় রাখুন।
 - Gatorade® বা Powerade® এর মতো একটি স্পোর্টস ড্রিঙ্ক একটি ভালো বিকল্প। আপনি পেট পরিষ্কার করার সময় আপনার যে ইলেক্ট্রলাইট বেরিয়ে গেছে স্পোর্টস ড্রিঙ্ক তা পরিপূরণ করতে সহায়তা করবে।
 - আপনার ডায়াবেটিস থাকলে, সুগার ফ্রী সব্চ্ছ তরল পান করতে ভুলবেন না।

পর্যোজন হলে অতিরিক্ত সামগ্রীগুলি কিনুন

নিম্নলিখিত প্রশ্নের উত্তর যদি আপনি হ্যাঁ দেন তবে আপনাকে অতিরিক্ত সামগ্রীগুলি কিনতে হতে পারে:

- আপনার কি কোষ্ঠকাঠিন্ হওয়ার পরবর্ত্তা (মলত্যাগ করতে সমস্যা) আছে বা সপ্তাহে 3 বারেরও কম মলত্যাগ হয়?
- আপনি কি মাদক (অপিওয়েড) সংশ্লিষ্ট ওষুধ নেন? আপনি নিশ্চিত না হলে, আপনার স্বাস্থ্ সেবা প্রদানকারীকে জিজ্ঞাসা করুন। অপিওয়েডের মধ্যে রয়েছে:
 - ফেনটানাইল (Duragesic®, Subsys®)।
 - মরফিন (DepoDur®, Duramorph®)।
 - হাইডেরাকোডোন (Vicodin®)।
 - অক্সিকোডোন (Oxycontin®, Percocet®)।
- আপনি কি অতীতে পেট ঠিকমতো (আপনার কোলনে মল) পরিষ্কার না করে কোনো কোলনস্কাপি করেছিলেন?

এই প্রশ্নগুলোতে আপনার উত্তর যদি হ্যাঁ হয় তাহলে আপনাকে অতিরিক্ত MiraLAX কিনতে হবে। আপনি 10টি (17-গ্রাম) প্যাকেটের একটি বক্স বা পাউডারের 1টি (119-গ্রাম) বোতল কিনতে পারেন।

এছাড়াও সম্পূর্ণ তরল খাবারের জন্য আপনাকে আরো তরল কিনতে হবে। আপনি কী কী পান করতে পারেন তার উদাহরণগুলো জানতে “আপনার কোলনস্কাপির 2 দিন আগে” বিভাগটি পড়ুন।

আপনার পরিক্রিয়াটি শুরু 5 দিন আগে

আয়রন সাপ্লিমেন্ট নেওয়া বন্ধ করুন

আপনি কোনো আয়রন সাপ্লিমেন্ট নিলে, আপনার পরিক্রিয়ার 5 দিন আগে থেকে সেটি নেওয়া বন্ধ করুন। আয়রন সাপ্লিমেন্ট আপনার মলের রঙ পরিবর্তন করতে পারে। এর ফলে আপনার মলাশয় স্পষ্টভাবে দেখতে ডাক্তারদের অসুবিধা হতে পারে।

আপনার কোলোনোস্কোপির 3 দিন আগে

কম-ফাইবার যুক্ত খাবার খান

আপনার কোলনোস্কোপির 3 দিন আগে থেকে আপনি কম-ফাইবার যুক্ত খাবার খান। এই সময়, এগুলি খাবেন না:

- কাঁচা (সিদ্ধ না করা) ফল ও শাকসবজি।
- ক্যানজাত কনর্সহ, গোটা কানেরল কনর্।
- গোটা শস্য (যেমন ওটমিল, বাদামি চাল, কুইনোয়া বা গমের রুটি)।
- বীজ (যেমন পোস্ত বা তিল)।
- বাদাম।

আপনার এন্ডোস্কোপি নাসের্‌র সাথে কথা বলুন

আপনার পর্কির্যাটির কয়েকদিন আগে, আপনি একজন এন্ডোস্কোপি নাসের্‌র থেকে একটি ফোন পাবেন। তারা এই গাইডের নিদের্শাবলী আপনার সাথে আলোচনা করবেন এবং আপনার চিকিৎসার বিস্তারিত সম্পর্কে পরশ্ন জিজ্ঞাসা করবেন।

নাসর্ও আপনার ওষুধগুলি পযর্লোচনা করবেন এবং পর্কির্যাটির দিন সকালে কোন ওষুধটি খেতে হবে তা বলে দেবেন।

সেগুলি লিখে রাখতে নিচের জায়গাটি বয্‌বহার করুন।

আপনার কোলোনোস্কোপির 2 দিন আগে

কম-ফাইবার যুক্ত খাবার খান যদি না আপনি:

- পরাযই কোষ্ঠকাঠিনেয্ ভোগেন।
- মাদক সংশ্লিষ্ট ওষুধ নেন।
- অতীতে পেট ঠিকমতো পরিষ্কার না করে কোনো কোলনোস্কোপি করেন?

যদি উপযুক্তগুলির মধ্যে কোনোটি আপনার ক্ষেত্রে পর্যোজয্ হয় তাহলে কম-ফাইবার যুক্ত খাবার খাওয়া বন্ধ করুন এবং এই নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন:

- দিনে 3 বার MiraLAX-এর 1টি (17-গ্রাম) ডোজ নিন। প্রতিবার 8 আউন্স তরলের সাথে 1টি ডোজ মেশান। আপনি সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার এবং রাতের খাবারের সময় 1 ডোজ নিতে পারেন।
- একটি সম্পূর্ণ তরল খাবার খান। একটি সম্পূর্ণ তরল খাবারে, আপনি নিম্নলিখিতগুলি খেতে বা পান করতে পারবেন:
 - দই (কোনো ফলের টুকরো ছাড়া)।
 - শাস না থাকা ফলের রস।
 - সোডা।
 - বরখ বা কির্প সুয্প যা এমনভাবে ছাঁকা হয়েছে যে তাতে কোনো শাকসবজির টুকরো নেই।
 - পুষ্টিকর সাপ্লিমেন্ট।
 - আইসকিরম এবং ফরুট আইস। এগুলোর মধ্যে কোনো ফলের টুকরো, বাদাম, ফাজ বা পিনাট বাটার মেশানো যাবে না।

আপনার কোলোনোস্কোপির 1 দিন আগে

আপনার MiraLAX অন্তের পরস্তুতি পরস্তুত রাখুন

আপনার পর্কিরয়ার আগের দিন সকালে, 238 গ্রাম MiraLAX পাউডারের পুরোটা 64 আউন্স সর্বাভাবিক তাপমাত্রার সবচ্ছ তরলে সাথে মেশান যতক্ষণ পযরন্ত না MiraLAX পাউডারটা পুরো মিশে যায়।

একবার MiraLAX পাউডার মিশে গেলে, আপনি মিশরণটি রেফির্জারেটে রেখে দিতে পারেন। এটি ঐচ্ছিক।

আপনার পর্কির্য়ার আগের দিন সকালের আগে MiraLAX পাউডার মেশাবেন না।

পরে একটি সব্চ্ছ তরল খাবার খান

আপনার পর্কির্য়টির আগের দিন আপনাকে একটি সব্চ্ছ তরল খাবার খেতে হবে। সব্চ্ছ একটি তরল খাবারের মধ্যে শুধুমাত্র এমন তরল থাকে যা আপনি দেখতে পারেন। আপনি “সব্চ্ছ তরল খাবার” বিষয়ক টেবিলে উদাহরণ দেখতে পারেন।

আপনি যখন সব্চ্ছ কোনো তরল খাবারের মধ্যে থাকেন:

- কোনো শক্ত খাবার খাবেন না।
- লাল, বেগুনী বা কমলা রঙের কিছু পান করবেন না।
- জেগে থাকাকালীন পর্তি ঘণ্টায় অন্তত 1 (৪-আউন্স) কাপ তরল পান করার চেষ্টা করুন।
- বিভিন্ন ধরনের সব্চ্ছ তরল পান করুন। শুধুমাত্র পানি, কফি ও চা পান করবেন না। আপনি পযর্াপ্ত ক্যালোরি গ্রহণ করছেন কিনা তা এটি নিশ্চিত করতে সহায়তা করে এবং এটি আপনার কোলনোস্কাপি পর্স্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ।
- আপনার ডায়াবেটিস থাকলে, আপনার শুধুমাত্র সুগার ফরী সব্চ্ছ তরল পান করতে এবং মাঝেমাঝেই ব্লাড সুগার লেভেল পরীক্ষা করতে হবে। আপনার কোনো পরশ্ন থাকলে, আপনার সব্স্থয়সেবা পর্দানকারীর সাথে কথা বলুন।

সবচ্ছ তরল পানীয়

	খাওয়া যাবে	খাওয়া যাবে না
সু্যপ	<ul style="list-style-type: none">সবচ্ছ বরখ, বুলন বা কনসোমি।	<ul style="list-style-type: none">শুকনো খাবার বা মশলার ফোড়ন দেওয়া যেকোনো কিছু।
মিষ্টি	<ul style="list-style-type: none">জিলেটিন, যেমন- Jell-O®।সুসব্দু বরফ।শকত ক্যান্ডি, যেমন- Life Savers® এবং lemon drops (লেমন ড্রপস)।	<ul style="list-style-type: none">লাল, বেগুনী বা কমলা রঙের যেকোনো কিছু।অন্যান্য সকল মিষ্টি।
পানীয়সমূহ	<ul style="list-style-type: none">লেমোনেড, আপেল, সাদা করয়ানবেরি এবং সাদা আঙুরের জুসের মতো সবচ্ছ জুস।আদা মিশির্ত পানীয়, 7-Up®, Sprite® বা সেলটজারে মতো সোডা।Gatorade® ও Powerade® এর মতো স্েপাটর্স ডির্ঙ্কস।দুধ বা কির্মার ছাড়া কফি।দুধ বা কির্মার ছাড়া চা।কাবর্নেটেড (ফিজি) এবং সুসব্দু পানি এর মধ্যে অন্তভূর্কত।	<ul style="list-style-type: none">লাল, বেগুনী বা কমলা রঙের যেকোনো কিছু। এর মধ্যে রয়েছে লাল, বেগুনী রঙের কমলার জুস, সোডা, এবং স্েপাটর্স ডির্ঙ্কস।শাস থাকা জুস।নেকটর।স্মুদি বা শেক।দুধ, কির্ম ও অন্যান্য দুগ্ধজাত পণ্য।বাদাম দুধ, উদিভদ দুধ, নন-ডেইরি কির্মার এবং অন্যান্য দুগ্ধজাত বিকল্প।অ্যালকোহলযুক্ত পানীয়।

আপনার পর্কির্য়ার সময়টি নোট করুন

আপনার পর্কির্য়ার আগের দিন দুপুরের (দুপুর 12টা) পরে ভতির্ সংকর্ন্ত অফিসের একজন কমর্ী সদস্য আপনাকে কল করবেন। যদি আপনার পর্কির্য়া সোমবারে নিধর্ারিত হয় তাহলে তারা আপনাকে আগের শূকর্বারে কল করবেন।

পর্কির্য়ার জন্য আপনাকে কখন হাসপাতালে আসতে হবে তা কমর্ী আপনাকে জানাবেন। কোথায় যেতে হবে সেটিও তারা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেবেন। আপনি কোনো কল না পেলে, আপনার ডাক্তারের অফিসে কল করুন।

যদি আপনার পর্কির্য়া বাতিল করতে হয়, তাহলে GI সময়সূচী নিধর্ারণের অফিসে 212-639-5020 নমব্রে কল করুন।

আপনার পেট পরিষ্কার করার পর্কির্য়া শুরু করুন

ধাপ 1: আপনার পর্কির্য়ার আগের দিন বিকেল 4টা, এক গ্লাস জল দিয়ে 2টি বিসাকোডিল (bisacodyl) (5mg) ট্যাবলেট গিলে খান।

ধাপ 2: বিকেল 4:15-এ, MiraLAX মিশর্ণটি পান করা শুরু করুন।

1. বিকেল 4:15-তে, মিশরুণটির 1 (8-আউন্স) কাপ পান করুন।
2. বিকেল 4:30-এ, মিশরুণটির 1 (8-আউন্স) কাপ পান করুন।
3. বিকেল 4:45-এ, মিশরুণটির 1 (8-আউন্স) কাপ পান করুন।
4. বিকেল 5টা, মিশরুণটির 1 (8-আউন্স) কাপ পান করুন।

আপনি মিশরুণের মোট 4 গ্লাস পান করবেন।

- আপনি যখন শেষ করবেন, তখন MiraLAX নিশরুণের অধেরুক পড়ে থাকবে। আপনি MiraLAX মিশরুণের দিব্তীয়াধর্ পান করার সময় আপনার নিধরুিত আগমনের সময়সূচির উপর নিভর্ করবে। ধাপ 3-এর নিদের্শাবলী অনুসরণ করুন।
- পর্থম ডোজটি নেওয়ার 1 ঘণ্টার মধ্যে সাধারণত মলতয্গের পর্কির্যা শুরু হয়, কিন্তু কারোর কারোর কে্ষতের বেশি সময়ও লাগতে পারে।
 - MiraLAX-এর পর্থম ডোজটি পান করার পরে আপনার মলতয্গের পর্কির্যা শুরু না হলেও চিন্তা করবেন না। তরল পান করা বজায় রাখুন এবং নিদের্শনা অনুসারে MiraLAX এর দিব্তীয় ডোজটি শুরু করুন।
- পর্তিবার মলতয্গের পরে আপনার মলদব্বরের আশেপাশের চামড়ায় পেটেরলিয়াম জেলি (Vaseline®) বা A & D® মলম লাগান। এটি অসব্বিস্ত রোধ করতে সহায়তা করে।
- হাইডের্টেড থাকতে কর্মাগত সব্চ্ছ পানীয় পান পান করা বজায় রাখুন এবং আপনার কোলন পরিষ্কার করে ফেলুন।

ধাপ 3 (আপনার পর্কির্যার জনয্ যদি আপনাকে সকাল 11টার আগে আসতে বলা হয়):

আপনার পর্কির্যার জনয্ যদি আপনাকে সকাল 11টার আগে আসতে বলা হয় তাহলে আপনার পর্কির্যার আগের দিন রাতে এই নিদের্শাবলী অনুসরণ করুন:

রাত 11টায় p.m., এক গ্লাস জল দিয়ে 2টি বিসাকোডিল (bisacodyl) ট্যাবলেট গিলে খান। তারপর, MiraLAX মিশরনের দ্বিতীয় অংশটি পান করা শুরু করুন।

1. বিকেল 11:15-তে, মিশরনটির 1 (8-আউন্স) কাপ পান করুন।
2. বিকেল 11:30-এ, মিশরনটির 1 (8-আউন্স) কাপ পান করুন।
3. বিকেল 11:45-এ, মিশরনটির 1 (8-আউন্স) কাপ পান করুন।
4. রাত 12টায় (মাঝরাত), মিশরনটির 1 (8-আউন্স) কাপ পান করুন।

নিশ্চিতভাবে MiraLAX মিশরনের পুরোটা শেষ করুন।

- আপনার পরবেশের সময়ের 4 ঘণ্টা আগে পর্যন্ত আপনি কর্মাগত সব্চ্ছ তরলগুলি পান করে যেতে পারেন।
- আপনার পর্কিরয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছু খাবেন না।

আপনার কোলনস্কাপির দিন

ধাপ 3 (আপনার পর্কিরয়ার জন্য যদি আপনাকে সকাল 11টা বা তার পরে আসতে বলা হয়):

আপনার পর্কিরয়ার জন্য যদি আপনাকে সকাল 11 টা বা তার পরে আসতে বলা হয় তাহলে আপনার পর্কিরয়ার দিন সকালে এই নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন:

সকাল 6-টায়, এক গ্লাস জল দিয়ে 2টি বিসাকোডিল ট্যাবলেট গিলে খান। তারপর, MiraLAX মিশরনের দ্বিতীয় অংশটি পান করা শুরু করুন।

1. সকাল 6:15-এ, মিশরনটির 1 (8-আউন্স) গ্লাস পান করুন।
2. সকাল 6:30-এ, মিশরনটির 1 (8-আউন্স) গ্লাস পান করুন।
3. সকাল 6:45-এ, মিশরনটির 1 (8-আউন্স) গ্লাস পান করুন।
4. সকাল 7-টায় মিশরনটির 1 (8-আউন্স) গ্লাস পান করুন।

নিশ্চিতভাবে MiraLAX মিশরনের পুরোটা শেষ করুন।

- আপনার পরবেশের সময়ের 4 ঘণ্টা আগে পর্যন্ত আপনি কর্মাগত সব্চ্ছ তরলগুলি পান করে যেতে পারেন।
- আপনার পর্কিরয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত কিছু খাবেন না।

যে জিনিসগুলি মনে রাখতে হবে

- আপনার পরকিরয়ার দিন সকালে আপনাকে যে ওষুধগুলি খেতে বলা হয়েছে শুধু সেগুলিই খান। কয়েক চুমুক জল দিয়ে সেগুলি খান।
- আপনার বুকে বা হাতে কোনো লোশন, কির্ম বা পাউডার লাগাবেন না।
- শরীরে ফুটো করে পরা গহনা সহ যেকোনো গহনা খুলে ফেলুন।
- কের্ডিট কাডর্ এবং গহনার মতো সমস্ত মূল্যবান বস্তু বাড়িতে রেখে যান। আপনার মূল্যবান জিনিসপতর্ সংরক্ষণ করার মতো লকার আমাদের নেই।
- আপনি যদি কন্ট্যাক্ট লেন্স পরেন তাহলে তার পরিবর্তর্ চশমা পরুন।

কী আনতে হবে

- আপনার ওয়ালেট কাডর্, যদি আপনার একটি AICD থাকে এবং আপনার কাডর্টি ইতোমধ্যেই হাসপাতালের ফাইলে না থাকে।
- আপনার যদি কোনো রেসকিউ ইনহেলার (যেমন- হাঁপানির জনয় আলবুটেরল) থাকে তাহলে সেটি।
- আপনার চশমা বা দাঁতের কেস, যদি আপনি সেগুলি পরেন।
- আপনার হেলথ কেয়ার পরকিস্ ফরম, যদি আপনি পূরণ করে থাকেন।

কোথায় যাবেন

আপনার পরকিরয়াটি এই কেন্দর্গুলির যেকোনো একটিতে হবে:

- মেমোরিয়াল হাসপাতাল (MSK-এর মূল হাসপাতাল)-এ এনেডাস্কাপি সুয়র্ট
1275 York Avenue (ইস্ট 67তম এবং ইস্ট 68তম সিটর্টের মধ্যে)
নিউ ইয়র্ক, NY 10065
2য় তলায় যেতে B লিফট ব্যবহার করুন। ডানে বাঁক নিন এবং কাঁচের দরজা ঠেলে সাজর্রি অয়ান্ড পেরাসিডুরাল সেন্টারে ঢুকুন।
- David H. Koch Center
530 East 74th St.
New York, NY 10021
লিফট ব্যবহার করে 8ম তলায় যান।
- MSK মনমাউথ
480 রেডহিল রোড মিডলটাউন
মিডলটাউন, NJ 07748

এই স্থানের পাকিরং সম্পকিত তথ্যের জন্য www.msk.org/parking ভিজিট করুন।

কী আশা করতে পারেন

অনেক কমরী আপনাকে আপনার নাম এবং জন্ম তারিখ বলতে ও বানান করতে বলবেন। এটি আপনার নিরাপত্তার জন্য। একই নামের বা অনুরূপ নামের বয়ক্টিবগেরের সেই একই দিনে পরকিরয়া থাকতে পারে।

আপনার পরকিরয়ার জন্য আপনার যখন পোশাক পরিবর্তন করার সময় আসবে তখন আপনি পরার জন্য একটি হসপিটাল গাউন, রোব এবং পিছল-নিরোধী মোজা পাবেন।

আপনার পরকিরয়ার আগে আপনার ডাক্তারের সাথে আপনি দেখা করবেন। তারা আপনাকে পরকিরয়াটি বয়খ্যা করবেন এবং আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দেবেন।

আপনি আপনার অয়নেসিথওলজিস্টের সাথে দেখা করবেন। তারা আপনার চিকিৎসা সম্পকিত ইতিহাস আপনার সাথে পর্যালোচনা করবেন এবং আপনাকে কি ধরনের অয়নেসিথসিয়া (আপনাকে ঘুম পাড়ানোর ওষুধ) দেওয়া হবে সে সম্পর্কে আপনার সাথে কথা বলবেন।

আপনার কোলনস্কাপির সময় হলে একজন কমরী আপনাকে পরকিরয়া কক্ষে নিয়ে আসবেন। আপনি পা ভাঁজ করে বাঁপাশ ফিরে শোবেন।

একজন স্বাস্থ্যসেবা পরদানকারী একটি শিরায় একটি ইন্টারভেনাস (IV) লাগাবেন, সাধারণত আপনার বাহুতে বা হাতে। আপনাকে আপনার IV এর মাধ্যমে অয়নেসিথসিয়া দেওয়া হবে, যা আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। আপনি ঘুমিয়ে পড়ার পরে, আপনার ডাক্তার পরকিরয়াটি আরম্ভ করবেন।

আপনার ডাক্তার আপনার মলদ্বারে একটি কোলনস্কাপ ঢোকাবেন। কোলনস্কাপটি একটি ভিডিও মনিটরের সাথে সংযুক্ত থাকে। এটি আপনার ডাক্তারকে আপনার কোলনের ভিতরটা দেখার সুযোগ দেয়। অস্বাভাবিক কিছু আছে কিনা তা ভিডিও মনিটরের দেখার সময় আপনার ডাক্তার আপনার কোলনের মধ্যে কোলনস্কাপটিকে নাড়াচাড়া করানোর জন্য বাতাস এবং তরল ব্যবহার করবেন।

পরকিরয়াটি সম্পূর্ণ করতে সাধারণত 60 মিনিট (1 ঘণ্টা) লাগে।

পর্যায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs)

আমি পেট পরিষ্কারের মিশ্রণটা খাচ্ছি এবং সেটি শেষ হওয়ার আগেই আমার নরম, জলের মতো, মল বেরনো শুরু হয়েছে। তাও কি আমাকে পেট পরিষ্কারের মিশ্রণটা পান করে যেতে হবে?

হ্যাঁ। একটি নিরাপদ এবং সম্পূর্ণ কোলনস্কাপির জন্য আপনার কোলন পুরোপুরি পরিষ্কার করতে আপনাকে অবশ্যই পুরো পেট পরিষ্কারের মিশ্রণটা পান করতে হবে।

পেট পরিষ্কারের মিশ্রণটা পান করার পরে আমার শরীর মোচড় দিচ্ছে (গা গোলানো) বা মনে হচ্ছে সব বেরিয়ে আসবে (বমি)। আমার কী করা উচিত?

পেট পরিষ্কারের মিশ্রণ পান করার পরে অনেক লোকের গা গোলায়। এ বিষয়ে সহায়তা করতে, আপনার পছন্দের পানীয়ের সাথে MiraLAX পাউডারটি মেশাতে পারেন।

আপনার যদি মনে হয় যে বমি হয়ে যাবে, তাহলে আপনার আস্ত আস্ত পান করা উচিত, এবং পান করার মধ্যে একটু বিরতি দেওয়া উচিত। অথবা আপনার পেট খালি হওয়ার সময় দিতে আপনাকে 30 থেকে 45 মিনিট তরলটা পান করা বন্ধ করতে হবে। আপনি যদি এটি ঠাণ্ডা অবস্থায় খেতে পছন্দ করেন তাহলে আপনি বিরতিকালীন সময় এই পেট পরিষ্কারের মিশ্রণটিকে ফির্জে রাখতে পারেন। বিরতির পরে, পেট পরিষ্কারের মিশ্রণটা আস্ত আস্ত পান করার চেষ্টা করুন। আপনার কাছে থাকলে একটি স্টর্ভ ব্যবহার করুন।

আপনি বমি হয়ে গেলে, একটি 30 থেকে 45 মিনিটের বিরতি নিন। বাড়িতে গা-গোলানো বন্ধ করার ওষুধ থাকলে, পেট পরিষ্কারের মিশ্রণটা আপনার পান করা শুরু করার আগে আপনি সেটির 1টি ডোজ খেতে পারেন। হাইড্রেটেড থাকার জন্য আপনি আপনার পছন্দের যে কোনো সবুজ তরল পান করতে পারেন। একটি নিরাপদ এবং সম্পূর্ণ কোলনস্কাপির জন্য আপনার কোলন পুরোপুরি পরিষ্কার করতে পেট পরিষ্কারের মিশ্রণটা পুরোটা পান করা জরুরি।

আপনার কোলনস্কাপির পরে

আপনার নাসর্ কর্মাগত আপনার হাটর্, শ্বাসপর্শ্বাস এবং রক্তচাপ মনিটর করে যাবেন। একটি কোলনস্কাপির পরে অনেকের মনে হয় পেট ফুলে উঠেছে অথবা পেটে খিঁচ ধরে। এটি স্বাভাবিক এবং পেট থেকে গ্যাস বেরিয়ে এটা ঠিক হয়ে যায়।

আপনি পুরোপুরি জেগে ওঠার পরে, আপনার নাসর্ আপনার IV খুলে দেবেন। আপনার জন্য কেউ অপেক্ষা করলে, আপনি বাড়ি যাওয়ার আগে আপনার নাসর্ আপনাদের দুজনকেই ডিসচার্জের নিদর্শাবলী বুঝিয়ে বলে দেবেন।

বাড়িতে

- ডিসচাজর্ হয়ে আসার পর থেকে আপনি হালকা খাবার খাওয়া শুরু করতে পারেন। পর্থমে তেল মশলাযুক্ত এবং ভাজা খাবার এড়িয়ে চলুন। ধীরে ধীরে সর্বাভাবিক খাদ্যাভাসে ফিরে আসুন। আপনার ডাক্তার কোনো নির্দিষ্ট সময়কালের জন্য আপনার খাবার সীমিত করতে চাইলে, তারা আপনাকে তা বলে দেবেন।
- আপনার পর্কিরয়ার পরে 24 ঘণ্টা কোনো অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় পান করবেন না।
- আপনার পর্কিরয়ার 24 ঘণ্টা পরে আপনি আপনার সর্বাভাবিক কাযর্কলাপে ফিরে যেতে পারবেন।

আপনার একটি বায়োপসি হয়ে থাকলে, আপনার মলদবার থেকে সামান্য রক্তক্ষরণ হতে পারে। কয়েক ফোঁটার বেশি রক্তক্ষরণ হবে না। আপনার পর্কিরয়াটির 24 ঘণ্টা পরে রক্তক্ষরণটি বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত।

একটি কোলনসেক্যাপির পরে, আপনার মলত্যাগ অনিয়মিত বা সাধারণ অভ্যাসের থেকে অনযর্কম হওয়াটাই সর্বাভাবিক। আপনার পর্কিরয়ার পরের এক সপ্তাহ পযর্ন্ত এটা থাকতে পারে।

আপনার স্বাস্থ্যসেবা পরদানকারীকে যখন ফোন করবেন

আপনার নিম্নলিখিত কোনো সমস্যা হলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা পরদানকারীকে ফোন করুন:

- 101 °ফা (38.3 °সে) বা তার বেশি জ্বর।
- পেটে মারাত্মক ঘন্ত্র্ণা বা পেট ফাঁপা।
- 24 ঘণ্টার বেশি সময় ধরে মলদবার থেকে রক্তক্ষরণ।
- মলের সাথে রক্তপাত।
- দুবর্লতা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া বা বমিভাব।
- আপনার মলদবার দিয়ে খুব বেশি রক্তক্ষরণ।

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

আরো রিসোসের্ৰ জনয়্ www.mskcc.org/pe-এ ভিজিট করে আমাদের ভাচুৰ্য়াল লাইবের্ৰি দেখুন।

How To Prepare for Your Colonoscopy Using MiraLAX® - Last updated on June 9, 2025
Memorial Sloan Kettering Cancer Center কত্ৰ্ৰক্ সবৰ্সব্তব্ সংৰক্ষিত