



রোগী এবং শুরুরকারীর শিক্ষা

MiraLAX® ব্যবহার করে কীভাবে আপনার কোলোনোস্কোপির জন্য পরস্তুত হবেন

এই তথ্যবলী আপনাকে পলিএথিলিন গ্লাইকল (MiraLAX) ব্যবহার করে আপনার কোলনোস্কোপির জন্য আপনাকে তৈরি হতে সহায়তা করবে।

আপনার কোলোনোস্কোপি সম্পর্কে

কোলনোস্কোপি হল একটি পরীক্ষা যা আপনার ডাক্তারকে আপনার কোলনের (বৃহদান্ত্র) ভিতরটা দেখার সুযোগ দেয়। আপনার ডাক্তার আপনার কোলনের ভিতরের অংশটি দেখতে একটি কোলনোস্কোপি ব্যবহার করবেন। এটি একটি নমনীয় টিউব যার শেষ পর্যায়ে একটি ক্যামেরা রয়েছে। ছবিগুলো একটি ভিডিও মনিটরে দেখা যাবে।

পরিক্রমার সময়, আপনার ডাক্তার যোগ্য করতে পারেন:

- পরীক্ষার জন্য টিসুয় (বায়োপসি) একটি ছোটো নমুনা অপসারণ।
- একটি পলিপ (টিসুয় বৃদ্ধি) অপসারণ।
- আপনার কোলনের ভিতরের অংশের ছবি তোলা।

আপনার পরিক্রমাটি সম্পন্ন করার জন্য আপনার কোলন খালি থাকতে হবে। আপনার কোলনের ভিতরে মল (পায়খানা) থাকলে আপনার ডাক্তার পলিপ বা অন্যান্য পরিক্রমা সম্পন্ন করতে সক্ষম হবেন না। এমনটি ঘটলে আপনাকে আবার পরিক্রমা সম্পন্ন করার পরয়োজন হতে পারে।

মনোযোগ সহকারে এই নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন। আপনার কোনো প্রশ্ন থাকলে, আপনার ডাক্তারের অফিসে যোগাযোগ করুন।

আপনার কোলোনোস্কোপির 1 সপ্তাহ আগে

আপনার ওষুধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করুন

পর্যক্রমটির আগে আপনাকে আপনার নিয়মিত কিছু ওষুধ খাওয়া বন্ধ করতে হতে পারে। কোন ওষুধগুলো বন্ধ করলে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না সে সম্পর্কে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে কথা বলুন।

নিচে আমরা কিছু ওষুধের উদাহরণ দিয়েছি, তবে আরও অনেক রয়েছে। আপনার পরিষেবা প্রদানকারী দলের কাছে যেন আপনি যেসকল ওভার-দয়-কাউন্টার এবং পেরসক্রিপশনের ওষুধ গ্রহণ করে সেগুলোর সকল তথ্য থাকে তা নিশ্চিত করুন। পেরসক্রিপশনের ওষুধ হলো এমন ওষুধ যা আপনি শুধুমাত্র একজন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর পেরসক্রিপশনের মাধ্যমে পেতে পারেন। ওভার-দয়-কাউন্টারের ওষুধ হলো এমন ওষুধ যা আপনি পেরসক্রিপশন ছাড়াই কিনতে পারেন।



আপনার পর্যক্রমের আগে কয়েকদিন সঠিকভাবে আপনার ওষুধ গ্রহণ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি না করেন, তাহলে আমাদেরকে আপনার পর্যক্রম পুনঃনির্ধারণ করতে হতে পারে।

অ্যান্টিবায়োটিকস (রক্ত পাতলা করে)

ব্লাড থিনার হলো এমন ওষুধ যা আপনার রক্ত জমাট বাঁধার পর্যক্রমকে প্রভাবিত করে। রক্ততঞ্চনের চিকিৎসায় বা কোনো হার্ট অ্যাটাক বা

স্টেরাকের পরতিরোধে আপনি কোনো রক্ত পাতলা করার ওষুধ খেলে, ওষুধটির পেরসকরাইব করেছেন যে ডাক্তার, তাকে জিজ্ঞাসা করুন কখন এই ওষুধটি খাওয়া বন্ধ করা যাবে।

এখানে কিছু রক্ত পাতলা করার ওষুধের উদাহরণ দেওয়া হলো। আরও কিছু আছে, তাই নিশ্চিত করুন যে আপনার সেবাদানকারী দল আপনার গ্রহণ করা সমস্ত ওষুধ সম্পর্কে জানে। আপনার কেয়ার টিমের কোনো সদস্যের সাথে কথা না বলে রক্ত পাতলা করা গ্রহণ বন্ধ করবেন না।

<ul style="list-style-type: none">• এপিক্সাবান (Eliquis®)• অয়াসপিরিন• সেলেককিস্ব (Celebrex®)• সিলোস্টাজল (Pletal®)• ক্লপিডগরেল (Plavix®)• দবিগাতরান (Pradaxa®)• ডালেটপারিন (Fragmin®)• ডিপাইরিডামোল (Persantine®)• এডোক্সাবান (Savaysa®)• এনোক্সাপারিন (Lovenox®)• ফন্ডাপারিনাক্স (Arixtra®)• হেপারিন ইনজেকশন (শট)	<ul style="list-style-type: none">• মেলোক্সিকাম (Mobic®)• ননস্টেরয়েডাল অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ড্রাগস (NSAID), যেমন আইবুপেরাফেন (Advil®, Motrin®) এবং নয়াপেরাক্সন (Aleve®)• পেন্টকিসফাইলাইন (Trental®)• পরসুগেরল (Effient®)• রিভারোক্সাবান (Xarelto®)• সালফাসালাজিন (Azulfidine®, Sulfazine®)• টিকাগেরল (Brilinta®)• টিঞ্জাপারিন (Innohep®)• ওয়ারফারিন (Jantoven®, Coumadin®)
--	---

ডায়াবেটিসের ওষুধ

আপনি যদি ইনসুলিন বা ডায়াবেটিসের অন্যান্য ওষুধ গ্রহণ করেন, তাহলে আপনার ডোজ পরিবর্তন করার পরয়োজন হতে পারে। যে ডাক্তার আপনার ডায়াবেটিসের ওষুধ নিয়ন্ত্রণ করেন, পরিকল্পনার

পড়ুন।

নিচে GLP-1 ওষুধের কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। আরও কিছু আছে, তাই নিশ্চিত করুন যে আপনার সেবাদানকারী দল আপনার গর্হণ করা সমস্ত ওষুধ সম্পর্কে জানে। কখনও কখনও, এগুলি ডায়াবেটিস বা অন্যান্য অবস্থার নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করার জন্য নিধরিত হয়। অন্যান্য ক্ষেত্রে, এগুলি ওজন কমানোর জন্য নিধরিত হয়।

<ul style="list-style-type: none">• Semaglutide (Wegovy®, Ozempic®, Rybelsus®)• Dulaglutide (Trulicity®)	<ul style="list-style-type: none">• Tirzepatide (Zepbound®, Mounjaro®)• Liraglutide (Saxenda®, Victoza®)
---	---

আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য কাউকে ঠিক করে রাখুন

আপনার পরিকল্পনার পরে আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার সঙ্গে অবশ্যই একজন দায়িত্ববান পরিচর্যা সহযোগীকে থাকতে হবে। দায়িত্ববান পরিচর্যা সহযোগী হলেন এমন ব্যক্তি যিনি আপনাকে নিরাপদে বাসায় নিয়ে যেতে সাহায্য করতে পারেন। তাদের কোনো উদ্বেগ থাকলে তারা যেন আপনার পরিচর্যাকারী দলের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন। আপনার পরিকল্পনার আগের দিন নিশ্চিতভাবে বিষয়টির পরিকল্পনা করে রাখুন।

আপনাকে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য আপনার যদি দায়িত্ববান পরিচর্যা সহযোগী না থাকে তবে নিচের একটি এজেন্সিকে কল করুন। আপনাকে সঙ্গে করে বাসায় নিয়ে যাওয়ার জন্য তারা কাউকে পাঠাবে। এই পরিষেবার জন্য চার্জ করা হয় এবং আপনাকে যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। ট্যাক্সি বা গাড়ি পরিষেবা ব্যবহার করা যেতে পারে, কিন্তু তবুও আপনার সাথে কোনো দায়বদ্ধ পরিচর্যা সহযোগীকে থাকতে হবে।

নিউ ইয়র্কের এজেন্সিসমূহ

VNS হেলথ: 888-735-8913

পরিচয়কারী বয়স্কিতবগর: 877-
227-4649

নিউ জার্সিতে এজেন্সিসমূহ

পরিচয়কারী বয়স্কিতবগর: 877-
227-4649

পরয়োজন হলে, আপনার ডাক্তারের থেকে একটি চিঠি করিয়ে নিন
আপনার পরক্ষিয়টি আগে আপনাকে একটি ছাড়পত্ৰ নিতে হতে পারে।
ছাড়পত্ৰ হল একটি পত্ৰ যাতে লেখা থাকে যে আপনি নিরাপদে
পরক্ষিয়টি করতে পারবেন। আপনার MSK ডাক্তারের অফিসে আপনার
পরক্ষিয়ের অন্তত 1 দিন আগে এই ছাড়পত্ৰটি পৌঁছে যেতে হবে।

অটোমেটিক ইমপ্ল্যান্টবেল কাডির্ওভাটর-ডিফিব্রিলেটর (AICD)

আপনার কোনো AICD থাকলে আপনার MSK ডাক্তারকে তা বলুন।
আপনার কাডির্ওলজিস্ট (হাটের ডাক্তার) এর নিকট থেকে একটি
ছাড়পত্ৰ সংগ্ৰহের পরয়োজন হবে।

অন্যান্য উপসগর

যদি গত 6 সপ্তাহের মধ্যে নিম্নোক্তগুলোর মধ্যে আপনার কোনোটি হয়ে
থাকে তাহলে আপনার ডাক্তারের নিকট থেকে একটি ছাড়পত্ৰ সংগ্ৰহের
পরয়োজন হবে:

- বুকে ব্যথা।
- শ্বাস-পরশ্বাসে সমস্যা যা নতুন বা দিন দিন আরো খারাপ হয়েছে।
- অজ্ঞান হয়ে যাওয়া।

সামগ্ৰীগুলি কিনুন

পেট পরিষ্কার করার বন্দোবস্ত করতে আপনাকে এই সামগ্ৰীগুলি

কিনতে হবে। পেট পরিষ্কার করাকে পরায়শই bowel prep বলা হয়।

- বিসাকোডিলের (Dulcolax®) 4টি (5 mg) ট্যাবলেট। এগুলি সাধারণত 10টি ট্যাবলেটের একটি বক্সে বিক্রি হয়।
- 1 (238-গ্রাম) পলিথিন গ্লাইকোলের (MiraLAX®) বোতল
- 64 আউন্সের যেকোনো সবচ্ছ তরল যা লাল, বেগুনী বা কমলা নয়। আপনাকে এটি MiraLAX এর সাথে মেশাতে হবে। এটি সর্বাভাবিক তাপমাত্রায় রাখুন।
 - Gatorade® বা Powerade® এর মতো একটি স্ফাটর্স ডির্ঙ্ক একটি ভালো বিকল্প। আপনি পেট পরিষ্কার করার সময় আপনার যে ইলেক্ট্রলাইট বেরিয়ে গেছে স্ফাটর্স ডির্ঙ্ক তা পরিপূরণ করতে সহায়তা করবে।
 - আপনার ডায়াবেটিস থাকলে, সুগার ফরী সবচ্ছ তরল পান করতে ভুলবেন না।

পরয়োজন হলে অতিরিক্ত সামগ্রীগুলি কিনুন

নিম্নলিখিত পরশ্নের উত্তর যদি আপনি হঁ্যা দেন তবে আপনাকে অতিরিক্ত সামগ্রীগুলি কিনতে হতে পারে:

- আপনার কি কোষ্ঠকাঠিনয্ হওয়ার পর্ণতা (মলতয্গ করতে সমসয্) আছে বা সপ্তাহে 3 বারেরও কম মলতয্গ হয়?
- আপনি কি মাদক (অপিওয়েড) সংশ্লিষ্ট ওষুধ নেন? আপনি নিশ্চিত না হলে, আপনার সব্স্থয্ সেবা পর্দানকারীকে জিজ্ণাসা করুন। অপিওয়েডের মধ্যে য্ রয়েছে:
 - ফেন্টানাইল (Duragesic®, Subsys®)।

- মরফিন (DepoDur[®], Duramorph[®])।
- হাইডেরাকোডোন (Vicodin[®])।
- অক্সিকোডোন (Oxycontin[®], Percocet[®])।
- আপনি কি অতীতে পেট ঠিকমতো (আপনার কোলনে মল) পরিষ্কার না করে কোনো কোলনস্কেপি করেছিলেন?

এই প্রশ্নগুলোতে আপনার উত্তর যদি হ্যাঁ হয় তাহলে আপনাকে অতিরিক্ত MiraLAX কিনতে হবে। আপনি 10টি (17-গ্রাম) প্যাকেটের একটি বক্স বা পাউডারের 1টি (119-গ্রাম) বোতল কিনতে পারেন।

এছাড়াও সম্পূর্ণ তরল খাবারের জন্য আপনাকে আরো তরল কিনতে হবে। আপনি কী কী পান করতে পারেন তার উদাহরণগুলো জানতে “আপনার কোলনস্কেপির 2 দিন আগে” বিভাগটি পড়ুন।

আপনার পর্কির্যাটি শুরুর 5 দিন আগে

আয়রন সাপ্লিমেন্ট নেওয়া বন্ধ করুন

আপনি কোনো আয়রন সাপ্লিমেন্ট নিলে, আপনার পর্কির্যার 5 দিন আগে থেকে সেটি নেওয়া বন্ধ করুন। আয়রন সাপ্লিমেন্ট আপনার মলের রঙ পরিবর্তন করতে পারে। এর ফলে আপনার মলাশয় স্পষ্টভাবে দেখতে ডাক্তারদের অসুবিধা হতে পারে।

আপনার কোলোনোস্কেপির 3 দিন আগে

কম-ফাইবার যুক্ত খাবার খান

আপনার কোলনোস্কেপির 3 দিন আগে থেকে আপনি কম-ফাইবার যুক্ত খাবার খান। এই সময়, এগুলি খাবেন না:

- কাঁচা (সিদ্ধ না করা) ফল ও শাকসবজি।

- কযানজাত কনর্ সহ, গোটা কানেরল কনর্।
- গোটা শসয্ (যেমন ওটমিল, বাদামি চাল, কুইনোয়া বা গমের রুটি)।
- বীজ (যেমন পোস্ত বা তিল)।
- বাদাম।

আপনার এনেডাসেকাপি নাসের্ সাথে কথা বলুন

আপনার পর্কিরয়াটির কয়েকদিন আগে, আপনি একজন এনেডাসেকাপি নাসের্ থেকে একটি ফোন পাবেন। তারা এই গাইডের নিদের্শাবলী আপনার সাথে আলোচনা করবেন এবং আপনার চিকিৎসার বিস্তারিত সম্পর্কে পর্শন জিজ্ঞাসা করবেন।

নাসর্ও আপনার ওষুধগুলি পর্যালোচনা করবেন এবং পর্কিরয়াটির দিন সকালে কোন ওষুধটি খেতে হবে তা বলে দেবেন।

সেগুলি লিখে রাখতে নিচের জায়গাটি ব্যবহার করুন।

আপনার কোলোনোসেকাপির 2 দিন আগে

কম-ফাইবার যুক্ত খাবার খান যদি না আপনি:

- পর্যই কোষ্ঠকাঠিনেয্ ভোগেন।
- মাদক সংশ্লিষ্ট ওষুধ নেন।
- অতীতে পেট ঠিকমতো পরিষ্কার না করে কোনো কোলনোসেকাপি করেন?

যদি উপযুক্তগুলির মধ্যে কোনোটি আপনার কেষ্টে পৰ্য্যোজয় হয়, তাহলে কম-ফাইবার যুক্ত খাবার খাওয়া বন্ধ করুন এবং এই নিদেৰ্শাবলী অনুসরণ করুন:

- দিনে 3 বার MiraLAX-এর 1টি (17-গরাম) ডোজ নিন। পৰ্তিবার 8 আউন্স তরলের সাথে 1টি ডোজ মেশান। আপনি সকালের নাস্তা, দুপুরের খাবার এবং রাতের খাবারের সময় 1 ডোজ নিতে পারেন।
- একটি সম্পূর্ণ তরল খাবার খান। একটি সম্পূর্ণ তরল খাবারে, আপনি নিম্নলিখিতগুলি খেতে বা পান করতে পারবেন:
 - দই (কোনো ফলের টুকরো ছাড়া)।
 - শাস না থাকা ফলের রস।
 - সোডা।
 - বরখ বা কিৰ্প সুয়্প যা এমনভাবে ছাঁকা হয়েছে যে তাতে কোনো শাকসবজির টুকরো নেই।
 - পুষ্টিকর সাপিলমেন্ট।
 - আইসকিরম এবং ফরুট আইস। এগুলোর মধ্যে কোনো ফলের টুকরো, বাদাম, ফাজ বা পিনাট বাটার মেশানো যাবে না।

আপনার কোলোনোস্কাপির 1 দিন আগে

আপনার MiraLAX অন্তের পৰ্স্তুতি পৰ্স্তুত রাখুন

আপনার পৰ্কিরয়ার আগের দিন সকালে, 238 গরাম MiraLAX পাউডারের পুরোটা 64 আউন্স সব্ভাবিক তাপমাত্রার সব্চ্ছ তরলে সাথে মেশান যতক্ষণ পযৰ্ন্ত না MiraLAX পাউডারটা পুরো মিশে যায়।

একবার MiraLAX পাউডার মিশে গেলে, আপনি মিশৰ্ণটি রেফিৰ্জারেটে

রেখে দিতে পারেন। এটি ঐচ্ছিক।

আপনার পর্কিরয়ার আগের দিন সকালের আগে MiraLAX পাউডার মেশাবেন না।

পরে একটি সব্চ্ছ তরল খাবার খান

আপনার পর্কিরয়াটির আগের দিন আপনাকে একটি সব্চ্ছ তরল খাবার খেতে হবে। সব্চ্ছ একটি তরল খাবারের মধ্যে শূধুমাতর্ এমন তরল থাকে যা আপনি দেখতে পারেন। আপনি “সব্চ্ছ তরল খাবার” বিষয়ক টেবিলে উদাহরণ দেখতে পারেন।

আপনি যখন সব্চ্ছ কোনো তরল খাবারের মধ্যে থাকেন:

- কোনো শক্ত খাবার খাবেন না।
- লাল, বেগুনী বা কমলা রঙের কিছু পান করবেন না।
- জেগে থাকাকালীন পর্তি ঘণ্টায় অন্তত 1 (৪-আউন্স) কাপ তরল পান করার চেষ্টা করুন।
- বিভিন্ন ধরনের সব্চ্ছ তরল পান করুন। শূধুমাতর্ পানি, কফি ও চা পান করবেন না। আপনি পযর্প্ত কয্যালোরি গর্হণ করছেন কিনা তা এটি নিশ্চিত করতে সহায়তা করে এবং এটি আপনার কোলনোস্কাপি পর্স্তুতির একটি গুরুতব্পূর্ অংশ।
- আপনার ডায়াবেটিস থাকলে, আপনার শূধুমাতর্ সুগার ফর্ী সব্চ্ছ তরল পান করতে এবং মাঝেমাঝেই ব্লাড সুগার লেভেল পরীক্শা করতে হবে। আপনার কোনো পরশ্ন থাকলে, আপনার সব্স্থয্সেবা পর্দানকারীর সাথে কথা বলুন।

সব্চ্ছ তরল পানীয়

	খাওয়া যাবে	খাওয়া যাবে না
সু্যপ	<ul style="list-style-type: none"> • সব্চ্ছ বর্খ, বুলন বা কনসোমি। 	<ul style="list-style-type: none"> • শুকনো খাবার বা মশলার ফোড়ন দেওয়া যেকোনো কিছু।
মিষ্টি	<ul style="list-style-type: none"> • জিলেটিন, যেমন- Jell-O®। • সুসব্দু বর্ফ। • শক্ত কয়্ন্ডি, যেমন- Life Savers® এবং lemon drops (লেমন ডর্পস)। 	<ul style="list-style-type: none"> • লাল, বেগুনী বা কমলা রঙের যেকোনো কিছু। • অনয্ন্সকল মিষ্টি।
পানীয়সমূহ	<ul style="list-style-type: none"> • লেমোনেড, আপেল, সাদা করয্ন্বেরি এবং সাদা আঙুরের জুসের মতো সব্চ্ছ জুস। • আদা মিশির্ত পানীয়, 7-Up®, Sprite® বা সেল্টিজারে মতো সোডা। • Gatorade® ও Powerade® এর মতো সেপ্টির্স ডির্ঙ্কস। • দুধ বা কির্মার ছাড়া কফি। • দুধ বা কির্মার ছাড়া চা। • কাবর্নেটেড (ফিজি) এবং সুসব্দু পানি এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। 	<ul style="list-style-type: none"> • লাল, বেগুনী বা কমলা রঙের যেকোনো কিছু। এর মধ্যে রয়েছে লাল, বেগুনী রঙের কমলার জুস, সোডা, এবং সেপ্টির্স ডির্ঙ্কস। • শাস থাকা জুস। • নেক্টির্। • স্মুদি বা শেক। • দুধ, কির্ম ও অনয্ন্স দুগ্ধজাত পণয্। • বাদাম দুধ, উদিভদ দুধ, নন-ডেইরি কির্মার এবং অনয্ন্স দুগ্ধজাত বিকল্। • অয্লকোহলযুক্ত পানীয়।

আপনার পর্কিরয্যার সময়টি নোট করুন

আপনার পর্কিরয্যার আগের দিন দুপুরের (দুপুর 12টা) পরে ভতির্ সংকর্ন্ত অফিসের একজন কমর্ী সদসয্ আপনাকে কল করবেন। যদি আপনার পর্কিরয্যা সোমবারে নিধর্রিত হয় তাহলে তারা আপনাকে

আগের শুকরবারে কল করবেন।

পরকির্যার জনয় আপনাকে কখন হাসপাতালে আসতে হবে তা কমরী আপনাকে জানাবেন। কোথায় যেতে হবে সেটিও তারা আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেবেন। আপনি কোনো কল না পেলে, আপনার ডাক্তারের অফিসে কল করুন।

যদি আপনার পরকির্যা বাতিল করতে হয়, তাহলে GI সময়সূচী নিধর্রণের অফিসে 212-639-5020 নমব্রে কল করুন।

আপনার পেট পরিষ্কার করার পরকির্যা শুরু করুন

ধাপ 1: আপনার পরকির্যার আগের দিন বিকেল 4টা, এক গ্লাস জল দিয়ে 2টি বিসাকোডিল (bisacodyl) (5mg) ট্যাবলেট গিলে খান।

ধাপ 2: বিকেল 4:15-এ, MiraLAX মিশরণটি পান করা শুরু করুন।

1. বিকেল 4:15-তে, মিশরণটির 1 (8-আউন্স) কাপ পান করুন।
2. বিকেল 4:30-এ, মিশরণটির 1 (8-আউন্স) কাপ পান করুন।
3. বিকেল 4:45-এ, মিশরণটির 1 (8-আউন্স) কাপ পান করুন।
4. বিকেল 5টা, মিশরণটির 1 (8-আউন্স) কাপ পান করুন।

আপনি মিশরণের মোট 4 গ্লাস পান করবেন।

- আপনি যখন শেষ করবেন, তখন MiraLAX মিশরণের অধের্ক পড়ে থাকবে। আপনি MiraLAX মিশরণের দিব্তীয়াধর্ পান করার সময় আপনার নিধর্রিত আগমনের সময়সূচির উপর নিভর্র করবে। ধাপ 3-এর নিদের্শাবলী অনুসরণ করুন।
- পর্থম ডোজটি নেওয়ার 1 ঘণ্টার মধ্যে সাধারণত মলতয়্যার

পর্যক্রম শুরু হয়, কিন্তু কারোর কারোর ক্ষেত্রে বেশি সময়ও লাগতে পারে।

- MiraLAX-এর প্রথম ডোজটি পান করার পরে আপনার মলত্যাগের পর্যক্রম শুরু না হলেও চিন্তা করবেন না। তরল পান করা বজায় রাখুন এবং নির্দেশনা অনুসারে MiraLAX এর দ্বিতীয় ডোজটি শুরু করুন।
- প্রতিবার মলত্যাগের পরে আপনার মলদ্বারের আশেপাশের চামড়ায় পেটেরলিয়াম জেলি (Vaseline®) বা A & D® মলম লাগান। এটি অস্বস্তি রোধ করতে সহায়তা করে।
- হাইড্রেটেড থাকতে কর্মগত সবচেঁ পানীয় পান পান করা বজায় রাখুন এবং আপনার কোলন পরিষ্কার করে ফেলুন।

ধাপ 3 (আপনার পর্যক্রমের জন্য যদি আপনাকে সকাল 11টার আগে আসতে বলা হয়):

আপনার পর্যক্রমের জন্য যদি আপনাকে সকাল 11টার আগে আসতে বলা হয় তাহলে আপনার পর্যক্রমের আগের দিন রাতে এই নির্দেশাবলী অনুসরণ করুন:

রাত 11টায় p.m., এক গ্লাস জল দিয়ে 2টি বিসাকোডিল (bisacodyl) ট্যাবলেট গিলে খান। তারপর, MiraLAX মিশ্রণের দ্বিতীয় অংশটি পান করা শুরু করুন।

1. বিকেল 11:15-তে, মিশ্রণটির 1 (8-আউন্স) কাপ পান করুন।
2. বিকেল 11:30-এ, মিশ্রণটির 1 (8-আউন্স) কাপ পান করুন।
3. বিকেল 11:45-এ, মিশ্রণটির 1 (8-আউন্স) কাপ পান করুন।

4. রাত 12টায় (মাঝরাত), মিশরুণটির 1 (8-আউন্স) কাপ পান করুন।

নিশ্চিতভাবে MiraLAX মিশরুণের পুরোটা শেষ করুন।

- আপনার পরবেশের সময়ের 4 ঘণ্টা আগে পযরন্ত আপনি কর্মাগত সব্চ্ছ তরলগুলি পান করে যেতে পারেন।
- আপনার পর্কিরয়া শেষ না হওয়া পযরন্ত কিছু খাবেন না।

আপনার কোলনস্কাপির দিন

ধাপ 3 (আপনার পর্কিরয়ার জনয্ যদি আপনাকে সকাল 11টা বা তার পরে আসতে বলা হয়):

আপনার পর্কিরয়ার জনয্ যদি আপনাকে সকাল 11 টা বা তার পরে আসতে বলা হয় তাহলে আপনার পর্কিরয়ার দিন সকালে এই নিদের্শাবলী অনুসরণ করুন:

সকাল 6-টায়, এক গ্লাস জল দিয়ে 2টি বিসাকোডিল ট্যাবলেট গিলে খান। তারপর, MiraLAX মিশরুণের দিব্তীয় অংশটি পান করা শুরু করুন।

1. সকাল 6:15-এ, মিশরুণটির 1 (8-আউন্স) গ্লাস পান করুন।
2. সকাল 6:30-এ, মিশরুণটির 1 (8-আউন্স) গ্লাস পান করুন।
3. সকাল 6:45-এ, মিশরুণটির 1 (8-আউন্স) গ্লাস পান করুন।
4. সকাল 7-টায় মিশরুণটির 1 (8-আউন্স) গ্লাস পান করুন।

নিশ্চিতভাবে MiraLAX মিশরুণের পুরোটা শেষ করুন।

- আপনার পরবেশের সময়ের 4 ঘণ্টা আগে পযরন্ত আপনি কর্মাগত সব্চ্ছ তরলগুলি পান করে যেতে পারেন।

- আপনার পরিকর্যা শেষ না হওয়া পযরন্ত কিছু খাবেন না।

যে জিনিসগুলি মনে রাখতে হবে

- আপনার পরিকরয়ার দিন সকালে আপনাকে যে ওষুধগুলি খেতে বলা হয়েছে শুধু সেগুলিই খান। কয়েক চুমুক জল দিয়ে সেগুলি খান।
- আপনার বুকো বা হাতে কোনো লোশন, কির্ম বা পাউডার লাগাবেন না।
- শরীরে ফুটো করে পরা গহনা সহ যেকোনো গহনা খুলে ফেলুন।
- কেৰ্ডিট কাডর্ এবং গহনার মতো সমস্ত মূলয্বান বস্তু বাড়িতে রেখে যান। আপনার মূলয্বান জিনিসপতর্ সংরক্ষণ করার মতো লকার আমাদের নেই।
- আপনি যদি কন্ট্যাক্ট লেন্স পরেন তাহলে তার পরিবতের্ চশমা পরুন।

কী আনতে হবে

- আপনার ওয়ালেট কাডর্, যদি আপনার একটি AICD থাকে এবং আপনার কাডর্টি ইতোমধ্যেই হাসপাতালের ফাইলে না থাকে।
- আপনার যদি কোনো রেসকিউ ইনহেলার (যেমন- হাঁপানির জনয্ আলবুটেরল) থাকে তাহলে সেটি।
- আপনার চশমা বা দাঁতের কেস, যদি আপনি সেগুলি পরেন।
- আপনার হেলথ কেয়ার পরকিস্ ফরম, যদি আপনি পূরণ করে থাকেন।

কোথায় যাবেন

আপনার পরিকর্যাটি এই কেন্দর্গুলির যেকোনো একটিতে হবে:

- মেমোরিয়াল হাসপাতাল (MSK-এর মূল হাসপাতাল)-এ এনেডাস্কাপি সুয়র্ট

1275 York Avenue (ইস্ট 67তম এবং ইস্ট 68তম সিটরটের মধ্যে)
নিউ ইয়র্ক, NY 10065

2য় তলায় যেতে B লিফট ব্যবহার করুন। ডানে বাঁক নিন এবং কাঁচের
দরজা ঠেলে সাজরারি অয়ান্ড পের্সিডুরাল সেন্টারে ঢুকুন।

□ David H. Koch Center

530 East 74th St.

New York, NY 10021

লিফট ব্যবহার করে 8ম তলায় যান।

□ MSK মনমাউথ

480 রেডহিল রোড মিডলটাউন

মিডলটাউন, NJ 07748

এই স্থানের পাকিরং সম্পকিত তথ্যের জন্য www.msk.org/parking
ভিজিট করুন।

কী আশা করতে পারেন

অনেক কমরী আপনাকে আপনার নাম এবং জন্ম তারিখ বলতে ও বানান
করতে বলবেন। এটি আপনার নিরাপত্তার জন্য। একই নামের বা অনুরূপ
নামের ব্যক্তিবর্গের সেই একই দিনে পরিকর্যা থাকতে পারে।

আপনার পরিকরয়ার জন্য আপনার যখন পোশাক পরিবর্তন করার সময়
আসবে তখন আপনি পরার জন্য একটি হসপিটাল গাউন, রোব এবং পিছল-
নিরোধী মোজা পাবেন।

আপনার পরিকরয়ার আগে আপনার ডাক্তারের সাথে আপনি দেখা
করবেন। তারা আপনাকে পরিকর্যাটি ব্যখ্যা করবেন এবং আপনার
কোনো প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দেবেন।

আপনি আপনার অ্যানেসিথওলজিস্টের সাথে দেখা করবেন। তারা আপনার চিকিৎসা সম্পর্কিত ইতিহাস আপনার সাথে পর্যালোচনা করবেন এবং আপনাকে কি ধরনের অ্যানেসিথসিয়া (আপনাকে ঘুম পাড়ানোর ওষুধ) দেওয়া হবে সে সম্পর্কে আপনার সাথে কথা বলবেন।

আপনার কোলনস্কাপির সময় হলে একজন কমরী আপনাকে পরিক্রিয়া কক্ষে নিয়ে আসবেন। আপনি পা ভাঁজ করে বাঁপাশ ফিরে শোবেন।

একজন স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী একটি শিরায় একটি ইন্টারভেনাস (IV) লাগাবেন, সাধারণত আপনার বাহুতে বা হাতে। আপনাকে আপনার IV এর মাধ্যমে অ্যানেসিথসিয়া দেওয়া হবে, যা আপনাকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। আপনি ঘুমিয়ে পড়ার পরে, আপনার ডাক্তার পরিক্রিয়াটি আরম্ভ করবেন।

আপনার ডাক্তার আপনার মলদ্বারে একটি কোলনস্কাপ ঢোকাবেন। কোলনস্কাপটি একটি ভিডিও মনিটরের সাথে সংযুক্ত থাকে। এটি আপনার ডাক্তারকে আপনার কোলনের ভিতরটা দেখার সুযোগ দেয়। অস্বাভাবিক কিছু আছে কিনা তা ভিডিও মনিটরের দেখার সময় আপনার ডাক্তার আপনার কোলনের মধ্যে কোলনস্কাপটিকে নাড়াচাড়া করানোর জন্য বাতাস এবং তরল ব্যবহার করবেন।

পরিক্রিয়াটি সম্পূর্ণ করতে সাধারণত 60 মিনিট (1 ঘণ্টা) লাগে।

পর্যায়িত জিজ্ঞাসিত প্রশ্নাবলী (FAQs)

আমি পেট পরিষ্কারের মিশ্রণটা খাচ্ছি এবং সেটি শেষ হওয়ার আগেই আমার নরম, জলের মতো, মল বেরনো শুরু হয়েছে। তাও কি আমাকে পেট পরিষ্কারের মিশ্রণটা পান করে যেতে হবে?

হঁয়া। একটি নিরাপদ এবং সম্পূর্ণ কোলনস্কাপিংর জন্য আপনার কোলন পুরোপুরি পরিষ্কার করতে আপনাকে অবশ্যই পুরো পেট পরিষ্কারের মিশ্রণটা পান করতে হবে।

পেট পরিষ্কারের মিশ্রণটা পান করার পরে আমার শরীর মোচড় দিচ্ছে (গা গোলানো) বা মনে হচ্ছে সব বেরিয়ে আসবে (বমি)। আমার কী করা উচিত?

পেট পরিষ্কারের মিশ্রণ পান করার পরে অনেক লোকের গা গোলায়। এ বিষয়ে সহায়তা করতে, আপনার পছন্দের পানীয়ের সাথে MiraLAX পাউডারটি মেশাতে পারেন।

আপনার যদি মনে হয় যে বমি হয়ে যাবে, তাহলে আপনার আস্তে আস্তে পান করা উচিত, এবং পান করার মধ্যে একটু বিরতি দেওয়া উচিত। অথবা আপনার পেট খালি হওয়ার সময় দিতে আপনাকে 30 থেকে 45 মিনিট তরলটা পান করা বন্ধ করতে হবে। আপনি যদি এটি ঠাণ্ডা অবস্থায় খেতে পছন্দ করেন তাহলে আপনি বিরতিকালীন সময় এই পেট পরিষ্কারের মিশ্রণটিকে ফির্জে রাখতে পারেন। বিরতির পরে, পেট পরিষ্কারের মিশ্রণটা আস্তে আস্তে পান করার চেষ্টা করুন। আপনার কাছে থাকলে একটি স্টর্ বয়বহার করুন।

আপনি বমি হয়ে গেলে, একটি 30 থেকে 45 মিনিটের বিরতি নিন। বাড়িতে গা-গোলানো বন্ধ করার ওষুধ থাকলে, পেট পরিষ্কারের মিশ্রণটা আপনার পান করা শুরু করার আগে আপনি সেটির 1টি ডোজ খেতে পারেন। হাইড্রেটেড থাকার জন্য আপনি আপনার পছন্দের যে কোনো সব্চ্ছ তরল পান করতে পারেন। একটি নিরাপদ এবং সম্পূর্ণ কোলনস্কাপিংর জন্য আপনার কোলন পুরোপুরি পরিষ্কার করতে পেট পরিষ্কারের মিশ্রণটা পুরোটা পান করা জরুরি।

আপনার কোলনস্কাপির পরে

আপনার নাসর্ কর্মাগত আপনার হাটর্, শব্বসপর্শব্বস এবং রক্কতচাপ মনিটর্ করে যাবেন। একটি কোলনস্কাপির পরে অনেকের মনে হয় পেট ফুলে উঠেছে অথবা পেটে খিঁচ ধরে। এটি সব্ব্ভাবিক এবং পেট থেকে গয্বাস বেরিয়ে এটা ঠিক হয়ে যায়।

আপনি পুরোপুরি জেগে ওঠার পরে, আপনার নাসর্ আপনার IV খুলে দেবেন। আপনার জনয্ কেউ অপেক্ষা করলে, আপনি বাড়ি যাওয়ার আগে আপনার নাসর্ আপনাদের দুজনকেই ডিসচাজেরর্ নিদের্শাবলী বুঝিয়ে বলে দেবেন।

বাড়িতে

- ডিসচাজর্ হয়ে আসার পর থেকে আপনি হালকা খাবার খাওয়া শুরু করতে পারেন। পর্থমে তেল মশলাযুক্কত এবং ভাজা খাবার এড়িয়ে চলুন। ধীরে ধীরে সব্ব্ভাবিক খাদয্ব্ভাসে ফিরে আসুন। আপনার ডাক্তার কোনো নিদির্ষ্ট সময়কালের জনয্ আপনার খাবার সীমিত করতে চাইলে, তারা আপনাকে তা বলে দেবেন।
- আপনার পর্কিরয্বার পরে 24 ঘণ্টা কোনো অয্ব্ভালকোহলযুক্কত পানীয় পান করবেন না।
- আপনার পর্কিরয্বার 24 ঘণ্টা পরে আপনি আপনার সব্ব্ভাবিক কাযর্কলাপে ফিরে যেতে পারবেন।

আপনার একটি বায়োপসি হয়ে থাকলে, আপনার মলদব্বার থেকে সামানয্ রক্কতক্ক্ষরণ হতে পারে। কয়েক ফোঁটার বেশি রক্কতক্ক্ষরণ হবে না।

আপনার পর্কিরয্বাটির 24 ঘণ্টা পরে রক্কতক্ক্ষরণটি বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিৎ।

একটি কোলনস্কাপির পরে, আপনার মলত্যাগ অনিয়মিত বা সাধারণ অভ্যাসের থেকে অনিয়মিত হওয়াটাই সর্বাধিক। আপনার পরিকল্পনার পরের এক সপ্তাহ পর্যন্ত এটা থাকতে পারে।

আপনার সর্বাধিকসেবা পরদানকারীকে যখন ফোন করবেন

আপনার নিম্নলিখিত কোনো সমস্যা হলে আপনার সর্বাধিকসেবা পরদানকারীকে ফোন করুন:

- 101 °ফা (38.3 °সে) বা তার বেশি জ্বর।
- পেটে মারাত্মক যন্ত্রণা বা পেট ফাঁপা।
- 24 ঘণ্টার বেশি সময় ধরে মলদ্বার থেকে রক্তক্ষরণ।
- মলের সাথে রক্তপাত।
- দুর্বলতা, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া বা বমিভাব।
- আপনার মলদ্বার দিয়ে খুব বেশি রক্তক্ষরণ।

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

আরো রিসোর্সের জন্য www.mskcc.org/pe-এ ভিজিট করে আমাদের ভার্চুয়াল লাইব্রেরি দেখুন।

How To Prepare for Your Colonoscopy Using MiraLAX® - Last updated on June 9, 2025

Memorial Sloan Kettering Cancer Center কতর্ক সবর্সব্তব্ সংর্কিষত