



রোগী এবং শূশরুযাকারীর শিক্কা

ফলুরোউরাসিল (৫-এফইউ) চোখের ডর্প কীভাবে বয্বহার করবেন

এই তথয্টি বয্খয্ করে কীভাবে ফলুরোউরাসিল (ফেলার-ও-ইউর-আ-সিল) চোখের ডর্প বয্বহার করতে হয়। ফলুরোরাসিল আই ডর্পকে পরায়ই ৫-এফইউ আই ডর্প বলা হয়।

৫-এফইউ চোখের ডর্প সম্পকের্

৫-এফইউ চোখের ডর্প একটি কেমোথেরাপি (কেমো) ওষুধ, যা নিওপ্লাজিয়া (নিও-পেল-ঝুহস) চিকিৎসায় বয্বহৃত হয়। নিওপ্লাজিয়া হলো চোখের ভেতরের অসব্ভাবিক (সব্ভাবিক নয়) কোষ। ৫-এফইউ চোখের ডর্প চোখের আশপাশের দাগযুক্টি টিসুয্ (স্কার টিসুয্) সারাতে বয্বহার করা যেতে পারে।

আপনার সব্স্থয্সেবা পরদানকারী ৫-এফইউ চোখের ডর্প এবং এরিথের্মাইসিন (এরিথ-রো-মাই-সিন) মলম বয্বহারে নিদের্শনা দিবেন। এই মলমটি ৫-এফইউ ডর্প থেকে আপনার তব্কে সুরক্কা দেয্ এবং আপনার চোখের জনয্ নিরাপদ।

কিছু মানুষের ইরিথের্মাইসিন মলমে অয্লাজির্ থাকতে পারে। এর পরিবতের্, আপনার সব্স্থয্সেবা পরদানকারী টোবর্ডেকস্® (টোবর্মাইসিন ও ডেকসামেথাসোনের মিশর্গ) মলম বয্বহারে নিদের্শনা দিবেন।

আপনি এগুলি এখান থেকে নিতে পারেন:

৫৩তম সিটর্টে অবসিথত রকফেলার পয্ভিলিয্ন।

১৬০ ই. ৫৩তম সিটর্ট, তৃতীয় তলা ফামেরসি


নিউ ইয্কর্, এনওয়াই ১০০২২

সোমবার থেকে শুরুর্, সকাল ৯টা থেকে বিকেল ৫:৪৫টা

৬৪৬-৮৮৮-০৭৩১

৫-এফইউ চোখের ডর্প বয্বহার করার ধাপসমূহ

1. আপনার হাত পরিষ্কার করুন। মলম ব্যবহার করার আগে নিশ্চিত করুন যে হাত শুকনো।
2. আপনি যে চোখের চিকিৎসা নিচ্ছেন, সেই চোখের নিচের তব্কে হালকা করে মলম লাগিয়ে রাখুন (চিত্র ১ দেখুন)। এটি আপনার চোখে লাগাবেন না।
3. আকরান্ত চোখে একটি ৫-এফইউ ফোঁটা দিন।
4. যদি অতিরিক্ত ফোঁটা পড়ে যায়, তা পরিষ্কার টিসুয় দিয়ে মুছে ফেলুন। এরপর টিসুয়টি ফেলে দিন।
5. আবার আপনার হাত পরিষ্কার করুন।



চিত্র 1. মলম যেখানে লাগাবেন

৫-এফইউ চোখের ড্রপ এবং এরিথের্মাইসিন বা টোব্রাডেক্স দিনে ৪ বার ব্যবহার করুন। চেষ্টা করুন এগুলো সমান সময় অন্তর ব্যবহার করতে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি এগুলো ব্যবহার করতে পারেন পরাতঃরাশ, মধ্যাহ্নভোজ, রাতের খাবার এবং ঘুমানোর আগে।

পরতিদিনের শেষে, আপনার ব্যবহার করা পুরনো ৫-এফইউ চোখের ড্রপের বোতলটি ফেলে দিন। ৭ দিন ধরে পরতিদিন একটি নতুন বোতল ব্যবহার করুন।

৫-এফইউ চোখের ড্রপের পাশবর্পর্তিকির্যা

৫-এফইউ চোখের ড্রপ ব্যবহার করার পরে আপনার চোখে জ্বালা অনুভূত হতে পারে (উদাহরণস্বরূপ লাল হওয়া, চুলকানো বা পোড়া অনুভূতি) অথবা চোখ শুষ্ক লাগতে পারে। যদি এমন হয়, তবে ওভার-দয়-কাউন্টার লুব্রিকেন্ট (পুনরায় ভেজা) চোখের ড্রপ ব্যবহার করুন, যেমন রিফেরশ®, জেনেটল®, বা সিস্টেন®। এগুলো কিনতে আপনার পেরস্কির্পশন পরয়োজন নেই।

৫-এফইউ ড্রপ চোখে দেওয়ার ১০ মিনিট পরে লুবিরকেন্‌ট আই ড্রপ ব্যবহার করুন। যদি আপনি লুবিরকেন্‌ট ড্রপগুলো আগে ব্যবহার করেন, তবে ৫-এফইউ ড্রপগুলো ততটা কার্যকর হবে না।

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে যখন ফোন করবেন

আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীকে কল করুন, যদি আপনার:

- চোখের চারপাশে ফুসকুড়ি দেখা দেয়।
- চোখে তীব্র (খুব তীব্র) ব্যথা বা জ্বালাপোড়া অনুভূত হয়।
- দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আসে।

নিকটতম জরুরি সেবা কক্ষে যান যদি আপনার:

- শ্বাসকষ্ট হয়।
- চোখের আশেপাশে তীব্র ফোলা দেখা দেয়।
- দৃষ্টিতে অনেক বেশি পরিবর্তন দেখা দেয়।
- আপনার হার্ট বিট বেড়ে গেছে মনে হয়। এটি বিরল।

আপনার কোনো প্রশ্ন বা উদ্বেগ থাকলে আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সাথে যোগাযোগ করুন। আপনার পরিচর্যা দলের একজন সদস্য সোমবার থেকে শুরুরবার পর্যন্ত উত্তর দেবেন সকাল ৯:০০ টা থেকে বিকেল ৫:০০ টার পর এই সময়ের বাইরে, আপনি একটি বাতর্ রেখে যেতে পারেন বা অন্য একজন MSK প্রদানকারীর সাথে কথা বলতে পারেন। কলে সর্বা একজন ডাক্তার বা নাসরকে পাবেন। আপনি যদি আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারীর সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করবেন তা নিশ্চিত না হন, তাহলে ফোন করুন। ২১২-৬৩৯-২০০০.

আরো রিসোর্সের জন্য www.mskcc.org/pe-এ ভিজিট করে আমাদের ভার্চুয়াল লাইবেরি দেখুন।

How To Use Fluorouracil (5-FU) Eyedrops - Last updated on January 9, 2026

Memorial Sloan Kettering Cancer Center কত্বক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত