



রোগী এবং শূশরুযাকারীর শিক্ষা

# ইনসুলিন পেন কীভাবে বয্‌বহার করবেন


এই তথয্‌টিতে ইনসুলিন পেন বয্‌বহার করে কীভাবে ইনসুলিন ইনজেকশন (শট) দিতে হয় তা বণরনা করা হয়েছে। এছাড়াও এতে ডিসপোজেবল ইনসুলিন পেন কীভাবে সংরক্ষণ ও যত্ন নিতে হয় তা বণরনা করা হয়েছে। ডিসপোজেবল ইনসুলিন পেন হলো এমন একটি ইনসুলিন পেন যা খালি হয়ে গেলে বা নিদির্ষ্ট সংখয্‌ক দিন বয্‌বহার করার পর ফেলে দিতে হয়।

যদি আপনি ইনসুলিন পেন বয্‌বহার করেন:

- নিশ্চিত করুন যে আপনি যে ইনসুলিন ওষুধটি বয্‌বহার করছেন তার সঠিক নাম আপনি জানেন। সবসময্‌ আপনার সকল সবাস্থয্‌সেবা পরদানকারীকে এর সঠিক নাম জানান।
- নিশ্চিত করুন যে আপনি ঘন ইনসুলিন (অল্প পরিমাণ তরলে বেশি পরিমাণ ইনসুলিনযুক্ত ওষুধ) বয্‌বহার করছেন কিনা তা আপনি জানেন। আপনার যদি বেশি মাত্রায় (পরিমাণে) ইনসুলিনের পরয্‌য়োজন হয়, তাহলে আপনি ঘন ইনসুলিন বয্‌বহার করে থাকতে পারেন।
- কখনও সিরিঞ্জ বয্‌বহার করে ইনসুলিন পেন থেকে ইনসুলিন বের করবেন না, বিশেষ করে যদি ইনসুলিনটি ঘন হয়। এভাবে করলে ভুল মাত্রার (ডোজের) ইনসুলিন নেওয়া হতে পারে, যা খুবই বিপজ্‌জনক হতে পারে।
- কখনও আপনার ইনসুলিন পেন অন্য কারও সাথে ভাগ করে বয্‌বহার করবেন না। এগুলো কেবলমাত্র একজন বয্‌কিত্র জনয্‌ই বয্‌বহারের উদ্দেশ্যে তৈরি। ইনসুলিন পেন ভাগ করে বয্‌বহার করলে সংকর্ষণ হতে পারে।

# ইনসুলিন পেন সম্পর্কে

ইনসুলিন পেন হলো একটি যন্ত্র যা ইনসুলিন ইনজেকশন দেওয়ার জন্য ব্যবহার করা হয়। ইনসুলিন পেন বিভিন্ন ধরনের রয়েছে। সব ধরনের পেনের মৌলিক অংশগুলো একই (চিত্র ১ দেখুন), তবে এতে বিভিন্ন ধরনের ওষুধ থাকে।




চিত্র ১. ইনসুলিন পেনের অংশসমূহ

- একটি পেনের ঢাকনা. এটি আপনি পেন ব্যবহার না করার সময় ইনসুলিনকে সুরক্ষিত রাখে।
- একটি রাবারের সিল. এটি সেই অংশ যেখানে পেনের সুচ পেনের মূল অংশের সাথে যুক্ত হয়।
- একটি ইনসুলিন সংরক্ষণাগার. এতে ইনসুলিন রাখা থাকে। এখানে একটি সবচ্ছ প্লাস্টিকের অংশ থাকে, যা দিয়ে আপনি সংরক্ষণাগারের ভেতরে থাকা ইনসুলিন দেখতে পারেন। এর সাহায্যে আপনি পেনে আনুমানিক কতটুকু ইনসুলিন বাকি আছে তা দেখতে পারেন।
- একটি লেবেল. এটি আপনাকে পেনটিতে থাকা ইনসুলিনের ধরন এবং মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ জানিয়ে দেয়।
- একটি ডোজ নিবরাচক. এর মাধ্যমে আপনি সঠিক ইনসুলিন ডোজ নিধারণ করতে পারেন।
- একটি ডোজ উইন্ডো. এটি নিবরাচিত ইনসুলিনের ইউনিট সংখ্যা দেখায়। ডোজ উইন্ডোর মাঝখানের সংখ্যার দিকে একটি তীর চিহ্ন নির্দেশ করে। এই পরিমাণ ইনসুলিন ইউনিট ইনজেকশন হিসেবে দেওয়া হবে।
- একটি ইনজেকশন বোতাম. ইনজেকশন দেওয়ার জন্য এটি নিচে চাপতে হয়।

# ইনসুলিন পেনের সুচ সম্পর্কে

পরতির নিজের ইনসুলিন ইনজেকশন দেওয়ার সময় নতুন ইনসুলিন পেনের সুচ ব্যবহার করুন। ইনসুলিন পেনের সুচের ৪টি প্রধান অংশ রয়েছে (চিত্র ২ দেখুন)।



চিত্র ২. ইনসুলিন পেনের সুচের অংশসমূহ

- একটি সুরক্ষামূলক ট্যাব. এটি সুঁচকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে। ইনসুলিন পেনের সাথে সুঁচ লাগানোর আগে আপনাকে এটি খুলে ফেলতে হবে।
- একটি বাইরের সুঁচের ঢাকনা. এটি ব্যবহারের আগে এবং পরে সুঁচটিকে ঢেকে রাখে।
- একটি ভেতরের সুঁচের ঢাকনা. এটি ব্যবহারের আগে সুঁচকে পরিষ্কার রাখতে সাহায্য করে।
- একটি সুঁচ. এভাবেই তব্বকের মধ্যে ইনজেকশন দেওয়া হয়।

## আপনার ইনসুলিন পেন কীভাবে সংরক্ষণ করবেন।

অতিরিক্ত গরম, ঠান্ডা বা সূর্যালোক আপনার পেনের ইনসুলিনকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে পারে। আপনার ইনসুলিন পেন সংরক্ষণ করতে নিচের নির্দেশনাগুলো অনুসরণ করুন।

- আপনার নতুন, অব্যবহৃত ইনসুলিন পেনগুলো রেফ্রিজারেটরের দরজায় রাখুন। এটি সেগুলোকে রেফ্রিজারেটরের পেছনের দিকে চলে যাওয়া থেকে রক্ষা করে, যেখানে সেগুলো জমে যেতে পারে।
- আপনি বর্তমানে যে ইনসুলিন পেন ব্যবহার করছেন, সেটি ঘরের তাপমাত্রায় (৮৬°ফারেনহাইট বা ৩০°সেলসিয়াসের-এর নিচে) রাখুন। আপনি একবার ইনসুলিন পেন ব্যবহার করার পর, সেটি আর কখনো রেফ্রিজারেটে ফিরিয়ে রাখবেন না।
- আপনার ইনসুলিন পেন কখনোই জমতে দেবেন না।
- গরম আবহাওয়ায় বাইরে গেলে আপনার ইনসুলিন পেন অতিরিক্ত গরম হতে দেবেন না। এটিকে

ঠান্ডা রাখতে একটি তাপ-নিরোধক ব্যাগ বা অনুরূপ কিছুতে বহন করুন।

- আপনি যদি কয়েক ঘণ্টার জন্য বাইরে থাকেন, তাহলে আপনার ইনসুলিন পেনের সাথে তাপ-নিরোধক ব্যাগে একটি ঠান্ডা পানির বোতল রাখুন। এটি কয়েক ঘণ্টা পর্যন্ত এটিকে অতিরিক্ত গরম হওয়া থেকে রক্ষা করবে।
- আপনি যদি আরও দীর্ঘ সময় বাইরে থাকেন, তাহলে আপনার ইনসুলিন পেনের সাথে তাপ-নিরোধক ব্যাগে একটি আইস প্যাক রাখতে পারেন। বরফের প্যাক বা ইনসুলিন পেনকে একটি তোয়ালে দিয়ে মুড়ে রাখুন যাতে তারা একে অপরের সংস্পর্শে না আসে। যদি পেনটি সরাসরি আইস প্যাকের সংস্পর্শে আসে, তাহলে ইনসুলিন জমে যেতে পারে।
- ব্যবহারের পর সবসময় ইনসুলিন পেনের ঢাকনাটি আবার লাগিয়ে দিন। এটি ইনসুলিনকে সূর্যালোক থেকে রক্ষা করে।

## আপনার ইনসুলিন পেন কখন ফেলে দিতে হবে।

আপনি একটি নির্দিষ্ট সংখ্যক দিন ধরে একই ইনসুলিন পেন বারবার ব্যবহার করবেন। আপনি যে ধরনের ইনসুলিন পেন ব্যবহার করছেন তার ওপর দিনগুলোর সংখ্যা নির্ভর করে। নিচের সারণিতে কিছু সাধারণ ধরনের ইনসুলিন পেন এবং প্রতিটি কত দিন ব্যবহার করা যায় তা উল্লেখ করা হয়েছে। আপনি আপনার ইনসুলিন পেনের সাথে যে নির্দেশনাগুলো আসে সেগুলোও পড়তে পারেন।

ইনসুলিনের ধরন।	ইনসুলিনের ঘনত্ব।	ইনসুলিনের কাযরকারিতা।	পেন ব্যবহারের দিনসংখ্যা।	ইনসুলিনের রং।
NovoLog® FlexPen®: অফসপাটর্।	১০০ ইউনিট/মিলিলিটার।	দ্রুত কাযরকর।	২৮ দিন।	মুছুন
Humalog® KwikPen®: লিসপেরা।	১০০ ইউনিট/মিলিলিটার।	দ্রুত কাযরকর।	২৮ দিন।	মুছুন
Lantus® SoloStar®: গ্লাজির্ন।	১০০ ইউনিট/মিলিলিটার।	দীঘর্ কাযরকর।	২৮ দিন।	মুছুন
Levemir® FlexTouch®: ডিটেমির্।	১০০ ইউনিট/মিলিলিটার।	দীঘর্ কাযরকর।	৪২ দিন।	মুছুন
Humulin®N KwikPen®: এনপিএইচ।	১০০ ইউনিট/মিলিলিটার।	মাঝারি কাযরকর।	১৪ দিন।	ঘোলা।

যখনই আপনি একটি নতুন ইনসুলিন পেন বয়বহার শুরু করবেন:

1. ইনসুলিন পেনটি আপনি কত দিন বয়বহার করতে পারবেন তা আগে থেকে গণনা করে নিন। যে দিন আপনি নতুন সেই পেনে পরথমবার পেন সূচ লাগান, সেই দিন থেকে গণনা শুরু করুন।
2. একটি কাগজের টেপে (যেমন মাসিকং টেপ) সেই তারিখ লিখে পেনের উপর লাগান। এটি আপনাকে সহজে দেখতে সাহায্য করবে কখন ইনসুলিন পেনটি ফেলে দিতে হবে এবং নতুন একটি বয়বহার শুরু করতে হবে। আপনার কাছে যদি কাগজের টেপ না থাকে, তাহলে একটি কাগজে তারিখ লিখে সেটি পেনের সাথে টেপ দিয়ে লাগান।
3. টেপ বা কাগজে লেখা তারিখে পৌঁছালে, ইনসুলিন পেনে এখনও ইনসুলিন বাকি থাকলেও সেটি ফেলে দিন। একটি নতুন ইনসুলিন পেন বয়বহার শুরু করুন।

উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি ১ জানুয়ারি একটি ল্যান্টাস সোলোস্টার ইনসুলিন পেন বয়বহার শুরু করেন<sup>st</sup>, ২৮ দিন এগিয়ে গণনা করুন ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত<sup>th</sup>। একটি কাগজের টেপে “২৮ জানুয়ারি” লিখে পেনের উপর সেই টেপটি লাগান। ২৮ জানুয়ারি পেনটি ফেলে দিন।<sup>th</sup>, এমনকি যদি এর মধ্যে তখনও ইনসুলিন থাকে।

আপনি অব্যবহৃত ইনসুলিন পেনগুলো পেনের লেবেলে উল্লেখিত মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখ পর্যন্ত রেফিরজারেটরে রাখতে পারেন। পেনের লেবেলে উল্লেখিত মেয়াদ শেষ হওয়ার তারিখে পৌঁছালে, ইনসুলিন পেনটি ফেলে দিন।

## কখন ইনসুলিন ইনজেকশন দিতে হবে।

- আপনি যদি দ্রুত কাযরকর (খাবারের সময়ের) ইনসুলিন বয়বহার করেন, তাহলে খাবার খাওয়ার ১৫ মিনিটের মধ্যে ইনজেকশন দিন। খাবার শুরুর ঠিক আগে এটি ইনজেকশন দেওয়া সবচেয়ে ভালো। এটি রক্তে শকররার মাত্রা কমে যাওয়া (লো ব্লাড সুগার) প্রতিরোধে সাহায্য করে।

বেশিরভাগ খাবারের সময়ের ইনসুলিন পর্যা ৪ ঘণ্টা কাযরকর থাকে। আপনার স্বাস্থ্যসেবা পরদানকারী না বললে, প্রতি ৪ ঘণ্টার কম সময়ের বয়বধানে খাবারের সময়ের ইনসুলিন ইনজেকশন দেবেন না। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি সকাল ৮টায় নাস্তা করেন, তাহলে পরবর্তী খাবারের সময়ের ইনসুলিনের ডোজ দুপুর ১২টা (মধ্যাহ্ন) বা তার পরে পর্যন্ত ইনজেকশন দেবেন না। খুব কাছাকাছি সময়ে ইনজেকশন ডোজ দিলে রক্তে শকররার মাত্রা কমে যেতে পারে, যা বিপজ্জনক হতে পারে।

- আপনি যদি দীঘল-কাযরকর ইনসুলিন বয়বহার করেন, তাহলে প্রতিদিন একই সময়ে এটি ইনজেক্ট করুন। আপনার স্বাস্থ্যসেবা পরদানকারীর নির্দেশাবলি মেনে চলুন।

- দরুত কাযরকর এবং দীঘর্ কাযরকর ইনসুলিন একসাথে বযবহার করা যেতে পারে

## কীভাবে ইনসুলিন ইনজেকশন (শট) দিতে হয়।



Please visit [www.mskcc.org/bn/cancer-care/patient-education/video/use-insulin-pen](http://www.mskcc.org/bn/cancer-care/patient-education/video/use-insulin-pen) to watch this video.

ইনসুলিন পেন বযবহার করার আগে সবসময় আপনার রকেত শকররার মাত্রা পরীক্ষা করুন। সাবান ও গরম পানি দিয়ে আপনার হাত পরিষ্কার করতে ভুলবেন না। এটি করতে, আপনার হাত ভিজিয়ে নিন এবং সাবান লাগান। ১৫ থেকে ২০ সেকেন্ড ধরে ভালোভাবে হাত ঘষুন, তারপর ধুয়ে ফেলুন। একটি কাগজের তোয়াল দিয়ে হাত শুকিয়ে নিন এবং একই তোয়াল বযবহার করে কল বন্ধ করুন।

আপনার রকেত শকররার মাত্রা জানার পর, আপনি বুঝতে পারবেন ইনসুলিন নেওয়া আপনার জন্য নিরাপদ কিনা এবং কোন মাত্রার ডোজ পরয়োজন। আপনার স্বাস্থ্যসেবা প্রদানকারী আপনাকে এই কাজগুলো কীভাবে করতে হয় তা শিখিয়ে দেবেন। তারা আপনাকে এটাও জানাবেন, প্রথমবার পেনে সূঁচ লাগানোর পর সেটি কতদিন বযবহার করা যাবে। তাদের নির্দেশাবলি অনুসরণ করুন।

ইনসুলিন পেনের লেবেল দেখে নিশ্চিত করুন যে সঠিক সময়ের জন্য আপনার কাছে সঠিক ইনসুলিন পেন রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, আপনি যদি খাবার খান, তাহলে নিশ্চিত করুন যে আপনার কাছে দরুত কাযরকর ইনসুলিন পেন রয়েছে।

## আপনার পরয়োজনীয় সরঞ্জামগুলো পরস্তুত করুন।

একবার জেনে গেলে আপনি কোন ইনসুলিন এবং কী ডোজে নিতে হবে, তখন একটি পরিষ্কার ও সমতল স্থানে আপনার পরয়োজনীয় সরঞ্জামগুলো সাজিয়ে নিন।

আপনার পরয়োজন হবে:

- ইনসুলিন পেন।
- একটি নতুন, অবয়বহৃত পেন সুচ।
- ২টি অ্যালকোহল ওয়াইপ।
- একটি পরিষ্কার টিসু।
- আপনার বাড়ির ধারালো বজরয়্ রাখার পাতর, যেমন কাপড় কাচার ডিটারজেন্টের একটি খালি বোতল। ধারালো বজরয়্ রাখার পাতর নিবরাচন সম্পকের জানতে, এই রিসোসের শেষে থাকা “আপনার বাড়ির শাপরস মেডিকেল সামগরী কীভাবে সংরক্ষণ ও নিষ্পতিত করবেন” পড়ুন।
- একটি ময়লার ডাস্টবিন।

## ইনসুলিন পেন পরস্তুত করুন।

1. ইনসুলিন পেনের ঢাকনাটি খুলে নিন (চিতর ৩ দেখুন)। পেনের ঢাকনাটি টেবিলে রাখুন।



চিতর 3. ইনসুলিন পেনের ঢাকনাটি টেনে খুলে নিন।


2. কিছু ধরনের ইনসুলিন সবচ্ছ (পরিষ্কার) হওয়ার জনয়্ তৈরি করা হয়। অনযানয়গুলো ঘোলা (মেঘলা) হওয়ার জনয়্ তৈরি করা হয়।

**সবচ্ছ ইনসুলিন:** যদি আপনার ইনসুলিন সবচ্ছ হওয়ার কথা থাকে, তাহলে নিশ্চিত করুন এটি সম্পূর্ণ সবচ্ছ আছে। এটি যদি রং পরিবর্তিত বা ঘোলা হয়, তাহলে ব্যবহার করবেন না। এটি ফেলে দিন এবং একটি নতুন ইনসুলিন পেন নিন।

**ঘোলা ইনসুলিন:** যদি আপনার ইনসুলিন ঘোলা হওয়ার কথা থাকে, তাহলে পেনটি হাতের তালুর মধ্যে আলতোভাবে ১০ বার ঘুরিয়ে মিশিয়ে নিন। তারপর পেনটি উপরে ও নিচে ১০ বার ঝাঁকিয়ে নিন। ইনসুলিনটি সমানভাবে সাদা ও ঘোলা দেখাবে এবং এতে কোনো দলা বা ভাসমান কণা থাকবে না। যদি আপনি এগুলো দেখেন, তাহলে মিশাতে থাকুন যতক্ষণ না সেগুলো আর দেখা যায়।

3. একটি অ্যালকোহল ওয়াইপ খুলে ইনসুলিন পেনের উপরের রাবারের সিলটি পরিষ্কার করুন। তারপর অ্যালকোহল ওয়াইপটি ময়লার ডাস্টবিনে ফেলে দিন।
4. নতুন পেন সুচটি সুরক্ষামূলক ট্যাঁবটি খুলে নিন (চিতর ৪ দেখুন)। ট্যাঁবটি ফেলে দিন।

5. পেন সুচটি ইনসুলিন পেনের উপরের অংশে লাগিয়ে দিন এবং যতক্ষণ না ঘোরা বন্ধ হয় ততক্ষণ ঘুরিয়ে টাইট করুন (চিত্র ৫ দেখুন)। পেন সুচটি পঁয়ঁচ দিয়ে লাগানোর সময় সোজা রেখে ঘুরিয়ে লাগাতে নিশ্চিত করুন।




চিত্র 5. পেন সুচটি ইনসুলিন পেনে ঘুরিয়ে লাগান।

6. সুচটি পেনে লাগানোর পর, বাইরের সূঁচের ঢাকনাটি খুলে ফেলুন (চিত্র ৬ দেখুন)। পরে ব্যবহার করার জন্য এটি টেবিলে রেখে দিন।



চিত্র 6. বাইরের সূঁচের ঢাকনাটি খুলে ফেলুন।

7. ভেতরের সূঁচের ঢাকনাটি খুলে ফেলুন (চিত্র ৭ দেখুন)। এটি ফেলে দিন।



চিত্র 7. ভেতরের সূঁচের ঢাকনাটি খুলে ফেলুন।

## নিরাপত্তা পরীক্ষা করুন (পেন পরস্তুত করে নিন)।

ইনসুলিন পেন পরীক্ষা করলে আপনি নিশ্চিত হতে পারবেন যে আপনার পেন এবং সুচ সঠিকভাবে কাজ করছে। এটি নিশ্চিত করতেও সাহায্য করবে যে সুচটি ইনসুলিনে পূর্ণ হচ্ছে, যাতে আপনি সম্পূর্ণ ডোজ পান। প্রতিটি ইনসুলিন ইনজেকশনের আগে নিরাপত্তা পরীক্ষা করা গুরুত্বপূর্ণ।

1. ইনসুলিনের নাম পড়তে পারেন এমনভাবে ইনসুলিন পেনটি ধরে রাখুন। ডোজ জানালাটি দেখুন। ডোজ সিলেক্টরটি সামনে ঘুরিয়ে ২ ইউনিটে সেট করুন (চিত্র ৮ দেখুন)। ডোজ জানালায় থাকা তীর চিহ্নটি আপনার পরয়োজনীয় সংখ্যার সাথে ঠিকভাবে মিলতে হবে। আপনি যদি বেশি ঘুরিয়ে ফেলেন, তাহলে সেটি আবার পেছনের দিকে ঘোরানো ঠিক আছে। আপনি যদি ২ ইউনিটের বেশি ডায়াল করেন, তাহলে ডোজ সিলেক্টরটি আবার ঘুরিয়ে ২ ইউনিটে ফিরিয়ে আনুন।



চিত্র ৮। ডোজ সিলেক্টর ঘুরান।

2. আপনার ইনসুলিন পেনটি এমনভাবে ধরুন যাতে সূঁচটি উপরের দিকে থাকে।
3. ইনজেকশন বোতামটি টেবিলের ওপর দৃঢ়ভাবে চাপ দিন অথবা আপনার বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপ দিন। সুইয়ের আগা থেকে ইনসুলিনের ফোঁটা বের হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য করুন।

যদি কোনো ইনসুলিন বের না হয়, তাহলে আবার ২ ইউনিটে ডায়াল করুন। ইনজেকশন বোতামটি দ্বিতীয়বার চাপ দিন।

যদি এখনো ইনসুলিন বের না হয়, তাহলে আবার ডোজ সিলেক্টর ২ ইউনিটে সেট করুন। ইনজেকশন বোতামটি তৃতীয়বার চাপ দিন।

যদি এখনো ইনসুলিন বের না হয়, তাহলে সূঁচে আবার বাইরের সূঁচের ঢাকনাটি লাগিয়ে দিন। সূঁচটি ইনসুলিন পেন থেকে ঘুরিয়ে খুলে ফেলুন এবং সেটি ধারালো বজেরয়র পাতের ফেলে দিন। ইনসুলিন পেনে একটি নতুন সুই লাগান এবং পেন পরাইম করার ধাপগুলো আবার করুন।

## ইনসুলিনের ডোজ সেট করুন।


পেন পরাইম করার পর ডোজ সিলেক্টরটি আবার শূন্যে ফিরে আসা উচিত। যদি তা না হয়, তাহলে ডোজ সিলেক্টরটি ঘুরিয়ে শূন্যে ফিরিয়ে আনুন।

পেনটি আপনার নিধরারিত ডোজে সেট করুন। তীর চিহ্নটি আপনি যে ডোজ ইনজেকশন দিচ্ছেন তার সাথে ঠিকভাবে মিলিয়ে আছে কিনা তা নিশ্চিত করুন। আপনি যদি পরয়োজনীয় ইউনিটের সংখ্যা পয়রন্ত ডায়াল করতে না পারেন, তাহলে সম্ভবত ইনসুলিন পেনটি পরায় খালি। এটি ফেলে দিন এবং একটি নতুন পেন নিন যাতে আপনি পুরো ডোজ একবারে ইনজেকশন দিতে পারেন। কখনোই পূর্ণ ডোজের চেয়ে কম ইনজেকশন দেবেন না বা ডোজকে দুই ভাগে ভাগ করে ইনজেকশন দেবেন না।

## ইনজেকশনের স্থান নিবর্চন করুন।

আপনার পেন পরস্তুত হয়ে গেলে, একটি ইনজেকশন সাইট নিবর্চন করুন। শেষবার যেখানে ইনসুলিন নিয়েছিলেন, একই জায়গায় বা কাটা দাগ, কষতচিহ্ন, কিংবা স্কেচ মাকের কাছাকাছি ইনজেকশন দেবেন না।

পরতিটি ইনজেকশন আগের ব্যবহৃত জায়গা থেকে অন্তত ২ ইঞ্চি (৫ সেন্টিমিটার) দূরে দিতে হবে। এটি ব্যথা এবং কষতচিহ্ন প্রতিরোধ করতে সাহায্য করে। একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণ করলে ইনজেকশন দেওয়ার স্থান পরিবর্তন (রোটেশন) করার কথা মনে রাখা সহজ হয় (চিত্র ৯ দেখুন)।



চিত্র ৯ ইনজেকশন দেওয়ার স্থানসমূহ

### উদাহরণস্বরূপ:

- আপনি দ্রুত (সবল্‌প-কাযর্কর) ইনসুলিন পেটের মধ্যে ইনজেকশন দিতে পারেন, তবে নাভি থেকে অন্তত ২ ইঞ্চি দূরে দিতে হবে।
- আপনি দীঘর্-কাযর্কর ইনসুলিন উরুর উপরের বাইরের অংশে ইনজেকশন দিতে পারেন। আপনার পায়ের সামনের অংশে বা পেশীতে ইনসুলিন ইনজেকশন দেওয়া এড়িয়ে চলুন।
- আপনি যদি এই জায়গাগুলো ব্যবহার করতে না পারেন, তবে কাউকে দিয়ে আপনার ওপরের বাহুর পিছনের অংশে ইনজেকশন করিয়ে নিন। নিজে নিজে আপনার বাহুর পিছনের অংশে ইনজেকশন দেওয়ার চেষ্টা করবেন না। সঠিক জায়গায় পৌঁছানো খুব কঠিন।

এই জায়গাগুলোর কোনো একটি ব্যবহার করলে নিশ্চিত হবে যে ইনসুলিন আপনার ত্বকের নিচের কলায় যাবে, পেশীতে নয়।

## ইনসুলিনের ডোজ ইনজেকশন দিন।

ইনজেকশন দেওয়ার স্থান নিবরাচন করার পর, অ্যালকোহল ওয়াইপ দিয়ে আলতোভাবে তব্ক পরিষ্কার করুন। ইনসুলিন ইনজেকশন দেওয়ার জন্য:

1. ইনসুলিন পেনটি আপনার মুঠির মধ্যে ধরুন এবং ইনজেকশন বোতামের উপর আপনার বৃদ্ধাঙুলি রাখুন (চিত্র ১০ দেখুন)। সূঁটি তব্কের মধ্যে পর্বশ করানোর আগে ইনজেকশন বোতামটি চাপ দেবেন না, সতকর্ থাকুন।



চিত্র ১০ ইনসুলিন পেন ধরে রাখা

2. ইনজেকশন দেওয়ার স্থানে আলতোভাবে আপনার তব্ক চিমটি দিন। একটি মসৃণ ও দরুত গতিতে পুরো সূঁটি আপনার তব্কের মধ্যে পর্বশ করান। এটি ৯০ ডিগ্রি কোণে (সোজা উপরে-নিচে) আছে কিনা নিশ্চিত করুন, হেলে রাখা যাবে না। আলতো চাপ দিন, যাতে পেনের মাথার চারপাশে আপনার তব্কে একটি ছোট গতের মতো দেবে যাওয়া অংশ দেখা যায়।
3. আপনার বৃদ্ধাঙুলি ইনসুলিন পেনের উপরের অংশে নিন। পেনটি স্থিরভাবে ধরে রাখুন এবং ইনজেকশন বোতামটি দৃঢ়ভাবে চাপ দিন। পেনটি আপনার শরীরের ভেতরে বেশি জোরে চাপ দেবেন না, সতকর্ থাকুন।
4. আপনি ১০ পযরন্ত গণনা করার পর, সূঁটি আপনার তব্ক থেকে সোজা করে বের করে নিন। ইনজেকশন দেওয়ার স্থানে যদি কোনো ফোঁটা দেখেন, তবে আঙুল বা টিসুয় দিয়ে জায়গাটি

আলতোভাবে চাপ দিন। ইনজেকশনের পর কখনোই ইনজেকশন দেওয়ার স্থান ঘষবেন না। এটি ইনসুলিনকে খুব দরুত কাজ করতে বাধা করতে পারে।

## ইনজেকশনের পর

সুইয়ের বাইরের বড় ঢাকনাটি আবার সুইয়ের উপর লাগিয়ে দিন। ইনসুলিন পেন থেকে সূঁচটি খুলে নিয়ে সেটি ধারালো বজেরয় পাতের ফেলে দিন। তারপর ইনসুলিন পেনের ঢাকনাটি আবার লাগান।

ইনসুলিন পেনটি ঘরের তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করুন (৮৬° ফারেনহাইট বা ৩০° সেলসিয়াসের নিচে)। এটিকে সরাসরি অতিরিক্ত তাপ বা ঠান্ডা এবং সরাসরি সূর্যালোক থেকে দূরে রাখুন।

## আপনার বাড়ির চিকিৎসা সংক্রান্ত ধারালো বজেরয় (শাপরস) কীভাবে সংরক্ষণ ও নিষ্পত্তি করবেন।

আপনার চিকিৎসা সংক্রান্ত ধারালো বজেরয় (ল্যানসেট এবং পেনের সূঁচ) সরাসরি ময়লার ডাস্টবিনে ফেলবেন না বা টয়লেটে ফ্লাশ করবেন না। সেগুলোকে একটি ধারালো বজেরয় রাখার পাতের রাখুন। আপনি একটি খালি, শক্ত, অসবচ্ছ (ভেতর দেখা যায় না এমন) প্লাস্টিকের পাত ব্যবহার করতে পারেন যার পঁয়চ দিয়ে আটকানোর ঢাকনা আছে, যেমন কাপড় কাচার ডিটারজেন্টের বোতল। শাপরস (ধারালো বজেরয়) কাঁচের বোতল, সোডার বোতল, দুধের জগ, অ্যালুমিনিয়ামের ক্যান, কফির ক্যান, অথবা কাগজ বা প্লাস্টিকের ব্যাগে সংরক্ষণ করবেন না। আরও তথ্যের জন্য পড়ুন। *আপনার বাড়ির চিকিৎসা সংক্রান্ত ধারালো বস্তু কীভাবে সংরক্ষণ এবং নিষ্পত্তি করবেন।* ([www.mskcc.org/bn/cancer-care/patient-education/how-store-and-dispose-your-home-medical-sharps](http://www.mskcc.org/bn/cancer-care/patient-education/how-store-and-dispose-your-home-medical-sharps)).

আপনার ধারালো বজেরয় পাতটি অধিকারের একটু বেশি পূর্ণ হলে ব্যবহার বন্ধ করুন। আরও ভালোভাবে মুখ বন্ধ করতে এবং চুইয়ে পড়া রোধ করতে ঢাকনা বা ক্যাপটি শক্ত টেপ দিয়ে মুড়িয়ে দিন। বোতলটিতে লেবেল লাগান গৃহস্থালির শাপরস: পুনর্ব্যবহারযোগ্য নয়।”

আপনি যদি নিউ ইয়র্ক সিটিতে থাকেন, তবে সংগ্রহের জন্য মুখবন্ধ পাতটি আপনার সাধারণ আবজর্নার সাথে রেখে দিতে পারেন। এটি পুনর্ব্যবহারযোগ্য বজেরয় সঙ্গে রাখবেন না। আপনি যদি নিউ ইয়র্কের অন্যান্য কোনো কাউন্টি বা অন্যান্য কোনো রাজ্যে থাকেন, তবে আপনার স্থানীয় স্বাস্থ্য বিভাগে যোগাযোগ করুন। আপনি আপনার এলাকার জন্য নির্দিষ্ট আরও তথ্য খুঁজতে নিচের রিসোর্সগুলোও ব্যবহার করতে পারেন।

নিরাপদভাবে সূঁচ নিষ্পত্তিত

[www.safeneedledisposal.org](http://www.safeneedledisposal.org).

৮০০-৬৪৩-১৬৪৩

[info@safeneedledisposal.org](mailto:info@safeneedledisposal.org)

ধারালো বজেরয়র কনেটইনার কীভাবে নিষ্পত্তিত করবেন

[www.fda.gov/media/82396/download](http://www.fda.gov/media/82396/download)

আপনার কোনো পরশ্ন বা উদেব্গ থাকলে আপনার সব্স্থস্বেবা পর্দানকারীর সাথে যোগাযোগ করুন। আপনার পরিচয়রা দলের একজন সদসয়্ সোমবার থেকে শুরুরবার পযরন্ত উত্তর দেবেন সকাল 9:00 টা থেকে বিকেল 5:00 টার পর এই সময়ের বাইরে, আপনি একটি বাতরা রেখে যেতে পারেন বা অনয়্ একজন MSK পর্দানকারীর সাথে কথা বলতে পারেন। কলে সবরদা একজন ডাক্তার বা নাসরকে পাবেন। আপনি যদি আপনার সব্স্থস্বেবা পর্দানকারীর সঙ্গে কীভাবে যোগাযোগ করবেন তা নিশ্চিত না হন, তাহলে ফোন করুন। ২১২-৬৩৯-২০০০.

আরো রিসোসেরর জনয়্ [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe)-এ ভিজিট করে আমাদের ভাচুর্যাল লাইবেররি দেখুন।

How to Use an Insulin Pen - Last updated on March 20, 2024

Memorial Sloan Kettering Cancer Center কতুরক সবরসব্তব্ সংরকিষত