



রোগী এবং শুশুরুষাকারীর শিক্ষা

অ্যালোজেনিক সেট্ম সেল ট্রান্সপ্লানেট্র পরে হাসপাতাল ত্যাগ করা

এই তথ্যটি আপনাকে আপনার অ্যালোজেনিক সেট্ম সেল
ট্রান্সপ্লানেট্র পর বাড়ি ফেরার জন্য পর্স্তুত হতে সহায়তা করবে।

পড়ার সময়, যেখানে আপনার পরশ্ন জাগে, সেগুলো লিখে রাখুন বা
চিহ্নিত করুন। পরবর্তীতে ট্রান্সপ্লান্ট টিমের সাথে দেখা হলে, এটি
আপনাকে পরশ্ন করতে মনে করিয়ে দেবে।

ট্রান্সপ্লানেট্র পর বাড়ি যাওয়ার আগে

আপনি হাসপাতাল ত্যাগ করার আগে, আপনি এবং আপনার যত্নকারী
এই পরস্থানের জন্য পর্স্তুত হওয়াটা জরুরি। সুস্থ থাকতে এবং
সংকর্মণ পর্তিরোধ করতে আপনাকে এখনো সতকর্তা অনুসরণ করতে
হবে। বাড়িতে থাকাকালীন কীভাবে নিজের যত্ন নেবেন সেটা পরিকল্পনা
করা আপনার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আপনি হাসপাতাল ত্যাগ করার
আগে আপনার ফলো-আপ যত্নের জন্য পরিকল্পনা করতে আপনার
ট্রান্সপ্লান্ট টিম আপনার সাথে কাজ করবে।

আপনার সুস্থতার এই পয়র্যাটি দীঘর সময়ের জন্য হিসাব করা হয় - যা
ডিসচার্জ থেকে আপনার ট্রান্সপ্লানেট্র পরে পর্যায় 1 বছর (বা তার
বেশি)। গুরুত্ব সহকারে মনে রাখবেন, যদিও আপনার রকেতের পরিমাণ
সব্বাত্তিক সীমায় ফিরে আসছে, আপনার রোগ পর্তিরোধ ক্ষমতা এখনো

খুবই দুরুর্ল। আপনাকে এখনো ওষুধ খেতে হবে এবং সুস্থ থাকতে ও সংকর্মণ এড়াতে সতকর্তা অনুসরণ করতে হবে।

টরান্সপ্লানেটের পর আপনার কিছু পাশব্র্পর্তিকির্য্যা হতে পারে যা আপনার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গকে পর্ভাবিত করতে পারে। আপনাকে কখন বাড়িতে যেতে হবে তা পরিচয়রাকারী দল আপনাকে জানাবেন।

এখানে দেওয়া সময়সীমা হলো সাধারণ নির্দেশিকা। আপনার টরান্সপ্লান্ট টিম আপনাকে আরো সঠিক সময় জানাতে পারে।

মেডিকেল অয়লাটর জুয়েলারি

হাসপাতাল ছাড়ার আগে, আপনাকে একটি মেডিকেল অয়লাটর বের্সলেট বা নেকলেস অডরার করতে হবে। আপনার টরান্সপ্লান্ট টিম আপনাকে এ বিষয়ে সাহায্য করবে। মেডিকেল অয়লাটর জুয়েলারি কোম্পানিগুলোর উদাহরণ হিসেবে রয়েছে MedicAlert® (www.medicalert.org) এবং ROAD iD (www.roadid.com)।

আপনার বের্সলেট বা নেকলেসে “অয়লো সেট্ম সেল টরান্সপ্লান্ট এন্ড শুধুমাত্র বিশুদ্ধ ও সিএমভি মুক্ত নিরাপদ রক্ত” এই বিবৃতিগুলি খোদাই করা থাকা উচিত। যদি আপনি কোনো দুঃর্টনায় পড়েন এবং নিজে কিছু বলতে না পারেন, তখন এটি প্যারামেডিক্স বা হাসপাতালের কর্মরচারীদের জানাতে সাহায্য করবে।

টরান্সপ্লানেটের পর বাড়ি যাওয়া

আপনার টরান্সপ্লানেটের পর আপনি খুব খুশি হতে পারেন এবং বাড়ি ফেরার জন্য নিজেকে পর্স্তুত মনে করতে পারেন। তবে, আপনার কিছু উদ্দেব্গও থাকতে পারে। বাড়িতে কীভাবে নিজের যত্ন নেবেন সেটা নিয়ে উদ্দেব্গ থাকা সব্ভাবিক। নিজের যত্ন নেয়ার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাসী

হওয়া ও সব্সিট্ৰ অনুভব কৰা সময়েৱ বয়াপার আপনার ফলো-আপ ভিজিট চলাকালীন, আপনার সোশ্যাল ওয়াকৱাৰ আপনাকে আপনার পৱ্যোজনীয় পৱিষ্ঠেৰা পেতে সাহায্য কৰাৰ পাশাপাশি মানসিক সমথৰন দিতে পাৱেন।

আপনি বাড়ি ফিৰে গেলে, আবাৰ বাড়িতে বসবাস কৰাৰ জনয় অভয়স্ত হতে সময় লাগবে। আপনি হয়তো দেখতে পাৰেন যে অসুস্থ হওয়া থেকে বাঁচতে আপনাকে ঘা ঘা কৰতে হবে তা আপনার জীবনে কিছু বাড়তি চাপ যোগ কৰে। ভাৱসাময় এবং সব্যচ্ছন্দ্যমূলক অনুভূতি আবাৰ সময়েৱ সাথে ফিৰে আসবে। যতটা সম্ভব শান্ত এবং আত্মবিশ্বাসী থাকাৰ চেষ্টা কৰুন।

ট্ৰান্সপ্লানেট্ৰ পৱে আপনি ধীৱে ধীৱে সুস্থ হবেন। সম্ভবত কিছু সময়েৱ জনয় আপনি অসুস্থতাৰ আগে যেমন অনুভব কৰতেন, তেমন অনুভব কৰবেন না। আপনি ক্লান্ত এবং দুৰৱল বোধ, ক্ৰুধামন্দা অনুভব কৰতে পাৱেন এবং খাবাৱেৱ সবাদ ও গনেধৰ পৱিবতৱন লক্ষ্য কৰতে পাৱেন। আপনার শক্তি ফিৰে পেতে এবং অসুস্থতা ও ট্ৰান্সপ্লানেট্ৰ আগে যে কাজগুলো আপনি উপভোগ কৰতেন, সেগুলো আবাৰ কৰতে সময় লাগবে।

ট্ৰান্সপ্লানেট্ৰ পৱ সংকৱৰ্মণ যেভাবে পৱতিৰোধ কৰবেন

আপনার ইমিউন সিস্টেম সব্যভাবিক হতে আপনার ট্ৰান্সপ্লান্ট থেকে সাধাৱণত 12 থেকে 18 মাস সময় লাগে। ট্ৰান্সপ্লানেট্ৰ পৱ পৱথম বছৱটি আপনার জীবনেৱ নবজাতক শিশুৰ মতো যাবে। এই সময়টিতে, আপনি সংকৱৰ্মণেৱ ঝুঁকিতে রয়েছেন। আপনার ইমিউন সিস্টেম কতটা ভালো কাজ কৰছে তা জানেতে আপনার ট্ৰান্সপ্লান্ট টিম আপনার ব্লাড সেলেৱ পৱিমাণ ঘাচাই কৰবে। আপনার ব্লাড সেলেৱ পৱিমাণেৱ উপৱ ভিত্তি কৰে, তাৱা নিচেৱ নিদেৱশনাবলিতে পৱিবতৱন বা সংযোজন কৰতে পাৱে।

সংকর্মণ থেকে বাঁচতে নিচে কয়েকটি সাধারণ পরামর্শ রয়েছে:

- বারবার আপনার হাত অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল সাবান এবং জল দিয়ে ধূয়ে নিন বা অ্যালকোহলযুক্ত হ্যান্ড স্যানিটাইজার দিয়ে পরিষ্কার করুন।
- যারা অসুস্থ বা সম্প্রতি অসুস্থ হয়েছেন তাদের থেকে দূরে থাকুন।
- আপনি যখন কোনো কোলাহলপূর্ণ জায়গায় থাকেন বা আপনি যদি অপরিচিত কোনো লোকের কাছাকাছি থাকেন (যদি আপনার ট্রান্সপ্লান্ট টিম আপনাকে এমনটা বলে) তখন একটি মাস্ক পরুন।
- আপনার ট্রান্সপ্লান্টের পরে বডি পিয়াসিরং বা ট্যাটু পরবেন না। এগুলো হেপাটাইটিস এবং অন্যান্য সংকর্মণের ঝুঁকি বাড়ায়। আপনার যেকোনো উদ্দেব্গ থাকলে তা আপনার ট্রান্সপ্লান্ট ডাক্তারের সাথে আলোচনা করুন।

নিম্নলিখিত বিষয়গুলো সংকর্মণের লক্ষণ হতে পারে। আপনার যদি এগুলো থাকে তাহলে অবিলম্বে আপনার ডাক্তারের অফিসে কল করুন:

- 100.4 °ফা. (38.0 °সে.) বা তার বেশি জব্র।
 - আপনার সব্স্থায়সেবা পর্দানকারী আপনাকে না বললে অ্যাসিটামিনোফেন (Tylenol®) গর্হণ করবেন না।
 - প্রতিদিন আপনাকে আপনার তাপমাত্রা মাপতে হবে না। তবে, আপনি অসব্সিত বোধ করলে নিয়মিত এটি পরীক্ষা করুন।
- ফ্লাশড (লালভাব, উষ্ণ অনুভূতি) তব্ক, ঘাম বা কাঁপুনি দিয়ে ঠাণ্ডা লাগা।
- কাশি, হাঁচি, নাক দিয়ে পানি পড়া, শব্সকষ্ট বা বুকে অসব্সিত লাগা।
- আপনার গলা, চোখ, কান, তব্ক, জয়েন্ট বা পেটে (নাভীর আশপাশ)

ଲାଲଭାବ, ଫୋଲାଭାବ ବା ବସ୍ଥାୟକ୍ତ ଅନୁଭୂତି ।

- ଝାପସା ଦୃଷ୍ଟି ବା ସ୍ପୃଷ୍ଟଭାବେ ଦେଖାର ସମସ୍ୟା ସହ ଅନୟାନ୍ୟ ପରିବତରନ ।
- ବମି ବମି ଭାବ (ଭିତର ଥିଲେ ଉଗରେ ଦେଓଯାର ମତୋ ଅନୁଭୂତି), ବମି କରା (ଉଗରେ ଦେଓଯା) ବା ଡାୟରିଯା (ପାତଳା ବା ଜଲେର ମତୋ ମଲତ୍ୟାଗ) ।
- ସବ୍ରାତାବିକେର ଚେଯେ ଘନ ଘନ ପରସ୍ରାବ, ପରସ୍ରାବ କରାର ସମୟ ଜବାଲାପୋଡା ଅନୁଭୂତି, ଅଥବା ଉଭୟଙ୍କ ହତେ ପାରେ ।
- ଆପନାର ମଲଦବାରେ ଅସବ୍ସିତ, ଜବାଲାପୋଡା ଓ ବସ୍ଥା ହତେ ପାରେ ।
- ଆପନାର ଶରୀରେ ଯେକୋନୋ ସ୍ଥାନେ ର୍ଯ୍ୟାଶ ହତେ ପାରେ । ର୍ଯ୍ୟାଶଗୁଲୋ ସାଧାରଣତ ଲାଲଚେ, ବରନ୍ ବା ଫେସକାର ମତୋ ଦେଖାଯ ।
- ଆପନାର ମୁଖେର ଚାରପାଶେ ବା ଆପନାର ଶରୀରେ ଅନୟ କୋନୋ ଅଂଶେ ଠାଣ୍ଡା ଲାଗାର କାରଣେ ଓଠା ସାଗୁଲୋର ମତୋ ଛୋଟ ଫୋସକା
- ଆପନାର ବୁକେ ଯଦି ଟାନେଲ୍ୟୁକ୍ତ କ୍ୟାଥେଟାର ଥାକେ, ତାହଲେ ତା ଫଳାଶ କରତେ ସମସ୍ୟା ହତେ ପାରେ ।

ଆପନାର ଇମିଡିନ ସିସ୍ଟେମ ପୁନରାୟ ସବ୍ରାତାବିକ ନା ହୋଯା ପଯରନ୍ତ ଆପନି ଆରୋ ସହଜେ ଭାଇରାସେ ଆକରନ୍ତ ହତେ ପାରେନ । ଏର ମଧ୍ୟ ଏକଟି ଭାଇରାସ ଯା ଚିକେନପକ୍ସ ଏବଂ ଦାଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଯଦି ଆପନି ଚିକେନପକ୍ସ ବା ସିଏ୍ରେଜଲେର ସଂସ୍ପଶେର ଆସେନ, ତବେ ଅବିଲମ୍ବେ ଆପନାର ଟରାନ୍ସପ୍ଲାନ୍ଟ ଟିମକେ ଫୋନ କରୁନ । ଆପନାକେ ଆସତେ ହବେ, ଯେନ ତାରା ଦେଖିବାରେ ଆପନାର ଚିକିତ୍ସାର ପରିୟୋଜନ ରଯେଛେ କିନା ।

ଅତୀତେ ଆପନି କୋନୋ ଭାଇରାସେ ଆକରନ୍ତ ହେବାରେ ଥାକଲେ, ସେଗୁଲିତେ ଆବାର ଆକରନ୍ତ ହତେ ପାରେନ । ଉଦାହରଣସବ୍ରାପ, ଆପନାର ଯଦି ଛୋଟବେଲାଯ ଚିକେନପକ୍ସ ହେବାରେ ଥାକେ, ତବେ ଚିକେନପକ୍ସ ଏବଂ ସିଏ୍ରେଜଲେର ଭାଇରାସେ ଆବାର ଆକରନ୍ତ ହତେ ପାରେନ । ଏଟି ପରାୟଇ ଆପନାର ତବ୍ରକେ ବସ୍ଥାୟକ୍ତ

বৱন বা তৱল ভতিৱ ফোসকা হিসেবে শুৱু হয়। যদি আপনার ফোসকা হয়, তবে সেগুলো ছোট আকারের বা পেনিসল ইৱেজারের মতো বড় হতে পাৱে। এগুলোতে বয়থা, চুলকানি, বা জব্লাপোড়া হতে পাৱে। আপনার এই উপসগৱগুলিৰ মধ্যে কোনটি থাকলে, তাৎক্ষণিকভাৱে আপনার টৱান্সপ্লান্ট টিমকে কল কৱুন যেন আপনার চিকিৎসা কৱা যায়।

আপনার ৱোগ-পৱতিৱোধ ক্ষমতা সব্ভাৱিক হয়ে গেলে, আপনি আপনার শৈশবেৰ টিকাগুলি নিতে শুৱু কৱবেন। এটি সাধাৱণত আপনার টৱান্সপ্লান্টৰ পৱায় ১ বছৱ পৱ থেকে শুৱু হয়। আপনার কেষতেৱ কোনটি সঠিক সময়, সেটা আপনার টৱান্সপ্লান্ট টিম সিদ্ধান্ত নেবে।

বাড়িতে যেভাৱে নিজেৰ যত্ন নিবেন

পৱতিৱিন গোসল কৱুন

পৱতিৱিন স্নান বা গোসল কৱুন। আপনার টৱান্সপ্লান্টৰ পৱ সুস্থ হওয়াৰ পৱক্রিৱ্যা চলাকালীন নিজেকে পৱিষ্কাৱ রাখাটা অতযন্ত্ৰ গুৱুতব্ব্যুগুৱ। এটি সংকৱমণ পৱতিৱোধে সহায়তা কৱতে পাৱে।

- Dove® বা Basis® এৱ মত কোমল সাবান বয়বহাৱ কৱুন। Ivory® বা সুগন্ধিযুক্ত সাবান বয়বহাৱ কৱবেন না। এগুলো আপনার তবককে শুষ্ক কৱে দিতে পাৱে। আপনার তবক শুষ্ক হয়ে গেলে, কেয়াৱ টিমেৱ সাথে কথা বলুন
- আপনার আন্ডারআমৱ এবং কুঁচকি নিয়মিত ধোয়াৱ অভয়স কৱুন।
- শুধুমাত্ৰ আপনার বয়ক্তিগত বয়বহাৱেৰ জনয় একটি ওয়াশক্লথ এবং তোয়ালে বয়বহাৱ কৱুন।
- আপনার যদি এখনো টানেলযুক্ত কথাখেটাৱ বয়বহাৱ কৱেন তাহলে আপনি গোসল কৱাৱ সময় এটি যেন জলে না ভিজে সেদিকে খেয়াল

রাখুন। আরও জানতে পড়ুন *About Your T tunneled Catheter* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/about-your-tunneled-catheter)।

- আপনার তব্ক শুষ্ক হয়ে গেলে, খুব গরম পানি ব্যবহার করবেন না। Eucerin® বা CeraVe® এর মতো বেবি অয়েল বা স্কিন ময়েশ্চারাইজার ব্যবহার করুন। গোসল করার পরে আপনার তব্ক যখন সঁয়াতসঁয়াতে অবস্থায় থাকে ঠিক তখনই এটি ব্যবহার করুন। আপনার ব্যবহৃত তোয়ালে দিয়ে আলতো করে আপনার তব্ক মুছে নিন। অ্যালকোহলযুক্ত লোশন ব্যবহার করবেন না। এগুলি আপনার তব্ককে আরো শুষ্ক করে তুলবে।

রোদ থেকে নিজেকে রক্ষা করুন

- আপনার তব্ক আরো সংবেদনশীল হবে এবং আপনার ট্রান্সপ্লান্টের পরে আরো সহজে পুড়ে যেতে পারে। আপনি যে ওষুধ খাচ্ছেন তা এতে যুক্ত হতে পারে। আপনার গ্লাফট ভাসরাস হোস্ট ডিজিজ (GVHD) বা মেলানোমা হওয়ার ঝুঁকি বেড়ে যেতে পারে। সূয়েরৰ নিচে দীঘর সময় থাকলে আপনার জব্র ঠোসা বা জব্রের ফোসকা পুনরায় সক্রিয় হতে পারে।
- আপনি যখনই রোদে থাকবেন, আপনার তব্ককে সানব্লক দিয়ে সুরক্ষিত করুন যাতে কমপক্ষে এসপিএফ ৩০ থাকে। এটি প্রায়শই বারবার পর্যোগ করুন।

সরাসরি সূয়রালোকে অবস্থানের সময়সীমা কমিয়ে আনুন। আপনি যদি ২০ মিনিট বা তার বেশি সময় ধরে সরাসরি সূয়েরৰ আলোতে থাকেন তবে একটি টুপি এবং এমন পোশাক পরুন যা তব্ককে সুরক্ষা দেয়।

নতুন ক্লিনিং সলিউশন এবং মেকআপ ব্যবহার করুন

- আপনি কন্টাক্ট লেন্স পরতে পারেন তবে সেগুলো ব্যবহারের আগে ভালোভাবে পরিষ্কার করা হয়েছে তা নিশ্চিত হয়ে নিন। ক্লিনিং সলিউশন পুনরায় ব্যবহার করবেন না। ক্লিনিং সলিউশনের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে ফেলে দিন।
- আপনার চোখ শুষ্ক হয়ে গেলে ময়শ্চারাইজিং ড্র্প ব্যবহার করুন।
- আপনি মেকআপ ব্যবহার করতে পারেন তবে আপনার ট্রান্সপ্লানেটের পরে সব নতুন পণ্য কিনুন। অনেক্ষে সঙ্গে মেকআপ শেষার করবেন না। সংকর্মণের ঝুঁকি কমাতে, পর্তি ৩ মাস পরপর আপনার চোখের মেকআপ পরিবর্তন করুন।

আপনার নখ ও চুলের যত্ন নিন

আপনার পুরানো নখের পরিবর্তে নতুন নখ গজাবে। এটি আপনার ট্রান্সপ্লানেটের পর ৩ থেকে ৪ মাসের মধ্যে ধীরে ধীরে ঘটবে। আপনার ডাক্তার অনুমতি না দেওয়া প্যরন্ত নেইল স্যালনে ম্যানিকিউর বা পেডিকিউর করবেন না। আপনি নখে পেইন্ট করতে পারেন, তবে নেইল ক্লিপার ব্যবহার করবেন না। নেইল ফাইল ব্যবহার করুন।

সাধারণত ট্রান্সপ্লানেটের পর্যায় ৩ মাস পর চুল পুনরায় বেড়ে উঠতে শুরু করে। আপনার চুল ভিন্নভাবে বড় হতে পারে। যদিও এটি বিরল, ট্রান্সপ্লানেটের কয়েক মাস বা বছর পরেও চুল পড়তে পারে।

আপনার চুল এবং মাথার তবক পরিষ্কার রাখুন। চুলে অয়লকেহল বা সুগন্ধিধূক্ত পণ্য ব্যবহার করবেন না। এগুলি আপনার চুল শুষ্ক করে ফেলতে পারে।

মুখের যত্ন নিন

- ট্রান্সপ্লানেটের পর আপনার মুখে শুষ্কতা অনুভব হতে পারে। এটি আপনার সংকর্মণের ঝুঁকি বাড়ায়। আপনার মুখ পরিষ্কার রাখা গুরুত্বপূর্ণ।
- আপনি কখন থেকে একটি অতি নরম টুথবরাশ ব্যবহার শুরু করতে পারবেন তা আপনার কেয়ার টিম আপনাকে জানাবে। এটি তখনই হবে যখন:
 - আপনার অ্যাবসলিউট নিউটেরাফিল কাউন্ট (ANC) 500 (কখনো কখনো 0.5 বলা হয়)-এর বেশি হয়।
 - আপনার প্লাটিলেটের সংখ্যা 20,000 (কখনো কখনো 20 বলা হয়) বা তার বেশি হয়।

আপনি কখন থেকে নিয়মিত টুথবরাশ দিয়ে আপনার দাঁত ফ্লস এবং বরাশ করতে পারেন তা আপনার ডাক্তার বা ডেনিটস্টের কাছ থেকে জেনে নিন।

যদি আপনি আপনার মুখে বা ঠোঁটে কোনো ঘা, সাদা দাগ বা রক্তপাত লক্ষ্য করেন, তবে আপনার কেয়ার টিমকে জানান।

- আপনার ট্রান্সপ্লানেটের পরে 3 থেকে 4 মাস বা তার বেশি সময় ধরে আপনার মুখের শুষ্কাভাব থাকতে পারে। স্টোর থেকে কেনা, অ্যালকোহলযুক্ত মাউথওয়াশ বা হাইড্রেজেন পারঅক্সাইড ব্যবহার করবেন না। এগুলো আপনার মুখ শুষ্ক করে ফেলবে এবং অসব্সিত সংষ্টি করবে। এগুলোর পরিবর্তে, হালকা লবণ পানি ব্যবহার করুন। একসঙ্গে মিশিয়ে তৈরি করুনঃ
 - ১/২ চা চামচ লবণ
 - ১/২ চা চামচ বেকিং সোডা

- ৮ আউন্স পানি
- আপনার ডেনিট্সট অনঘনভাবে ধোয়ার পরামশর দিতে পারেন। এছাড়া চিনিমুক্ত ক্যানিং বা লজেওজ চুষা সাহায্য করতে পারে।
- আপনার লালা গর্নিথগুলো আপনার টরান্সপ্লানেটের পরে আপনার মুখ থেকে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসের জন্য ততটা কায়রকর নাও হতে পারে। এটি আপনার ক্যানিংটিসের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। ফ্লারাইডযুক্ত টুথপেস্ট ব্যবহার করুন। আপনার মুখ পুরোপুরি সুস্থ হয়ে গেলে এবং খুব বেশি শুষ্ক না হলে আপনি ফ্লারাইডযুক্ত মাউথওয়াশ ব্যবহার করতে পারেন। মাউথওয়াশটি আপনার মুখে কমপক্ষে ১ মিনিটের জন্য রাখুন, তারপর ফেলে দিন। ধূঘে ফেলবেন না।

আপনার টানেলযুক্ত ক্যাথেটারের যত্ন নেওয়া

আপনার টানেলযুক্ত ক্যাথেটারটি হাসপাতালে যেমন পরিস্কার ছিল, এটিকে বাড়িতে তেমন পরিষ্কার রাখাটাও ঠিক ততটাই গুরুত্বপূর্ণ। আপনি যদি টানেলযুক্ত কোনো ক্যাথেটার নিয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করেন তাহলে কিভাবে বাড়িতে এটির যত্ন নিতে হয় তা আপনার নাসর আপনাকে শেখাবেন। আপনি তাদের সঙ্গে অনুশীলন করার সুযোগ পাবেন। আপনি অতিরিক্ত ক্লিম্পসহ একটি কিট পাবেন, আপনারটি ক্ষতিগ্রস্ত হলে যেন সেটা ব্যবহার করা যায়।

অবিলম্বে আপনার ডাক্তারের অফিসে কল করুন যদি:

- আপনার শরীরের যেখানে ক্যাথেটার রয়েছে তার চারপাশে লালভাব, ফোলাভাব বা তরল নিগর্ত হয়।
- আপনার সূচনান কানেক্টর পড়ে যায়।
- আপনার শরীরের তাপমাত্রা 100.4°ফা. (38.0°সে.) বা তার বেশি হয়

অথবা ঠান্ডা লাগে।

- আপনার ক্যাথেটারে ছিদ্র বা ফুটো থাকে।
- আপনার ক্যাথেটারে অসব্াভাবিক কোনো সমস্যা থাকে।

আপনার বাড়ির পরিবেশ

- আপনার বাড়িকে যতটা সম্ভব ময়লা এবং ধুলাবালি মুক্ত রাখুন। তবে, আপনার মাত্রাত্তিরিক্ত কিছু করা উচিত নয়। যেমন, আপনার দেওয়ালগুলো পুনরায় রঙ করবেন না বা নতুন কাপেরট বিছাবেন না।
- আপনার ট্রান্সপ্লান্ট টিম যতক্ষণ পযরন্ত না আপনাকে বলে যে এটি করা ঠিক আছে ততক্ষণ পযরন্ত কোনো ধরনের সংস্কার বা নিমর্ণ কাজের আশেপাশে থাকবেন না। এটিতে পর্কিরয়াধীন এবং গত 3 মাসের মধ্যে সম্পন্ন করাগুলোও অন্তভুর্ক্ত।
- ছতরাক ছড়িয়ে পড়া যেকোনো দুগরন্ধ্যক্ত জায়গা থেকে দূরে থাকুন, যেমন- স্যাংতস্যাতে বেসমেন্ট। আপনি আপনার বাড়িতে একটি এয়ার ফিল্টারেশন সিস্টেম ব্যবহার করতে পারেন তবে আপনার পর্যোজন নেই।
- হিউমিডিফায়ার ব্যবহার করবেন না। ব্যাকটেরিয়া এবং ছতরাক সহজেই এতে বৃদ্ধি পায়। তাপের উৎসের কাছাকাছি রাখা জলের প্যান শীতকালে সাহায্য করতে পারে। যদি আপনি এটি করেন, তবে পর্তিদিন পানি পরিবর্তন করুন।
- সাধারণত, আপনার ট্রান্সপ্লান্টের পর পরথম 3 মাস ধুলোয় বা ভ্যাকুয়াম করার মতো কোনো কাজ না করার চেষ্টা করুন। আপনার শক্তি সামথের্যের উপর ভিত্তি করে, আপনার জনয়রান্না করা, থালা-বাসন ধোয়া বা আয়রন করা ভালো হবে।

- আপনার বাথরুম খুবই পরিষ্কার রাখুন, বিশেষ করে টাব এবং ট্যালেট। এটি নিয়মিত জীবাণুনাশক দিয়ে পরিষ্কার করা হয়েছে তা নিশ্চিত করুন। এই কাজটি অন্য কাউকে দিয়ে করানো সবচেয়ে ভালো।
- আপনার খাওয়ার পাতর, তোয়ালে এবং লিনেন সাবধানে ধূয়ে ফেলুন। সেগুলো আপনার পরিবারের বাকি সদস্যদের থেকে আলাদাভাবে ধোয়ার দরকার নেই।
 - গরম জল এবং ডিশ ওয়াশিং ডিটারজেন্ট দিয়ে সমস্ত কাঁটা চামচ, চামচ এবং ছুরি ভালোভাবে ধূয়ে নিন অথবা একটি ডিশওয়াশার ব্যবহার করুন।
 - তোয়ালে সপ্তাহে দুইবার এবং বিছানার চাদর সপ্তাহে একবার ধূয়ে ফেলুন। আপনার পরিবারের অন্য কোনো সদস্যদের নয় বরং শুধুমাত্র আপনার নিজসব তোয়ালে এবং ওয়াশক্লথ ব্যবহার করুন।
- আপনি আপনার ঘরের ভেতরে গাছপালা রাখতে পারেন। কিন্তু আপনার টর্নস্প্লানেটের পর পরথম কয়েক মাসের জন্য:
 - গ্লাভস এবং মাস্ক না পরে গাছপালার মাটি স্পর্শ করবেন না।
 - ফুলের ফুলদানিতে থাকা জল স্পর্শ করবেন না। ফুলদানির জল পর্তিদিন অন্য কারো পরিবর্তন করা উচিত।

পোষা পরাণী

পশুপরাণী রোগ-জীবাণু বহন করতে পারে। আপনার ইমিউন সিস্টেম স্বাভাবিক করার সময় তারা আপনাকে সংকর্মণের আরো বেশি ঝুঁকিতে ফেলতে পারে। আপনি বাড়িতে কোনো পোষা পরাণী রাখতেই পারেন এবং সেটি স্পর্শ করতে পারেন, তবে তাদের সাথে ঘনিষ্ঠ শারীরিক যোগাযোগ না রাখাই শের্য। উদাহরণস্বরূপ, পরাণীটিকে আপনার কোলে নেবেন না।

পরাণীটির লালা বা মল স্পর্শ করবেন না। কামড় বা আঁচড় লাগা থেকে নিজেকে সুরক্ষিত রাখতে ভুলবেন না।

আপনি সুস্থিতা অজর্নের সময় পাথি, টিকটিকি, সাপ, কচ্ছপ, হ্যামস্টার বা অন্যান্য ইঁদুর পালন বা যত্ন করবেন না। যদি আপনার একটি অ্যাকুয়ারিয়াম থাকে এবং আপনাকে এটা পরিষ্কার করতে হয়, তবে গ্লাভস পরিধান করে নিজেকে সুরক্ষিত রাখুন।

আপনার বাড়িতে কোনো বিড়াল বা কুকুর থাকলে, আপনার ডাক্তার আপনাকে অন্য কোনো নির্দেশ না দেওয়া পয়র্ন্ত নিচের বাড়তি নির্দেশনাবলী মেনে চলুন।

- আপনার পোষা পরাণীটিকে টিকা ও বুস্টার টিকা দেয়া হয়েছে কিনা, তা নিশ্চিত করুন।
- পরজীবী রয়েছে কিনা নিশ্চিত হতে, পরাণী চিকিৎসককে পর্তি বছর আপনার পোষা পরাণীর মল পরীক্ষা করতে বলুন।
- আপনার যদি কোনো বিড়াল থাকে তাহলে পর্তি বছর এটির ফেলাইন লিউকেমিয়া এবং টকেসাপ্লাজমোসিসের পরীক্ষা করান।
- আপনার পোষা পরাণীকে মাছির চিকিৎসা করান। যদি আপনার পোষা পরাণীটি জঙ্গলের মধ্য দিয়ে হাঁটাচলা করে তাহলে টিক সিজনে (মে থেকে নভেম্বর) পর্তিদিন এটির টিক্স যাচাই করুন। একটি ফেলয়া এবং টিক কলারের ব্যবহার সম্পর্কে আপনার পশুচিকিৎসকের সাথে কথা বলুন।
- আপনার বিড়ালের লিটার বক্স বা কুকুরের মল পরিষ্কার করবেন না। আপনার পকে়্য অন্য কাউকে এই কাজগুলো করতে বলুন।
- যতটুকু সময় পারেন আপনার পোষা পরাণীদের বাড়ির ভিতরে বা

আপনার নিজের সম্পত্তিতে রাখুন। অন্যান্য পরামীদের থেকে রোগে
আকর্ত্ত্ব হওয়া থেকে বাঁচতে এটি তাদের সাহায্য করবে।

- আপনার বিছানায় পোষা পরামীদের উঠতে দিবেন না।
- আপনার বাড়ির বাইরে, যেকোনো খামার বা চিড়িয়াখানার পরামীদের
সাথে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ এড়িয়ে চলুন।

ট্রান্সপ্লানেটের পর আপনি যদি কোনো পোষা পরামী রাখার পরিকল্পনা
করেন, তাহলে ১ বছরের বেশি বয়সী সুস্থ কুকুর বা বিড়াল পোষা উচিত।
এটি বন্ধ্যা বা খোজা করুন।

পরিবার ও ভর্মণাথরী

আপনি আপনার নিকটাত্মীয়দের সাথে ঘনিষ্ঠ শারীরিক যোগাযোগ বজায়
রাখতে করতে পারেন। কিন্তু ঠাণ্ডা লেগেছে বা অসুস্থ হওয়ার কোনো
সম্ভাবনা রয়েছে এমন কারো কাছাকাছি যাবেন না। অসুস্থ কারো সাথে
একই ঘরে থাকতে হলে মাস্ক ব্যবহার করুন। আপনার পরিবারের সদস্য
এবং ঘনিষ্ঠ বন্ধুদেরকে বাষিরক ভিত্তিতে ফ্লুয়ের শট নেওয়া উচিত।

আপনাকে অন্যান্য ব্যক্তিবগর দেখতে আসতে পারে তবে তাদেরকে ছোট
ছোট গরুপে ভাগ হয়ে আসতে বলুন। নিম্নাক্ত সমস্যা আছে এমন কারো
সাথে দেখা করবেন না:

- ঠাণ্ডাজনিত সমস্যা।
- চিকেনপক্স।
- সম্পর্তি চিকেনপক্সের সংস্পর্শের থেকে এসেছে।
- সম্পর্তি হাপিরস সিমপেলক্স ভাইরাস (ভাইরাস যা জব্রঠোসা এবং
যৌনাঙ্গে ঘা সৃষ্টি করে) এর সংস্পর্শের এসেছেন।

- সম্পর্তি দাদের সংস্পর্শের থেকে এসেছে।
- সম্পর্তি অন্য কোনো ধরনের ভাইরাস বা সংকর্মণের সংস্পর্শের থেকে এসেছে।
- সম্পর্তি ভেরিসেলা (চিকেন পক্স ভাইরাস) বা রোটাভাইরাসের মতো লাইভ ভাইরাসের কোনো ভ্যাকসিন নিয়েছেন। এগুলো খুব কমই হয়, তবে যদি আপনার পরিবারের কারো পর্যোজন হয়, তবে তাদের চিকিৎসককে জানান যে আপনার রোগ পর্তিরোধ ক্ষমতা খুবই কম এবং আপনি একই পরিবারে বসবাস করেন।

আপনি বা পরিবারের অন্য কোনো সদস্য চিকেনপক্স, দাদ, হাম বা জামরান হাম (রুবেলা) এর সংস্পর্শের এলে অবিলম্বে আপনার ডাক্তারকে কল করুন।

আপনার বাড়ির বাহিরে

বাইরে নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করুন, তবে নোংরা জায়গা এবং নিমরাণ সাইট এড়িয়ে চলুন। শক্তি ও সামথর্য পুনরুদ্ধার করার একটি চমৎকার উপায় হলো নিয়মিত হাঁটাহাঁটি করা। তবে, ট্রান্সপ্লানেটের পর পর্থম কয়েক মাস নিম্নলিখিত জায়গাগুলোতে ভিড় থাকলে সেগুলো এড়িয়ে চলুন:

- সুপারমাকেরট
- শপিং মল
- মুভি থিয়েটার
- স্কুল
- রেস্টুরেন্ট
- গণপরিবহন

- উপাসনালয় (যেমন গীজরা, সিনাগগ এবং মসজিদ)

আপনি এই জায়গাগুলোতে কম ভিড় থাকা সময়ে যেতে পারেন।

আপনার টর্নস্প্লানেটের পর কমপক্ষে ৩ মাস গণপরিবহন (যেমন- টের্ন বা বাস) এড়িয়ে চলুন। আমরা বুঝতে পারি যে ফলো-আপ ভিজিটের জন্য আপনাকে ট্যাক্সি, গাড়ি পরিষেবা বা অন্যান্য পরিবহন যেমন-অ্যাকেস-এ-রাইডের সাহায্য নিতে হবে। আমাদের পরামশর এগুলোতে ভর্মণের সময় আপনি মাস্ক ব্যবহার করবেন।

রক্তপাত

প্লাটিলেট হলো রক্তের কোষ যা জমাট বাঁধতে সাহায্য করে এবং রক্তপাত নিয়ন্ত্রণ করে। যখন আপনার প্লাটিলেটের সংখ্যা কমে যায় তখন আপনি রক্তপাত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকেন। হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার সময় আপনার পেল্টলেট সংখ্যা কম থাকতে পারে। আপনার শরীরের সব্ভাবিক পরিমাণ প্লাটিলেট তৈরি করতে সপ্তাহ বা মাস লাগতে পারে। আপনার প্লাটিলেট টর্নস্ফিউশনের পর্যোজন হতে পারে।

কম প্লাটিলেটের লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে তবকের পরিবর্তন, রক্তপাত বা উভয়টিই। তবক পরিবর্তনের সময় পরচুর ক্ষত বা পেটিচিয়া (peh-TEE-kee-ee) হতে পারে। এগুলো আপনার তবকে ছোট, বেগুনি-লাল দাগের মতো যা আপনি চাপলে অদ্শয় হয়ে যায় না। আপনি এগুলি আপনার পায়ের নীচের অংশে বা গোড়ালিতে দেখতে পাবেন। পেল্টলেট সংখ্যা কম থাকার অন্যান্য লক্ষণগুলির মধ্যে রয়েছে মাড়ি বা নাক দিয়ে রক্তপাত হওয়া।

আপনি যদি এই উপসর্গগুলোর মধ্যে কোনোটি নিয়ে হাসপাতাল ত্যাগ করে বাড়িতে যান এবং সেগুলো বৃদ্ধি পায়, তাহলে আপনার ডাক্তারকে

কল করুন। আপনার যদি এই লক্ষণগুলোর মধ্যে কোনোটি না থাকে এবং হঠাৎ করে সেগুলো পর্কাশ পায়, তাহলে আপনার ডাক্তারকে কল করুন। এর মানে আপনার প্লেটলেটের সংখ্যা পরিবর্তন হয়েছে।

আপনার যদি এমন কোনো আঘাত থাকে যা রক্তপাতের কারণ হয় তাহলে অনুগরহ করে আতঙ্কিত হবেন না। শান্ত থেকে আঘাতের ধরন অনুযায়ী নিচের নিদেরশনাবলী অনুসরণ করুন।

- **উন্মুক্ত ক্ষতাবস্থা:** আপনার শরীরের কোনো জায়গা কেটে যায় তাহলে কাটা জায়গাটির উপরে একটি পরিষ্কার, শুকনো গজ পঞ্চাং, তোয়ালে বা কাপড় জড়িয়ে রাখুন। শক্ত করে চাপ দিন। রক্তপাত বন্ধ না হওয়া পয়র্ন্ত চাপ দিয়ে ধরে থাকুন। যদি রক্তপাত বন্ধ না হয় সেক্ষতের সম্ভব হলে ক্ষত স্থানটি উঁচু করে ধরুন। উদাহরণস্বরূপ, আপনার হাত উপরে তুলুন বা পা উঁচু জায়গায় রাখুন। ক্ষতস্থানে বরফ লাগান এবং আপনার ডাক্তারকে কল করুন।
- **নাক দিয়ে রক্ত পড়া:** আপনার যদি নাক দিয়ে রক্ত পড়ে তাহলে উঠে বসুন এবং সামনের দিকে একটু ঝুঁকে পড়ুন। আপনার মাথা পিছনের দিকে কাত করবেন না। আপনার নাকের বিরজটি আপনার বুড়ো আঙুল এবং তজর্নীর মধ্যে অন্তত 10 মিনিট স্থিরভাবে চেপে ধরুন। যদি রক্তপাত বন্ধ না হওয়া পয়র্ন্ত আপনার নাকের বিরজে বরফের একটি ছোট বয়ংগ লাগিয়ে রাখুন। যদি রক্তপাত 30 মিনিটের বেশি চলতে থাকে তাহলে তাৎক্ষণিক আপনার ডাক্তারকে কল করুন।
- **দুঃর্টনা:** আপনি যদি দুঃর্টনায় পড়েন সেক্ষতের আপনার রক্ত বা রক্ত সংশ্লিষ্ট পণ্যের পর্যোজন হতে পারে। এগুলোকে 3,000 ঘরান্ডে ইর্যাডিয়েটেড করা উচিত। GVHD সংক্ষিপ্ত করা থেকে

ট্রান্সফিউজড রক্তকে আটকানোর জন্য এটি করা হয়।

- সব সময় আপনার MedicAlert অ্যালাট্র পড়ে থাকুন। আপনার চিকিৎসা করা ডাক্তারকে এটি এই তথ্যাবলি পর্দান করে।
- আপনি যদি অন্য কোনো হাসপাতালে ভর্তি হন তাহলে রক্ত সংশ্লিষ্ট পণ্যগুলোর নির্দেশিকার জন্য ডাক্তারকে তাৎক্ষণিকভাবে MSK-কে কল করতে বলুন।

আপনার পেল্টলেটের সংখ্যা ৫০,০০০ (৫০)-এর নিচে হলে নিচের নির্দেশনাবলী অনুসরণ করুন।

- শেভ করার সময় বৈদ্যুতিক রেজার ব্যবহার করুন।
- মাড়ির রক্তপাত রোধ করতে WaterPic® এর মত একটি নরম-বিরস্তল টুথবরাশ বা একটি ওরাল ইরিগেটর ব্যবহার করুন। ডেন্টাল ফ্লস ব্যবহার করবেন না।
- অ্যাসপিরিন, অ্যাসপিরিনযুক্ত পণ্য বা আইবুপেরাফেন (Advil®) বা নয়াপেরাকেসন (Aleve®)-এর মতো নন-স্টেরয়ডাল অ্যানিট-ইনফেলমেটরি ওষুধ (NSAIDs) গর্হণ করবেন না। আরও জানতে, “যেসব ওষুধ সেবন করবেন না” অংশটি পড়ুন।
- আপনি নাক পরিষ্কার করতে পারেন, কিন্তু সেটা জোরে করবেন না।
- কোষ্ঠকাঠিন্য হলে আপনার ডাক্তারকে কল করুন। আপনার খাদ্য তালিকায় আরো ফাইবারযুক্ত খাবার বা মল নরম করার পর্যোজন হতে পারে।
- আঘাতের কারণ হতে পারে এমন কাজকমর বা খেলাধুলা এড়িয়ে চলুন। এই বিষয়ে আপনার কোনো পরশ্ন বা উদ্বেগ থাকলে আপনার ডাক্তারের সাথে কথা বলুন।

গর্ফট ভাসের্স হোস্ট ডিজিজ (GVHD) সম্পর্কিত

GVHD তখনই ঘটে যখন দাতার ইমিউন সেল (T সেল) আপনার শরীরের অঙ্গগুলোকে আকর্মণ এবং ক্ষতি করতে শুরু করে। নতুন স্টেম সেলগুলো এনগর্য্ফট করা শুরু করলে GVHD আকর্ণ্ত হওয়ার একটি ঝুঁকি রয়েছে। আপনার এবং আপনার দাতার মধ্যে HLA বা টিসুয় টাইপের একটি ঘনিষ্ঠ মিল এই ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে তবে এটি নিম্নুর্ল করে না।

আপনার বয়স এবং আপনার দাতার লিঙ্গ GVHD-এর ঝুঁকির কারণগুলোর মধ্যে অন্তভুর্ক্ত রয়েছে। যার দাতা অভিন্ন যমজ নয় এমন যে কেউ GVHD-এর কিছু ধরনের ক্ষতের প্রতিরোধের সুযোগ পায়।

ট্রান্সপ্লান্টের মাধ্যমে T-সেল অপসারণ (ক্ষয়প্রাপ্ত T কোষ) অথবা GVHD সংশ্লিষ্ট করা থেকে T সেলগুলিতে বিরত রাখতে ওষুধ ব্যবহার করার মাধ্যমে প্রতিরোধ করতে পারেন। প্রতিটি পদ্ধতির সুবিধা ও অসুবিধা রয়েছে এবং আপনি একটি বা অন্যটি পাওয়ার কয়েকটি কারণ রয়েছে। আপনার ট্রান্সপ্লান্ট করার আগে আপনার ডাক্তার আপনার সাথে এগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন।

GVHD ২ প্রকার: তীব্র (প্রাথমিক) এবং দীঘরস্থায়ী (বিলম্বিত ও দীঘরমেয়াদী)।

তীব্র GVHD সাধারণত ট্রান্সপ্লান্টের প্রথম 100 দিনের মধ্যে প্রকাশ পায় তবে এটি পরে ঘটতে পারে। তীব্র GVHD-এর লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- শরীরের কিছু অংশে বা সমগ্র শরীরে রংযাশ দেখা যায়।
- জনিডস (তবক ও চোখ হলুদ হওয়া) ও লিভার বড় হয়ে যাওয়া।

- লিভারের রক্ত পরীক্ষায় অসব্াভাবিক ফলাফল পাওয়া।
- ক্ষুধামন্দ।
- বমি বমি ভাব ও বমি হওয়া।
- অল্প থেকে গুরুতর ডায়রিয়া।

দীঘরস্থায়ী GVHD সাধারণত 100 দিন পরে পর্কাশ পায় তবে ট্রান্সপ্লান্টের পরথম 3 মাস আগে খুব কম দেখা যায়। দীঘরস্থায়ী GVHD-এর লক্ষণগুলোর মধ্যে রয়েছে:

- তবকে কালো দাগ বা শুষ্ক বা তবকের পুরুতব বেড়ে যাওয়া।
- ক্ষুধামন্দ।
- ওজন হ্রাস।
- ডায়রিয়া।
- মুখের শুষ্কতাব।
- মুখের তবকে টানটান ভাব এবং অসব্সিত।
- চোখের শুষ্কতা।
- চুল পড়া।
- শক্তি হ্রাস।

এর লক্ষণগুলো হালকা থেকে গুরুতর হতে পারে। আপনি শুধুমাত্র তীব্র শুধুমাত্র দীঘরস্থায়ী বা তীব্র এবং দীঘরস্থায়ী উভয় GVHD-এ আকর্ণ্ত হতে পারেন। আপনি তীব্র এবং দীঘরস্থায়ী GVHD-এ আকর্ণ্তের সময়ের মধ্যে আপনার লক্ষণ পর্কাশ পেতে পারে বা নাও পেতে পারে।

GVHD আপনার অস্থি মজ্জার বৃদ্ধি এবং আপনার ব্লাড কাউন্ট সব্রাবিকিরণকে ধীর করে দিতে পারে। এর মানে হলো আপনার ইমিউন সিস্টেম সব্রাবিক করতে বেশি সময় লাগবে। এই কারণে, আপনার সংকরমণের ঝুঁকি বাড়তে পারে। এটি আপনার শরীরের এক বা একাধিক অংশকে পর্ভাবিত করতে পারে। আপনার কাছে যদি GVHD-এর লক্ষণ থাকে তাহলে চিকিৎসা পরিকল্পনা নিয়ে আপনার ডাক্তার আপনার সাথে আলোচনা করবেন।

আপনার সব্রাবিক কির্যাকলাপে ফিরে যাওয়া

দৈনন্দিন কায়রকর্ম

ট্রান্সপ্লানেটের পরে সব্রাবিক হতে যে সময় লাগে তা ভিন্ন ভিন্ন হয়। বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রে প্রায় ৩ মাস সময় লাগে, তবে ব্যক্তিগতে সময় কম বা বেশি লাগতে পারে।

আপনার ট্রান্সপ্লানেটের পরের সময়টি হলো কোষ পুনর্গঠন এবং বৃদ্ধির সময়। আপনার মুখ, পাকস্থলী, অন্তর, চুল এবং পেশীর কোষগুলো পুনরায় বৃদ্ধি পাবে। এর জন্য অনেক ক্ষালোরি এবং শক্তির পর্যোজন। আপনি প্রত্যাশার চাইতে বেশি ক্লানিত্বোধ করতে পারেন। মনে রাখবেন, এই ক্লানিত এবং দুরুত্ব সব্রাবিক। প্রতি সপ্তাহে, আপনি আরো শক্তিশালী অনুভব করবেন।

ট্রান্সপ্লানেটের প্রায় ৩ মাস পরে, আপনার চুল দরুত গজাতে শুরু করবে। সব্রাবিক প্যরায়ের কায়রকর্মে ফিরে যেতে শুরু করার জন্য আপনি যথেষ্ট সুস্থিতা বোধ করতে পারেন। এই প্যরায়ে, আপনি আরও ভালো বোধ করবেন। তবে বেশিরভাগ লোকের ক্ষেত্রে, ট্রান্সপ্লানেটের প্রথম 2 থেকে 3 মাস থেকে 1 বছর প্যরন্ত সব্রাবিক হওয়ার সময় থাকে।

বয়াঘাম

আপনার শক্তি ফিরে পেতে সময় লাগতে পারে। নিয়মিত বয়াঘাম করা সহায়ক হতে পারে। বয়াঘাম শুরু করলে সহজ বয়াঘাম দিয়ে শুরু করুন। কোন ধরনের বয়াঘাম আপনার জন্য ঠিক তা নির্ধারণ করতে আপনার ফিজিক্যাল থেরাপিস্ট আপনাকে সাহায্য করতে পারে। আপনি পর্স্তুত আছেন বোধ করার সাথে সাথে কিভাবে আপনার বয়াঘামের মাতরা বাড়ানো যায় তা আপনার ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করুন।

আপনার প্লেটলেট সংখ্যা ১০০,০০০ (১০০) এর বেশি না হওয়া পয়র্ন্ত শারীরবৃত্তীয় খেলাধূলা বা স্কি করবেন না। টানেলযুক্ত ক্যাথেটার শরীরে লাগানো অবস্থায় সাঁতার কাটবেন না।

সাঁতার

আপনি সব্বাবিক এবং আরো সক্রিয় হওয়ার পরে আপনি সাগরে সাঁতার কাটতে পারেন। স্থানীয় সব্স্থ্য বিভাগের সতকর্তাগুলোর পর্তি মনোযোগ দিন। এছাড়াও ডিড়েনেই এমন কোনো বয়ক্তিগত পুলে আপনি সাঁতার কাটতে পারেন। পুলটি কেলারিনযুক্ত তা নিশ্চিত করুন। আপনার রোগ পর্তিরোধ বয়স্থা সব্বাবিক না হওয়া পয়র্ন্ত হর্দ, নদী, অথবা পাবলিক বা ডিড়যুক্ত সুইমিং পুলে সাঁতার কাটবেন না। আপনি এখনো টানেলযুক্ত ক্যাথেটার বয়বহার করে থাকলে সাঁতার কাটবেন না।

শখ

কাঠের কাজ, পেইন্টিং এবং মডেল বিল্ডিংয়ের মতো কিছু শখ এমনসব পণ্য বয়বহার করে যা বিষাক্ত হতে পারে। সবর্দাই পর্চুর বিশুদ্ধ বাতাস চলাচল করে এমন কোনো ঘরে কাজ করুন। জানালা খোলা রাখুন। ননটকিস্ক পেইন্ট ও আঠা বয়বহার করুন। আপনার কোনো শখ পুনরায় পূরণ করার বিষয়ে আপনার যদি পরশ্ন বা উদ্বেগ থাকে তাহলে আপনার

ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করুন।

স্কুল বা কম্রকেষ্টের পুনরায় যোগদান করা

আপনার ট্রান্সপ্লান্টের সময় থেকে পর্যায় 4 মাসের মধ্যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আপনি স্কুলে বা কাজে পুনরায় যোগদান করতে পারেন। এই সময়সীমা ব্যক্তিগতে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে এবং অনেক কিছুর উপর নির্ভর করে।

আপনি অবিলম্বে ফিরে যাওয়ার জন্য নিজেকে পরস্তুত মনে করতে পারেন, অথবা অনেকদিন পরে ফিরে যাওয়ার বিষয়ে আপনি উদিব্গ্ন হতে পারেন। এটি ধীরে ধীরে যোগদান শুরু করতে সাহায্য করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ, অধেরক দিন বা সপ্তাহে 3 দিনের একটি সময়সূচী দিয়ে শুরু করুন। বেশিরভাগ লোক আমাদের জানান যে পুনরায় যোগদানের কথা চিন্তা করার চাইতে পর্যক্তপক্ষে যোগদান করাটা বেশ কঠিন।

আপনার সব্ভাবিক জীবনধারায় পরিবর্তন করাটা বেশ কঠিন হতে পারে। আপনার চেহারার পরিবর্তনের সাথে অভ্যস্ত হতে সময় লাগতে পারে। উদাহরণস্বরূপ, চুল পড়া অনেকের কাছে কষ্টদায়ক হতে পারে। অথবা, আপনার মনোনিবেশ করতে বা মনোযোগ ধরে রাখতে সমস্যা হতে পারে। আপনি আপনার পূর্বের গতি ধরে রাখতে সক্ষম নাও হতে পারেন। স্কুলে বা কাজে পুনরায় যোগদানের বিষয়ে কথা বলতে আপনার ট্রান্সপ্লান্ট টিম আপনার পাশে রয়েছে। আপনি একজন সোশ্যাল ওয়াকরার, নাসর, মনোরোগ বিশেষজ্ঞ বা আপনার ডাক্তারের সাথে কথা বলতে পারেন। আপনার পরিবর্তিত্ব পরিস্থিতিকে আরো সহজ করার উপায় খুঁজতে আমরা আপনার সাথে কাজ করতে পারি।

গাড়ি চালানো

আপনার কেয়ার টিম আপনাকে অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত গাড়ি চালাবেন

না। এটি সাধারনত ট্রান্সপ্লানেটের পর কিছু সপ্তাহের মধ্যে হয়।
আপনার কেয়ার টিমকে জিজ্ঞাসা করুন, আপনি কখন আবার গাড়ি
চালাতে পারবেন।

যাতায়াত

আপনার ট্রান্সপ্লানেটের দিন থেকে পর্থম 3 মাস, MSK-এর পরায় 1
ঘণ্টার কাছাকাছি দূরতেব্র মধ্যে থাকুন।

আপনার যদি বিমানে ভর্মণ করার পরিকল্পনা থাকে তাহলে আপনার
ট্রান্সপ্লান্ট টিমের সাথে কথা বলুন। বিমানে নিরাপদে ভর্মণ করার জন্য
আপনার প্লাটিলেটের পরিমাণ অবশ্যই যথেষ্ট থাকতে হবে।

আপনি যদি আপনার ট্রান্সপ্লানেটের পর পর্থম 2 বছরের মধ্যে দেশের
বাইরে ভর্মণ করার পরিকল্পনা করেন তাহলে আপনার ট্রান্সপ্লান্ট
টিমের সাথে কথা বলুন। তারা আপনার গন্তব্যের উপর ভিত্তি করে
বিদেশে থাকাকালীন সংকর্মণের ঝুঁকি কমাতে ভর্মণের ওষুধ বিষয়ক
একজন বিশেষজ্ঞের সাথে দেখা করার সুপারিশ করতে পারে।

যৌন স্বাস্থ্য

আপনি হাসপাতাল ত্যাগ করার আগে, পুনরায় যৌনমিলন শুরু করার বিষয়ে
আপনার ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করুন। আপনার এবং আপনার সঙ্গীর
জন্য এই সব পরশ্নের উত্তর জানাটা গুরুতব্পূর্ণ। যদি নতুন কোনো
পরশ্ন উদ্ভূত হয় তাহলে আপনি আপনার ফলো-আপ ভিজিটের সময়
সেগুলোর ব্যাপারে আলোচনা করতে পারেন।

যৌনমিলনের সময় নিজেকে সুরক্ষিত রাখা

আপনার ডাক্তার যতক্ষণ প্যরন্ত না আপনাকে বলছে যে আপনার
ব্লাড কাউন্ট এবং ইমিউন সিস্টেম সব্ভাবিক হয়েছে ততক্ষণ প্যরন্ত

নিম্নাক্ত সতকর্তাবলি অনুসরণ করুন:

- আপনার পেল্টলেট সংখ্যা ৫০,০০০ (৫০) এর নিচে থাকলে, শরীরের ভিতরে পর্বেশ করাতে হয় বা মিউকাস মেমবের্নের সংস্পর্শের আসতে হয় এমন ঘৌনমিলন এড়িয়ে চলুন। এর মধ্যে রয়েছে ঘোনিপথে, মৌখিক এবং পায়ুপথে ঘৌনতা বা আপনার ঘোনি বা মলদব্রারে আঙ্গুল, ভাইবের্ট্র বা ঘৌন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য খেলনা ঢোকানো।
- ঘোনিপথে, মুখে বা পায়ুপথে ঘৌনমিলনের সময় পর্তিবার লয়াটেক্স কনডম ব্যবহার করুন। যদি আপনি লয়াটেক্সের পর্তি অয়লাজির্ক হন, তবে আপনার সব্স্থিসেবা পর্দানকারীর সঙ্গে কথা বলুন। মনে রাখবেন, আপনার পেল্টলেট সংখ্যা ৫০,০০০ (৫০) এর বেশি না হওয়া পয়র্ন্ত ঘোনিপথ, মুখ, বা পায়ুপথে ঘৌন মিলন করবেন না।
- আপনার সঙ্গীর সরাব বা বীঘর আপনার মুখে পর্বেশের সম্ভাবনা তৈরি হলে, একটি পর্তিরোধক উপকরণ (কন্ডাম বা ডেন্টাল ড্যাম) ব্যবহার করুন।
- মুখের সংস্পর্শের মল আসতে পারে এমন কোন ঘৌন কায়রুকলাপে অংশ নেবেন না।
- যদি আপনার বা আপনার সঙ্গীর ঘৌনাঙ্গে সংকর্মণ থাকে অথবা আপনার মনে হয় আপনার ঘৌনাঙ্গে সংকর্মণ রয়েছে, তাহলে মিউকাস মেমবের্নের সংস্পর্শের আসে এমন ঘৌন মিলন করবেন না।

আলিঙ্গন করা, জড়িয়ে ধরা, মৃদু স্পর্শের করা এবং তবকে চুমবন্ন করা হলো অন্যান্য উপায় যেভাবে আপনি এই সময়ে আপনার সঙ্গীর সাথে ঘনিষ্ঠ হতে পারেন। চিকিৎসা চলাকালীন এবং চিকিৎসা পরবর্তী সময়ে ঘৌন সম্পর্কির্ত বিষয়ে আরও জানতে, পড়ুন:

- *Sex and Your Cancer Treatment* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/sex-cancer-treatment)
- *Sexual Health and Intimacy* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/sexual-health-and-intimacy)

আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটির (ACS) ক্যান্সার চিকিৎসা পরবরতী যৌনতা সম্পর্কিত আরও তথ্য এবং উপকরণ রয়েছে। এগুলি আপনার স্থানীয় ACS বা ACS ওয়েবসাইটের নিচের লিঙ্কগুলির মাধ্যমে বিনামূলে পাওয়া যায়।

- [ক্যান্সারে আকর্ণ্ত পরাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং যৌনতা](#)
- [ক্যান্সারে আকর্ণ্ত পরাপ্তবয়স্ক মহিলা এবং যৌনতা](#)

ডিমবাশ্য এবং জরায়ু নিয়ে জন্মগরহণকারী বয়ক্তিদের জন্য তথ্য ট্রান্সপ্লান্টের পরে, আপনার হতে পারে:

- তুলনামূলক কম মাসিক
- মাসিকহীনতা
- আপনার যৌনি এবং ভালভার শুষ্কতা এবং অসব্সিত (আপনার যৌনির বাইরের স্থান)

ভলভোভয়জাইনাল ময়েশ্চারাইজারগুলি আপনার যৌনি এবং ভালভার শুষ্কতা এবং অসব্সিত দূর করতে সহায়তা করে। এগুলিতে কোনো হরমোন থাকে না এবং বেশিরভাগ ওষুধের দোকানে বা ইন্টারনেটে কোনো পের্সকির্পশন ছাড়াই পাওয়া যায়। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় ভিটামিন ই ক্যাপসুল, Replens®, Hyalo GYN®, এবং K-Y® বর্যান্ড

LIQUIBEADS™। এই পণ্যগুলো ব্যবহার করার আগে আপনার BMT চিকিৎসকের সাথে কথা বলুন।

যৌন কির্যাকলাপের জন্য লুবির্কেন্টগুলি সাধারণত তরল বা জেল আকারে আসে। এগুলি আপনার শরীরের পরাকৃতিক তরলের সম্পূর্ণ হিসেবে ব্যবহার করা হয়, যেন যৌন সম্পর্কের সময় শুষ্কতা এবং ব্যথা কম হয়। যৌন কির্যাকলাপকে আরও আরামদায়ক এবং আনন্দদায়ক করতে আপনি এগুলি ব্যবহার করতে পারেন। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, Astroglide®, K-Y Jelly, এবং Pjur® Woman and Bodyglide (একটি সিলিকন-ভিত্তিক লুবির্কেন্ট)। আরো জানতে, পড়ুন *How To Use Your Incentive Spirometer* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/how-use-your-incentive-spirometer)। এই পণ্যগুলো ব্যবহার করার আগে আপনার BMT চিকিৎসকের সাথে কথা বলুন।

আপনার চিকিৎসার উপর ভিত্তি করে, আপনার ডিমবাশয়ের কায়রকারিতা পরিবর্তিত হতে পারে। এর ফলে ইস্ট্রাজেনের মাতরা হরাস পেতে পারে। আপনার ডাক্তার আপনার টর্নস্প্লানেটের পরে ইস্ট্রাজেনযুক্ত সাপিলমেন্ট গ্রহণ করার পরামর্শ দিতে পারেন।

যদি এই বিষয়গুলোতে সাহায্য বা সহায়তার পর্যোজন হয়, আপনার ডাক্তার আপনাকে মহিলা যৌনরোগ বিশেষজ্ঞ (মেডিসিন) এবং উইমেন্স হেলথ পেরাগরাম বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠাতে পারেন। আপনি 646-888-5076 নম্বরে ফোন করে সরাসরি পেরাগরামের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

অণ্ডকোষ নিয়ে জন্মগ্রহণকারী ব্যক্তিদের জন্য তথ্য আপনার টর্নস্প্লানেটের পর যৌন আকাঙ্ক্ষা কমে যেতে পারে। এটি আপনার সম্পর্কের উপর পর্ভাব ফেলতে পারে। তবে, আপনি যখন

নিজের শক্তি ফিরে পাবেন এবং আপনার কির্যাকলাপ বাড়বেন, আপনার ঘৌন আকাঙ্ক্ষাও বাড়বে।

আপনার ট্রান্সপ্লানেটের পরে আপনার ইরেক্টাইল ডিসফাংশন (ED) হতে পারে। সিলডেনাফিল সাইটের্ট (ভায়াগ্রা[®]) বা ট্যাঙ্ডালাফিল (সিয়ালিস[®]) এর মতো ওষুধ দিয়ে ED-এর চিকিৎসা করা যেতে পারে। ED-এর চিকিৎসা করার আরো অনেক উপায় আছে।

যদি এই বিষয়গুলোতে সাহায্য বা সহায়তার পর্যোজন হয়, আপনার ডাক্তার আপনাকে আমাদের পুরুষদের সেক্সুয়াল এবং রিপ্রোডাকটিভ মেডিসিন পেরাগ্রাম বিশেষজ্ঞের কাছে পাঠাতে পারেন। আপনি 646-888-6024 নম্বরে ফোন করে সরাসরি পেরাগ্রামের সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

মদযুক্ত এবং তামাক ব্যবহার

ট্রান্সপ্লানেটের পরে, আপনার অঙ্গগুলো সব্বাভাবিক হওয়ার জন্য সময় পর্যোজন। অ্যালকোহল আপনার লিভার এবং সব্বাভাবিক করা অস্থি মজ্জার ক্ষতি করতে পারে। এই ক্ষতি আরও বাড়তে পারে যদি আপনি যক্তকে ক্ষতিগ্রস্ত করে এমন ওষুধ ব্যবহার করেন। যতক্ষণ না আপনার ডাক্তার আপনাকে বলে যে অ্যালকোহল পান করা নিরাপদ ততক্ষণ এটি পান করবেন না।

কখনোই ধূমপান করবেন না:

- সিগারেটস
- সিগার
- মারিজুয়ানা

- তামাকজাত অন্যান্য দর্বস্য

এসবের কারণে ফুসফুসে মারাত্মক সংকর্মণ হতে পারে। এছাড়াও এটি আপনার দ্বিতীয়বার ক্ষান্সারের ঝুঁকি বাড়িয়ে দিতে পারে।

MSK-এর নিজসব্বি শেষজ্ঞ আছে যারা আপনাকে ধূমপান ত্যাগ করতে সাহায্য করতে পারেন। আমাদের তামাকজনিত চিকিৎসা কর্মসূচি সম্পর্কের আরও জানতে, 212-610-0507 নম্বরে কল করুন, অথবা www.msk.org/tobacco ওয়েবসাইটে যান।

ফলো-আপ যত্ন

আপনার ডিসচার্জের আগে আপনার ফলো-আপ ভিজিট নির্ধারিত হবে। সব্বাবিকভাবে, আপনার ট্রান্সপ্লানেটের পর্থম 3 মাসের জন্য আপনাকে সপ্তাহে কমপক্ষে 1 থেকে 2 বার দেখা হবে। এরপর, আপনি সুস্থ থাকলে আপনার পরবর্তী অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো আরও বেশি সময় পর পর হবে।

যদি আপনি ইমিউনোসপের্সিভ ওষুধ গর্হণ করেন, তবে আপনার ডাক্তারের অন্য কোনো নির্দেশনা না থাকলে, ফলো-আপ ভিজিটের দিনগুলোর সকালে ওষুধটি নেবেন না। আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্ট ডোজটি নিয়ে আসুন। আপনার অ্যাপয়েন্টমেন্টের সময়, আপনার রকেত ওষুধের মাত্রা জানতে আপনার রক্ত নেওয়া হবে। তারপরে, একজন স্টাফ সদস্য আপনাকে ওষুধ খেতে বলবেন।

ফলো-আপ ভিজিটের জন্য ক্লিনিকে আসলে সবরদাই একটি সাজিরক্ষাল মাস্ক পরুন।

একটি MSK MyChart অ্যাকাউন্ট তৈরি করা থাকলে তা আপনার ফলো-

আপ অ্যাপযেন্টমেন্টের টর্যাক রাখতে সহায়ক হতে পারে। MSK MyChart হল MSK-এর রোগীর পোটরাল। ওয়েবসাইটের এই পেজটি ব্যক্তিগতভাবে ব্যবহারের জন্য, এটাতে শুধুমাত্র আপনার অ্যাপযেন্টমেন্ট, ল্যাব এবং রেডিওলজি পরীক্ষার ফলাফল সংকরণ্ত তথ্য এবং আপনার কেয়ার টিমের সাথে যোগাযোগের জন্য একটি অংশ রয়েছে।

কী আনতে হবে

যখন আপনি আপনার ফলো-আপ ভিজিটে আসবেন, তখন আপনার খাওয়া সমস্ত ওষুধের তালিকা, প্যাচ এবং কির্ম সহ, এবং প্রতিটির ডোজ সাথে আনুন। পুনরায় নেওয়া দরকার এমন ওষুধের একটি তালিকা তৈরি করুন। আপনার ফলো-আপ ভিজিটের আগে যদি আপনার কোনো ওষুধ শেষ হয়ে যায়, সেক্ষেত্রে আপনার অ্যাপযেন্টমেন্টের আগে আপনার ডাক্তারকে তা বলুন। আপনার ভিজিটের সময় আপনাকে পের্সকির্পশন দেওয়া হবে, যা আপনি MSK বা আপনার স্থানীয় ফামের্সিতে পুনরু করতে পারবেন।

আপনি আপনার সবরুশেষ ভিজিটের পর মনে পড়া পর্শনগুলোর একটি তালিকা নিয়ে আসলে তা সহায়ক হতে পারে।

কী আশা করতে পারেন

আপনার রকেতের পরিমাণ, ইলেকট্রোলাইটের স্তর, এবং ঘক্ত ও কিডনির কাষরক্ষমতা পরীক্ষা করতে রক্ত পরীক্ষা করা হবে। অস্থি মজ্জার অবস্থা পর্তি কয়েক মাসে সম্পন্ন করা হবে। এগুলো সাধারণত ট্রান্সপ্লান্টের 1, 3, 6, 12 এবং 24 মাসে করা হয়। পর্যোজনে, আপনার অস্থি মজ্জা আরো ঘনঘন বা আপনার ট্রান্সপ্লান্টের পরে দীঘর সময়ের জন্য পরীক্ষা করা যেতে পারে। অস্থি মজ্জার পরীক্ষাটি আপনার মজ্জার স্বাস্থ্য এবং বৃদ্ধি সম্পর্কের আমাদেরকে অবহিত

করেন।

আপনার যদি তীব্র লিউকেমিয়ার জন্য ট্রান্সপ্লান্ট করা হয় তাহলে আপনার লাম্বার পাংচার (স্পাইনাল ট্যাপস)-এর পর্যোজন হতে পারে। বিশেষ করে এটি সেইসব ব্যক্তির জন্য পর্যোজয় যাদের মেরুদণ্ডের তরলে লিউকেমিয়া ছিল বা হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। আপনার ট্রান্সপ্লান্টের পরে লাম্বার পাংচারের ফলে আপনার ডাক্তারকে আপনার মেরুদণ্ডের তরলে আরো কেমোথেরাপি দিতে দেয়। এছাড়াও আপনার কাছে থাকলে এটি একটি ওমায়া রিসাভর্যারের মাধ্যমে দেওয়া যেতে পারে।

অ্যানিটবায়োটিক এবং রক্ত সঞ্চালন সহ আপনার শিরায় চিকিৎসার পর্যোজন হতে পারে। যদি তা হয়, আপনার কেয়ার টিম আপনাকে কতদিন এবং কতবার তা পর্যোজন হবে, তা জানাবে। এই অ্যাপয়েন্টমেন্টগুলো সাধারণত আপনার ফলো-আপ ভিজিট অনুযায়ী একই সময়ে নির্ধারিত হবে।

আপনার ট্রান্সপ্লান্টের পরে কিছু ক্ষেত্রে, আমাদের সারভাইভারশিপ নাসর পর্যাকটিশনার ক্লিনিকে আপনাকে রেফার করা হতে পারে। একজন সারভাইভারশিপ নাসর পর্যাকটিশনার হলেন ট্রান্সপ্লান্ট টিমেরই অংশ। তারা আপনার কেয়ার টিমের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে আপনার আরোগ্য লাভে সহায়তা করে। এই নাসর পর্যাকটিশনার আপনার পরাথমিক যত্ন পর্দানকারীর সাথে সরাসরি যোগাযোগ বজায় রাখবে যাতে আপনার ট্রান্সপ্লান্ট সম্পর্কিত তথ্য আপনার সামগ্রিক সবস্থিয় সেবায় অন্তভুর্ক্ত করা হয়।

ভ্যাকসিন এবং টিকাদান

আপনার ট্রান্সপ্লান্টের পর, আপনি ছোটবেলায় যে টিকাগুলো

পেয়েছিলেন, তার থেকে সুরক্ষা হারিয়ে ফেলবেন। এর মানে হলো, আপনার ইমিউন সিস্টেম পুনরুদ্ধার হওয়ার পর আপনাকে আবার আপনার শৈশবের টিকাগূলো নিতে হবে। এটি সাধারণত ট্রান্সপ্লানেট্র পর্যায় ১ বছর পরে শুরু হয়।

আপনার টিকা গর্হণ নিরাপদ হলে আপনার ট্রান্সপ্লান্ট টিম আপনার টিকাদানের বয়সারে সাহায্য করবে, অথবা আপনাকে আমাদের টিকাদান ক্লিনিকের একজন নাসর পর্যাকটিশনার এর কাছে রেফার করা হতে পারে। টিকাগুলি MSK-তে দেওয়া যেতে পারে, অথবা আপনার NP আপনার পরাথমিক যত্ন পর্দানকারীকে সুপারিশকৃত টিকার একটি তালিকা দিতে পারে। কখনও কখনও পরাথমিক চিকিৎসা পর্দানকারীদের জন্য টিকা দেওয়া কঠিন হয়ে পড়ে, তাই আপনাকে MSK-তে টিকা নিতে হতে পারে।

দাঁতের যত্ন

ট্রান্সপ্লানেট পরে সুস্থ হলে, নিয়মিত পরীক্ষার জন্য আপনার স্থানীয় দন্তচিকিৎসকের কাছে যান। আপনার দাঁতে যদি অনেক বেশি সমস্যা হয় তাহলে আপনার কী করা উচিত তা সম্পর্কের আপনার ট্রান্সপ্লান্ট ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করুন। আপনার দাঁতের ডাক্তারের সাথে সমস্ত দাঁতের যত্ন পুনরায় কখন শুরু করাটা নিরাপদ হবে তা আপনাকে তারা বলবে।

নিম্নাক্ত ক্ষেত্রে আপনার ডাক্তার বা ডেনিট্স্টকে জানান:

- পয়মিডেরামেট (Aredia[®]) অথবা জোলেডেরানিক অ্যাসিড (Zometa[®]) ওষুধ গর্হণ করেছেন
- চোঘাল শক্ত হওয়া
- দাঁতে বয়স

- আপনার মাড়ির রেখার রঙ পরিবর্তন হওয়া
- মাড়ির ক্ষয় হওয়া

এমন কিছু সাধারণ ওষুধ যা এড়িয়ে চলা উচিত

আপনার ডাক্তার না বলা পয়র্ন্ত অ্যাসপিরিন, অ্যাসপিরিনযুক্ত কোনও ওষুধ এবং অন্যান্য সকল ননসেট্রায়েডাল অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি ড্রাগ (NSAIDs) খাবেন না। এই ওষুধগুলির তালিকার জন্য, পড়ুন *How To Check if a Medicine or Supplement Has Aspirin, Other NSAIDs, Vitamin E, or Fish Oil* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/common-medications-containing-aspirin-and-other-nonsteroidal-anti-inflammatory-drugs-nsaids)।

আপনি যেসব ওভার-দয়-কাউন্টার ওষুধ (পের্সকির্পশন ছাড়াই আপনি যে ওষুধ পান) খাওয়ার কথা ভাবছেন সেটার লেবেল পরীক্ষা করে দেখুন, যেন নিশ্চিত হতে পারেন এতে এমন উপাদান নেই যা আপনার এড়িয়ে চলা উচিত। কোন একটি নির্দিষ্ট ওষুধ সেবন করা নিরাপদ কিনা সেটা বুঝতে না পারলে, আপনার ট্রান্সপ্লান্ট টিমকে জিজ্ঞাসা করুন।

পর্থমে আপনার ট্রান্সপ্লান্ট টিমের সাথে কথা না বলে যেকোনো ভেষজ সাপ্লিমেন্ট বা ঘরোয়া পর্তিকার ব্যবস্থা গর্হণ করবেন না।

রিসোসর

MSK রিসোসর

রোগী ও পরিচয়রাকারীর শিক্ষা

www.msk.org/pe

আমাদের ভাচুর্যাল লাইবেরৰি অনুসন্ধান করতে রোগী ও পরিচয়রাকারীর

শিক্ষা ওয়েবসাইটটি দেখুন। সেখানে আপনি লিখিত আকারের শিক্ষামূলক বিষয়, ভিডিও এবং অনলাইন পেরাগরাম খুঁজে পেতে পারেন

যৌন সব্স্থ্য পেরাগরাম

ক্যান্সার ও ক্যান্সারের চিকিৎসা আপনার যৌন সব্স্থ্য, পর্জনন ক্ষমতা বা উভয়কেই পর্ভাবিত করতে পারে। MSK-কে এর যৌন সব্স্থ্য পেরাগরাম আপনার চিকিৎসার আগে, চিকিৎসা চলাকালীন বা পরে আপনাকে সহায়তা করতে পারে।

- আমাদের [ফিমেল সেক্সুাল মেডিসিন অ্যান্ড উইমেন্স হেলথ পেরাগরাম](#) যৌন সব্স্থ্য সমস্যা যেমন অকাল মেনোপজ বা পর্জনন ক্ষমতার সমস্যায় সাহায্য করতে পারে। আরো জানতে, আপনার MSK কেয়ার টিমের একজন সদসেয়ের কাছে রেফারেল চান অথবা 646-888-5076 নামব্যারে কল করুন।
- আমাদের [মেল সেক্সুাল অ্যান্ড রিপেরাডাক্টিভ মেডিসিন পেরাগরাম](#) যৌন সব্স্থ্য সমস্যা, যেমন ইরেক্টাইল ডিসফাংশন (ED) এ সহায়তা করতে পারে। আরো জানতে, আপনার কেয়ার টিমের একজন সদসেয়ের কাছে রেফারেল চান অথবা 646-888-6024 নামব্যারে কল করুন।

MSK তামাকজনিত চিকিৎসা কমর্সুচি

www.msk.org/tobacco

212-610-0507

ধূমপান বা অন্যান্য তামাকজাত দর্বয় ত্যাগ করার বিষয়ে তথ্যের জন্য কল করুন।

MSK ডেন্টাল সাভির্স

212-639-7644

স্থানীয়ভাবে দাঁতের জটিল চিকিৎসা করার আগে MSK-এর একজন দন্তচিকিৎসকের সাথে কথা বলতে কল করুন।

বাহ্যিক রিসোসর

MedicAlert Jewelry

www.medicalert.org

বের্সলেট এবং নেকলেস সহ MedicAlert গয়না সম্পর্কিত তথ্যের জন্য ভিজিট করুন।

আমেরিকান ক্যান্সার সোসাইটি (ACS)

www.cancer.org

800-227-2345 (800-ACS-2345)

ক্যান্সার সম্পর্কিত সাধারণ তথ্য পেতে তাদের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন।

আপনি ক্যান্সারে আকর্ণ্ত পরাপ্তবয়স্ক মহিলা এবং যৌনতা বা

ক্যান্সারে আকর্ণ্ত পরাপ্তবয়স্ক পুরুষ এবং যৌনতা পুস্তকাগুলির

মুদ্রিত কপির জন্যও ফোন করতে পারেন।

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

আরো রিসোসেৱৰ জনয় www.mskcc.org/pe-এ ভিজিট কৰে আমাদেৱ
ভাচুৱ্যাল লাইবেৱৰি দেখুন।

Leaving the Hospital After Your Allogeneic Stem Cell Transplant - Last updated on March 12, 2025

Memorial Sloan Kettering Cancer Center কতৃক সৱৰস্বত্ব সংৱিষ্ঠত