



রোগী এবং শুশরুষাকারীর শিক্ষা

নিউটেরাপিনিয়া (কম শেব্ত রক্ত কণিকার সংখ্যা)

নিউটেরাপিনিয়া (কম শেব্ত রক্ত কণিকা সংখ্যা) কী এবং আপনার নিউটেরাপিনিয়া হলে কীভাবে সংকর্মণ রোধ করতে হবে তা এই তথ্যটি আপনাকে ব্যাখ্যা করে।

নিউটেরাপিনিয়া পরসঙ্গে

নিউটেরাপিনিয়া (নিউ-টেরা-পি-নিয়া) তখন হয় যখন আপনার রক্তে কম সংখ্যক নিউটেরাফিল (এক ধরনের শেব্ত রক্ত কণিকা) থাকে। নিউটেরাফিল 500 কোষ/mm³-এর নিচে থাকলে নিউটেরাফিলের মাতরা কম বলে বিবেচিত হয়। নির্দিষ্ট ধরনের ক্যান্সারের চিকিৎসার পরে নিউটেরাপিনিয়া হওয়া সাধারণ ব্যাপার।

নিউটেরাফিল আপনার দেহকে সংকর্মণের বিরুদ্ধে লড়াই করতে সহায়তা করে। আপনার নিউটেরাপিনিয়া হলে আপনার সংকর্মণের ঝুঁকি বেশি থাকে। 100.4 °F (38.0 °C) বা তারও বেশিমাত্রার জব্র সাধারণত সংকর্মণের পর্থম লক্ষণ। সংকর্মণ রোধ করতে আপনার নিউটেরাফিল সংখ্যা সব্রাবিক না হওয়া পয়র্ন্ত আপনাকে অবশ্যই এই তথ্যসূত্রের নিদেরশাবলী অনুসরণ করতে হবে।

সংকর্মণের যেকোনো লক্ষণের জন্য এই তথ্যসূত্রে তালিকাভুক্ত লক্ষণগুলি দেখুন। আপনার যদি সংকর্মণের কোনো লক্ষণ বা উপসর্গ থাকে তবে আপনার সব্স্থ্যসেবা পর্দানকারীকে ফোন করুন। আপনার সব্স্থ্যসেবা পর্দানকারীর নিদেরশ অনুযায়ী আপনার তাপমাতরা মৌখিকভাবে (মুখ থেকে) নেওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করুন। এটি 100.4 °F (38 °C) বা তার বেশি হলে আপনার সব্স্থ্যসেবা পর্দানকারীকে ফোন করুন।

সুস্বাস্থ্যবিধির অভয়স করুন

যদি নিউটেরাপিনিয়া হয় তাহলে সুস্বাস্থ্যবিধি অনুসরণ করা গুরুত্বপূর্ণ। এই বিভাগের নিদেরশিকা অনুসরণ করুন। হাতের সব্স্থ্যবিধি সম্পর্কে আরো তথ্যের জন্য *Hand Hygiene and Preventing Infection* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/hand-hygiene-preventing-infection) পড়ুন

- তব্ক শুষ্ক হওয়া বা ফাটা পর্যবেক্ষণ করতে আপনার তবককে পর্যবেক্ষণ ময়শ্চারাইজ করুন।
- অ্যানিট্রিভ্যাকটেরিয়াল সাবান ব্যবহার করে আপনার হাত ধূয়ে নিন। এই ধরনের সাবান জীবাণু ধ্বংস করার ক্ষেত্রে বেশি উপযুক্ত।
 - আপনার হাত ধূতে, গরম পানি দিয়ে আপনার হাত ভিজিয়ে নিন এবং তারপরে কমপক্ষে 20 থেকে 30 সেকেন্ডের জন্য সাবান দিয়ে আপনার হাত ঘষুন। কলের গরম পানির নিচে হাত দিয়ে ভালো করে ধূয়ে নিন। একটি পরিষ্কার কাগজের তোঢ়ালে দিয়ে আপনার হাত শুকিয়ে নিন।
- করমদরনের পরে এবং অল্প ব্যস্ক শিশুদের সংস্পর্শের আসার পরে অ্যালকোহল ভিত্তিক হ্যান্ড স্যানিটাইজার (যেমন Purell®) ব্যবহার করুন।
 - অ্যালকোহল ভিত্তিক হ্যান্ড স্যানিটাইজার ব্যবহার করতে, দুটো হাতে সম্পূর্ণরূপে হ্যান্ড স্যানিটাইজার লাগান এবং 20 থেকে 30 সেকেন্ড পর্যবেক্ষণ করুন।
- নিম্নলিখিত সহ বেশি সংস্পর্শের ঘটে এমন প্রত্যন্ত স্পর্শের করার পরে অ্যালকোহল-ভিত্তিক হ্যান্ড স্যানিটাইজার বা অ্যানিট্রিভ্যাকটেরিয়াল সাবান দিয়ে আপনার হাত ধূয়ে নিন:
 - ATM সমূহ।
 - দরজার হাতল।
 - টেলিফোন।
 - লিফটের বোতাম।
 - কম্পিউটারের কীওয়াডর।
- পর্যবেক্ষণ খাবার খাওয়ার পরে দাঁত মেজে নিন। অতি-নরম টুথবেরাশ ব্যবহার করুন। আরো তথ্যের জন্য “আপনার মুখের যত্ন নেওয়া” বিভাগটি *Allogeneic Stem Cell Transplant: A Guide for Patients & Caregivers* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/allogeneic-stem-cell-transplantation)-তে পড়ুন

কীভাবে সংকর্মণ পর্যবেক্ষণ করবেন

আপনি সংকর্মণ রোধ করতে পারেন এমন কয়েকটি উপায় এখানে রয়েছে:

- সদির্লেগেছে বা সম্পর্কি সংকর্মণ হয়েছে এমন অতিথিদের সংস্পর্শ এড়ান।
- বাইরে জনসমাগম স্থলে গেলে, গণপরিবহন ব্যবহার করলে বা জনাকীণর অঞ্চলে থাকলে মাস্ক পরুন। এটি আপনাকে সদির্বা অন্যান্য শব্দসের সংকর্মণ থেকে রক্ষা করতে সহায়তা করবে।

- জরুরি নয় এমন কোনো দাঁত সংকরান্ত চিকিৎসা বা পদ্ধতি করাবেন না। কোনো পদ্ধতি করানোর আগে আপনার সব্স্থিয়্সেবা পর্দানকারীর সাথে কথা বলুন।
- আপনার সব্স্থিয়্সেবা পর্দানকারীকে জিজ্ঞাসা করুন আপনি এগুলি করতে পারবেন কিনা:
 - তুলার পটিট ব্যবহার করা।
 - ডেন্টাল ফ্লস ব্যবহার করা।
 - সাপোজিটরি (দর্বীভূত হয় এমন শক্ত ওষুধ) ব্যবহার করা।
 - এনিমা নেওয়া।
 - ঘোন কির্যায় অংশ নেওয়া।
- কাঁচা মাংস, কাঁচা মাছ বা কাঁচা ডিম খাবেন না। আপনার নিউট্রোপিনিয়া থাকলে খাদ্য সুরক্ষা নিদেরশিকা সম্পর্কের আরো তথ্যের জন্য তথ্যসূত্র *Food Safety During Cancer Treatment* (www.mskcc.org/cancer-care/patient-education/food-safety-during-cancer-treatment)-টি পড়ুন।
- আপনার কাঁটাচামচ, চামচ, কাপ বা আপনি খাওয়া বা পান করার জন্য ব্যবহার করেন এমন কোনো কিছু ভাগাভাগি করবেন না।
- আপনার সব্স্থিয়্সেবা পর্দানকারীর অনুমোদন ছাড়া ময়নিকিউর, পেডিকিউর, ওয়াকিসং বা উলকি করবেন না।
- আপনার মাথা শেভ করবেন না। আপনার শরীরের অন্য কোনো অংশ শেভ না করার চেষ্টা করুন। যদি শেভ করতেই হয় তবে বৈদ্যুতিক রেজার ব্যবহার করুন।
- কোনো পশুকে স্পর্শ করার পরে আপনার হাত ধূয়ে নিন।
- কোনো পশুর বজায় পদাথর (যেমন লিটার বক্স, ফিশ ট্যাঙ্ক বা পোষেয় খাঁচা) স্পর্শ করবেন না।
- বাগান করবেন না, মাটি, শুকনো ফুল বা তাজা ফুল নাড়াচাড়া করবেন না।
- আপনার সব্স্থিয়্সেবা পর্দানকারীর সাথে এমন শটগুলির বিষয়ে কথা বলুন যা আপনি সংকরমণ পর্তিরোধে সহায়তার জন্য পেতে পারেন (যেমন ফ্লু শট)।

কখন আপনার সব্স্থিয়্সেবা পর্দানকারীকে ফোন করতে হবে

আপনার যদি সংকরমণের নিম্নলিখিত লক্ষণগুলির কোনোটি থাকে তবে আপনার সব্স্থিয়্সেবা পর্দানকারীকে ফোন করুন:

- 100.4 °F (38 °C) বা এর বেশি জব্র।
- শীতে কাঁপা।
- বমি বমি ভাব এবং বমি (বমি করে ফেলা) যেটির নিরাময় হচ্ছে না।
- মুখমণ্ডল লাল হয়ে যাওয়া।
- ঘেমে যাওয়া।
- কাশি।
- হালকা মাথাবয়স্থা বা মাথা ঘোরা।
- ডায়রিয়া (তরল বা পানির মতো মলত্যাগ)।
- কোষ্ঠকাঠিন্য (সব্ভাবিকের তুলনায় কম মলত্যাগ)।
- মুখে ঘা।
- মাথাবয়স্থা।
- নতুন বয়স্থা।
- খিটখিটে ভাব।
- মূত্রর্ত্যাগের (পরস্রাব) সময় বয়স্থা বা জব্লাপোড়া।
- ক্লান্তি বোধ করা, বিশেষত আপনার যদি ফ্লুয়ের মতো কোনো উপসর্গও থাকে (যেমন জব্র, গলা বয়স্থা বা ঠাণ্ডা লাগা)।

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

আরো রিসোসেরুর জন্য www.mskcc.org/pe-এ ভিজিট করে আমাদের ভাচুর্যাল লাইবেরুরি দেখুন।

Neutropenia (Low White Blood Cell Count) - Last updated on December 11, 2023
Memorial Sloan Kettering Cancer Center কতৃক সবর্সব্রত্ব সংরক্ষিত