



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Instrucciones para el alta después del tratamiento con 3F8 o Hu3F8

Esta información explica cómo cuidar de su hijo después del tratamiento de inmunoterapia con 3F8 o Hu3F8. Para el resto de este recurso, cuando utilizamos la palabra “usted” y “su” nos referimos a usted o su hijo.

Recientemente recibió el tratamiento de inmunoterapia con 3F8 para ayudar a tratar el neuroblastoma u osteosarcoma. Aunque la mayoría de los efectos secundarios relacionados con este tratamiento habitualmente no duran más de la semana del tratamiento, existe la posibilidad de que experimente algunos efectos secundarios después del alta.

## Información de contacto

Por cualquier problema que surja durante el horario de atención, llame a su médico principal en Memorial Sloan Kettering (MSK) de lunes a viernes de 8:00 AM a 6:00 PM.

Doctor: \_\_\_\_\_ Teléfono: \_\_\_\_\_

Después del horario de atención, durante los fines de semana y días festivos, llame al 212-639-2000 y pida hablar con el becario de pediatría que está de guardia.

## Centro de Atención de Urgencias

Quizás necesite ir al Centro de Atención de Urgencias Pediátricas (UCC, por sus siglas en inglés) de MSK dependiendo del problema que esté experimentando. El UCC está ubicado en el 9<sup>no</sup> piso del Memorial Hospital. Tome los elevadores M hasta el 9<sup>no</sup> piso y regístrese en la recepción de M9. La entrada más cercana está ubicada en 1275 York Avenue. Esta entrada está abierta las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

# Efectos secundarios comunes

## Dolor

El efecto secundario más común de la terapia con 3F8 o Hu3F8 es el dolor. Aunque el dolor habitualmente es más severo durante el tratamiento, puede haber dolor después del alta. Cuánto dolor se siente varía de una persona a otra.

Cosas para recordar:

- Para prepararse para cualquier dolor que pueda experimentar después del alta, asegúrese de tener el medicamento para el dolor que el proveedor de atención médica le recete antes de salir del hospital.
- **No** tome acetaminofeno (Tylenol®) o ibuprofeno (Advil® o Motrin®) para aliviar el dolor a menos que se lo indique el proveedor de atención médica.
- Tome el medicamento para el dolor solo como se lo indicaron. Si el medicamento no está controlando el dolor o si tiene efectos secundarios (constipación, náusea, somnolencia excesiva o picazón) debido al medicamento, llame al médico.

La dosis siguiente de medicamento para el dolor puede darse a las: \_\_\_\_ am / pm

Nombre del medicamento: \_\_\_\_\_

Cantidad de medicamento: \_\_\_\_\_ cada \_\_\_\_\_ horas según sea necesario para el dolor.

## Reacciones alérgicas

Usted puede tener una reacción alérgica al tratamiento de inmunoterapia con 3F8 en forma de erupciones, enrojecimiento e hinchazón. Estas reacciones pueden suceder en cualquier momento entre los tratamientos. El proveedor de atención médica puede recetarle un medicamento para ayudarle.

Cosas para recordar:

- Para prepararse para cualquier reacción alérgica que pueda tener después del alta, asegúrese de tener el medicamento antihistamínico que el proveedor de atención médica le recetó, como hidroxicina (Vistaril®) o difenhidramina

(Benadryl®), antes de salir del hospital.

La dosis siguiente de antihistamínico puede darse a las: \_\_\_\_\_ am / pm

Nombre del medicamento: \_\_\_\_\_

Cantidad de medicamento: \_\_\_\_\_ cada \_\_\_\_\_ horas según sea necesario para los síntomas de alergia.

## Fiebre

Puede tener fiebre (temperatura de 100.4° F (38° C) o más) después del tratamiento. La fiebre puede estar relacionada con el tratamiento o un signo de infección, por lo tanto es importante llamar al médico para recibir instrucciones adicionales.

Una vía central, o catéter venoso central, es como una vena artificial. Hará más fácil para el equipo de atención médica de su salud tener acceso a los vasos sanguíneos para medicamentos y pruebas. Las vías centrales pueden acumular bacterias y ocasionar infección. Si tiene una vía central y tiene temperatura de 100.4° F (38° C) o más, o tiene enrojecimiento, hinchazón o sensibilidad en el sitio del catéter, llame al médico tan pronto como sea posible.

¿Tiene su hijo una vía central (MediPort®, Broviac®, PICC)? SÍ / NO

**Consulte el área de comentarios a continuación para conocer más instrucciones:**

---

---

# Problemas para ir al baño

Puede estar constipado o tener problemas para orinar. Es un efecto secundario común de muchos medicamentos para el dolor. El médico puede recetarle medicamentos para ayudarlo a orinar y mover el intestino.

Qué puede hacer:

- Trate de usar el baño dejando correr el agua del grifo. Esto puede ayudarlo a orinar.
- Aplique un paño húmedo caliente sobre el estómago, debajo del ombligo, para estimular la micción.
- Beba abundante líquido.
- Siga las instrucciones del médico para el manejo de la constipación

# Náusea y vómitos

Usted puede experimentar algunas náuseas y vómitos cuando salga del hospital para ir a casa. El médico puede recetarle un medicamento contra las náuseas para ayudarlo.

La dosis siguiente de medicamento contra las náuseas puede darse a las: \_\_\_\_\_ am /

pm Nombre del medicamento: \_\_\_\_\_

Cantidad del medicamento: \_\_\_\_\_ cada \_\_\_\_\_ horas según sea necesario para las náuseas.

# Regresar a la Clínica

Regrese a la clínica el \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_ am / pm para \_\_\_\_\_.

# Llame al médico o enfermera si:

- No ha orinado en \_\_\_\_\_ horas o más
- No ha tenido una evacuación intestinal en \_\_\_\_\_ días
- Tiene dolor que no mejora o empeora después de tomar el medicamento

- Tiene náusea o vómitos no controlados
- Vomita cada vez que bebe algo. Esto puede ocasionar deshidratación. Tiene un dolor de cabeza repentino que no desaparece
- Usted observa cambios en el estado de ánimo o comportamiento que le resultan preocupantes
- Tiene tos constante

## Vaya a la UCC o llame al 911 si tiene:

- Temperatura de 100.4° F (38° C) o más
- Falta de aliento
- Dificultad para respirar
- Enrojecimiento, hinchazón o sensibilidad en el sitio del catéter
- Hinchazón de los labios, la lengua o garganta

## Otras instrucciones

---

---

---

Si tiene algunas preguntas o inquietudes, hable con un miembro del equipo de atención de su salud. Puede comunicarse con ellos de lunes a viernes de 9:00 AM a 5:00 PM al \_\_\_\_\_. Después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y días festivos, llame al \_\_\_\_\_. Si no se indica un número o no está seguro, llame al 212-639-2000.

---

©2016 Memorial Sloan Kettering Cancer Center