

Cuidado de una extravasación supuesta o real

Extravasación es cuando una droga se escapa de una vena y pasa al tejido que la rodea. Esto puede dar como resultado irritación en la piel, vejigas y heridas abiertas. Usted recibe esta información porque hay probabilidad de que parte de la quimioterapia que recibió haya escapado hacia su tejido. Para reducir cualquier dolor e irritación, siga las instrucciones a continuación. Una enfermera le llamará regularmente para evaluar el lugar.

Cuidado del lugar

- Aplique una compresa al lugar 4 a 5 veces diarias por las siguientes 48 horas.
 - Deje la compresa en el lugar por 20 minutos cada vez. Esto disminuirá la hinchazón y la incomodidad. Puede reducir la irritación del tejido.
- Eleve el área afectada en una almohada con tanta frecuencia como pueda por las siguientes 24 a 48 horas.
 - Esto ayudará a disminuir la hinchazón y a mejorar el flujo de sangre al área.
- Después de bañar el lugar con un jabón suave, seque el lugar con delicadeza. No lo sumerja en nada.
- Si le dieron medicina, aplíquela en el lugar tal como le indicaron.
- No aplique ninguna loción, crema o ungüento al lugar a no ser que le hayan pedido que lo haga.
- Cubra el área antes de salir para protegerla de la luz del sol.
- Evite ponerse ropa apretada y ropa que irrite el área.
- No haga masajes en el área.

Control

Una enfermera le llamará el día siguiente a la extravasación supuesta o real, y después de eso una vez a la semana durante 3 a 6 semanas. Es importante que tengamos un número de teléfono en donde podamos ubicarlo. Si pierde la llamada, llame a la enfermera al _____.

Llame a su médico o enfermera si usted:

- Nota algún cambio en el lugar, tal como:
 - Aumento en el dolor.
 - Aumento en el enrojecimiento, o decoloración de la piel.
 - Aumento en la hinchazón.
 - Cualquier piel rota tal como vejigas, o drenaje de fluido.
 - Entumecimiento, cosquilleo o cambio en la sensibilidad de la mano o del brazo.
 - Siente la piel caliente al tacto.
- Tiene problemas para mover el área (ej., doblar su brazo).
- Desarrolla una fiebre de 100.4 °F (38 °C) o superior.
- Tiene preguntas o inquietudes.

