Guía para emergencias para pacientes ambulatorios de la terapia celular

Instrucciones:

Para emergencias graves (donde la vida está en peligro):

1. **Llame al 911.** No traslade al paciente sin el apoyo de los Servicios Médicos de Emergencia (EMS).
2. Los Servicios Médicos de Emergencia lo llevarán al hospital más cercano para que reciba atención de inmediato. **Esto es apropiado** y es lo que se espera: su seguridad es la prioridad y nuestro equipo puede coordinar la atención con dicho hospital según sea necesario.

Para emergencias menos graves (donde la vida no está en peligro):

1. Lleve al paciente al Centro de Atención de Urgencia de MSK (UCC).
2. Cuando llegue, dígale a un miembro del personal del UCC que el paciente es un paciente de terapia celular.

Dirección del Centro de Atención de Urgencia (UCC) de MSK:

- Entre las 6 am y la medianoche, ingrese por 425 E. 67th St. (entre las avenidas 1st y York).
- En todos los demás horarios, ingrese por 1275 York Ave. (entre la calle East 67th y la calle East 68th). Pida indicaciones en el mostrador de seguridad.

Para casos que no son emergencias:	Llame a Terapia Celular (Cellular Therapy) al 646-608-3150 (disponible 24/7).
Oncólogo de terapia celular	
Fecha de la infusión de terapia celular:	

Memorial Sloan Kettering Cancer Center

	Emergencias graves: Llame al 911	**Emergencias menos graves:** Vaya al UCC de MSK	**No emergencias:** Llame a Terapia Celular al 646-608-3150	
Estado de alerta	• No despierta • De repente no puede mover los brazos o las piernas • Convulsiones (sacudidas incontrolables o rigidez del cuerpo)	• Cambio repentino en la visión	• Mareos • Temblores o inestabilidad • Cambios de humor • Cambios en el nivel de energía • No puede dormir • Nueva confusión o más confusión de lo habitual	• Problemas para encontrar palabras • Cambios en el nivel de alerta • Entumecimiento u hormigueo • No puede moverse • Dificultad con la deglución
Sangrado		• Sangrado que no se detiene	• Vómitos con sangre • Sangrado nasal que no se detiene • Orina (pis) con sangre • Heces (caca) negras y oscuras como alquitrán (pegajosas)	• Uso de 1 o más toallas femeninas por hora • Petequias (pequeñas manchas rojas o moradas en la piel) • Sangrado nuevo o más sangrado de lo normal
Azúcar en la sangre		• El nivel de azúcar en la sangre es inferior a 50 • El nivel de azúcar en la sangre es superior a 400 • Dificultad para despertar	• El azúcar en la sangre está entre 50 y 400	
La respiración	• No respira • Dificultad para respirar • Ahogamiento		• Sibilancias (silbidos o chiflido al respirar) • Se queda sin aire (falta de aire) más fácilmente con muy poca actividad	• Tos nueva o tos que no desaparece • Tos con sangre o mucosidad verde o amarilla • Problemas para respirar al estar acostado
Catéter venoso central (CVC)		• Vía abierta al aire y dificultad para respirar. **Sujete la vía con una pinza de inmediato.** • Vía rota o con fugas • Se cayó la vía	• No se puede lavar el catéter • Drenaje del sitio de inserción • Dolor en el sitio de inserción • Hinchazón, enrojecimiento o sensibilidad en el sitio de inserción • Hinchazón de la cara o el cuello	
Diarrea (caca suelta o aguada)		• Diarrea constante y no controlada	• Comienza a tener diarrea y calambres abdominales (en la panza) • Pastillas enteras eliminadas en las heces (la caca)	

	Emergencias graves: Llame al 911	**Emergencias menos graves:** Vaya al UCC de MSK	**No emergencias:** Llame a Terapia Celular al 646-608-3150
Caídas	• Cambio en el conocimiento después de la caída	• Golpe en la cabeza durante la caída	• No se golpeó la cabeza durante la caída • Se cayó en casa • No hubo cambios en el conocimiento después de la caída
Fatiga (sentir más cansancio o debilidad que de costumbre)	• No despierta		• Mareos • Demasiado cansado para salir de la cama o caminar al baño
Fiebre o escalofríos		• Fiebre de 100.4 °F (38 °C) o más, al tomar la temperatura por vía oral • Escalofríos y temblores (la temperatura puede ser normal)	• Síntomas de resfriado (secreción nasal, ojos llorosos, estornudos, tos)
Dolor en la boca (mucositis)	• No respira • Dificultad para respirar		• Sangre roja brillante dentro de la boca • Dificultad con la deglución • Manchas blancas o llagas en las encías, en los labios o dentro de la boca • Dolor que no se alivia después de tomar analgésicos
Vómitos o náuseas (sensación de que va a vomitar)		• Dolor de estómago muy fuerte • Sangre o sustancia similar a “granos de café” en el vómito • Náuseas y vómitos constantes e incontrolables	• No puede tomar medicamentos sin vomitar • Las náuseas no se detienen después de tomar medicamentos contra las náuseas
Dolor	• Dolor de pecho muy fuerte • Opresión o presión muy fuerte en el pecho	• Dolor de cabeza repentino que es muy doloroso	• Dolor nuevo o no controlado • Corazón que late rápido • Sensación de “aleteo” del corazón • Ardor en el pecho o el estómago • Dolor o ardor al orinar o defecar (al hacer pis o hacer caca) • Dolor en el sitio de inserción del catéter venoso central (CVC) • Dolor cuando se administran medicamentos o líquidos a través del CVC
Tiene sarpullido			• Nueva erupción cutánea • Sarpullido con dolor, picazón o ambos
Inflamación	• Dificultad para respirar	• Hinchazón en la garganta	• Hinchazón en piernas, brazos o manos • Hinchazón repentina con o sin dolor
Orina			• Orina (pis) con sangre • Dolor o ardor al orinar (hacer pis) • No puede orinar (hacer pis) durante más de 8 horas