

Guía para emergencias en trasplantes de médula ósea

	Emergencias Llame al 911	No emergencias	
Estado de alerta	<ul style="list-style-type: none"> • Imposibilidad para despertar • Convulsiones • Cambio repentino en la visión • Incapacidad repentina para mover los brazos o las piernas 	<ul style="list-style-type: none"> • Mareos • Temblores o estremecimientos • Cambio en el estado de ánimo • Cambio en el nivel de energía • Dificultad para dormir 	<ul style="list-style-type: none"> • Aumento o aparición reciente de confusión • Cambio en el nivel de alerta • Letargia (movimientos lentos) • Entumecimiento u hormigueo • Incapacidad para desplazarse • Dificultad para tragar
Sangrado	<ul style="list-style-type: none"> • Sangrado incontrolable • Imposibilidad para despertar 	<ul style="list-style-type: none"> • Vómitos de sangre • Sangrado por la nariz que no se detiene • Orina con sangre • Diarrea con sangre 	<ul style="list-style-type: none"> • Usar 1 o más toallas sanitarias por hora • Pequeñas manchas rojas o moradas en la piel • Aumento o aparición reciente de sangrado
Azúcar en la sangre	<ul style="list-style-type: none"> • Mayor a 400 • Menor a 50 	<ul style="list-style-type: none"> • Dificultad para despertar 	<ul style="list-style-type: none"> • Azúcar en la sangre entre 50 y 401
Respiración	<ul style="list-style-type: none"> • Sin respiración • Dificultad respiratoria • Ahogo 	<ul style="list-style-type: none"> • Sibilancias al respirar • Pierde el aliento con más facilidad con actividad mínima 	<ul style="list-style-type: none"> • Tos persistente o de aparición reciente • Tos con sangre o secreciones verdes o amarillas • Dificultad respiratoria al permanecer acostado
Catéter central	<ul style="list-style-type: none"> • Catéter abierto al aire y dificultad para respirar - pinzar el catéter inmediatamente 	<ul style="list-style-type: none"> • Catéter roto o con fugas • Caída del catéter • Incapacidad para limpiar el catéter • Drenaje del sitio 	<ul style="list-style-type: none"> • Dolor en el sitio • Hinchazón de la cara o el cuello • Hinchazón, enrojecimiento o sensibilidad en el sitio
Diarrea	<ul style="list-style-type: none"> • Diarrea incontrolable 	<ul style="list-style-type: none"> • Diarrea de aparición reciente y calambres abdominales 	<ul style="list-style-type: none"> • Pastillas enteras que pasan en las heces
Caídas	<ul style="list-style-type: none"> • Cambio en el conocimiento después de la caída • Golpe en la cabeza al caer 	<ul style="list-style-type: none"> • No sufrió golpe en la cabeza al caer • Caídas en el hogar 	<ul style="list-style-type: none"> • No presentó cambios en el conocimiento después de la caída
Fatiga	<ul style="list-style-type: none"> • Imposibilidad para despertar 	<ul style="list-style-type: none"> • Mareos 	<ul style="list-style-type: none"> • Cansancio excesivo para salir de la cama o para ir al baño
Fiebre o escalofríos	<ul style="list-style-type: none"> • Temperatura oral de 100.4° F (38° C) o más 	<ul style="list-style-type: none"> • Síntomas de resfriado (secreción nasal, ojos llorosos, estornudos, tos) 	<ul style="list-style-type: none"> • Escalofríos con temblores, la temperatura puede ser normal
Dolor en la boca (mucositis)	<ul style="list-style-type: none"> • Sin respiración • Dificultad respiratoria 	<ul style="list-style-type: none"> • Sangre roja brillante en la boca • Dificultad para tragar 	<ul style="list-style-type: none"> • Parches blancos o llagas en las encías, boca o labios • Dolor que no cede con los medicamentos
Náuseas o vómitos	<ul style="list-style-type: none"> • Dolor abdominal intenso 	<ul style="list-style-type: none"> • Vómitos y náuseas constantes y sin control • No puede mantener los medicamentos en el estómago 	<ul style="list-style-type: none"> • Vómitos con sangre o con material con apariencia a café molido • Los medicamentos contra la náusea no la controlan
Dolor	<ul style="list-style-type: none"> • Dolor intenso en el pecho • Compresión o presión intensa en el pecho • Dolor de cabeza intenso y repentino 	<ul style="list-style-type: none"> • Dolor de aparición reciente o no controlable • Malestar en el pecho • Latidos cardíacos rápidos • Sensación de "aleteo" en el corazón • Dolor en el sitio del catéter central 	<ul style="list-style-type: none"> • Ardor en el pecho o en el estómago • Ardor al orinar o mover el intestino • Dolor al orinar o mover el intestino • Dolor con la infusión de medicamentos o líquidos en el catéter central
Erupción cutánea		<ul style="list-style-type: none"> • Erupción cutánea de aparición reciente 	<ul style="list-style-type: none"> • Erupción con dolor, picazón o ambas
Hinchazón	<ul style="list-style-type: none"> • Hinchazón en la garganta • Dificultad respiratoria 	<ul style="list-style-type: none"> • Hinchazón de las piernas, los brazos o las manos 	<ul style="list-style-type: none"> • Hinchazón repentina con o sin dolor
Al orinar		<ul style="list-style-type: none"> • Orina con sangre 	<ul style="list-style-type: none"> • Incapacidad para orinar durante más de 8 horas • Dolor o ardor al orinar

Lea la página siguiente para conocer las instrucciones.

Para emergencias

1. Llame al 911.

No transportar al paciente sin el apoyo de Servicios médicos de emergencia (EMS, por sus siglas en inglés).

2. Pida que lo lleven al Centro de Atención de Urgencias en el MSK.

1275 York Avenue

New York, NY 10065

- Entre las 6:00 AM y la medianoche, ingrese en 425 East 67th Street (entre York Avenue y First Avenue).
- A cualquier hora distinta entrar por 1275 York Avenue (entre 67th Street y 68th Street). Pida instrucciones en la recepción.

3. Identificar al paciente como un paciente de trasplante de médula ósea.

Para pacientes de trasplante que están en el hogar

Si está inscripto en el programa de Trasplante en el Hogar y tiene una emergencia, llame al Servicio de Emergencias SeniorCare al 718-430-9700.

Cuando llame, diga, “Hola, tengo una emergencia y necesito una ambulancia”. La persona que responda el teléfono puede hacerle algunas preguntas.

Si le preguntan...

Dícales...

“¿Cuál es la dirección de la emergencia?”

La dirección donde está usted.

“¿Dónde está ubicado el paciente?”

El número de la habitación, apartamento, piso u oficina.

“¿De qué número de teléfono está llamando?”

Su número de teléfono.

“¿Cuál es la naturaleza de la emergencia?”

El motivo por el que está llamando, como “El paciente tiene fiebre” o “El paciente tiene dificultad respiratoria”.

“¿A qué hospital se debería llevar al paciente?”

Centro de Atención de Urgencias de Memorial Sloan Kettering Cancer Center.

Cuando no es una emergencia

- Durante el día (entre las 8:00 AM y las 8:00 PM)
 - Llamar al 212-639-3122
 - Una enfermera profesional del Equipo Rojo o una enfermera hablarán con usted.
- De noche (entre las 8:00 PM y las 8:00 AM)
 - Llamar al 212-639-2000
 - Pida por el médico que cubre la guardia para Trasplante de Médula Ósea.