



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Evitar una reacción alérgica a un medio de contraste

Esta información ayudará a evitar una reacción alérgica a un medio de contraste que usted recibirá durante la tomografía computarizada que tiene programada.

Existen muchas razones por las cuales alguien podría tener una reacción a un medio de contraste. Su médico ha decidido que usted necesita tomar un medicamento para evitar o minimizar las probabilidades de tener una reacción. La mayoría de las personas toman un medicamento llamado prednisona. Si no puede tragar pastillas, dígaselo a su médico, quien le dirá qué hacer en cambio.

Usted tiene programada la tomografía computarizada el \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_ am | pm. Si el horario se cambia, ajuste los horarios en que tomará la prednisona. La primera dosis debe tomarla 13 horas antes de la tomografía computarizada, la segunda dosis 7 horas antes, y la tercera dosis, 1 hora antes.

- El médico quiere que usted tome 3 dosis de prednisona. Tome 1 tableta (50 mg) a las:  
 \_\_\_\_\_ am | pm (13 horas antes de la tomografía) el \_\_\_\_\_ (fecha)  
 \_\_\_\_\_ am | pm (7 horas antes de la tomografía) el \_\_\_\_\_ (fecha)  
 \_\_\_\_\_ am | pm (1 hora antes de la tomografía) el \_\_\_\_\_ (fecha)
- Si el médico quiere que tome cualquier medicamento adicional o algún medicamento en su lugar, el médico o enfermera escribirá el nombre del medicamento a continuación. Tome: \_\_\_\_\_ a las \_\_\_\_\_ am | pm, 1 hora antes de la tomografía programada.

## Notas

---



---



---

Si tiene algunas preguntas o inquietudes, hable con un miembro del equipo de atención de su salud. Puede comunicarse con ellos de lunes a viernes de 9:00 AM a 5:00 PM al \_\_\_\_\_. Después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y días festivos, llame al \_\_\_\_\_. Si no se indica un número o no está seguro, llame al (212) 639-2000.