



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Qué esperar después de su cirugía de la placa ocular

Esta información explica cómo cuidar el ojo después de la cirugía de la placa. En este documento las palabras "usted" y "su" se refieren a usted o su hijo.

La cirugía está programada para:

Después de la cirugía

Ahora que se extrajo su placa, usted puede estar rodeado de gente y que **no** será radiactivo.

Pregunte a su médico de atención primaria o especialista cuándo puede reanudar la toma de anticoagulantes (diluyentes de la sangre) y cualquier otro medicamento que se le instruyó dejar de tomar antes de la cirugía. Puede volver a tomar aceites de pescado, vitamina E y aspirina 48 horas después de la cirugía.

El cuidado de su ojo

Tendrá un apósito que cubrirá su ojo. Mantenga el apósito puesto durante 48 horas después de ser dado de alta, y luego retírelo. Mientras que el apósito esté puesto, solo dúchese del cuello hacia abajo. Puede ducharse como de costumbre después de quitar el apósito.

Su médico le dará una receta para unguento de _____ . Después de retirar el apósito, aplique el unguento 2 veces al día en el ojo hasta su cita de seguimiento. Si se le agota antes de su cita, consulte con su farmacia para recibir surtidos adicionales o llame a nuestro consultorio.

Efectos secundarios

Durante las primeras semanas después de la cirugía, el área alrededor del ojo puede presentar moretones e hinchazón. También puede presentar drenaje acuoso o rosado, una sensación "rasposa", y una leve molestia en la zona. Esto es normal y desaparecerá en el lapso de unos pocos días. También puede experimentar cierta visión doble, pero esto es menos probable.

Cita de seguimiento

Usted tendrá que programar su cita de seguimiento después del alta del hospital.

Programe su cita para _____ después de la cirugía.

Llame al consultorio de su médico en uno de los números que se indican en la sección "Información de contacto".

Llame a su médico o enfermera si presenta:

- Dolor que no se alivia con acetaminofeno (Tylenol®)
- Dolores de cabeza intensos
- Náuseas o vómitos
- Sangrado a través del apósito
- Secreción amarilla o verde

Si presenta una temperatura de 100.4 °F (38 °C) o más, llame a su médico de inmediato.

Información de contacto

Si tiene alguna pregunta o inquietud, comuníquese con su equipo de oftalmología. Puede comunicarse con ellos de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. en los números que se indican a continuación.

Consultorio de oftalmología para adultos: 212-744-1700

Consultorio de oftalmología pediátrica: 212-639-7232

Después de las 5:00 p.m., durante fines de semana y días festivos, llame al 212-639-2000 y pregunte por el oftalmólogo de guardia. Además, pueden intentar llamar a los números que se indican a continuación:

Doctor: _____ Teléfono:

Asistente médico: _____ Teléfono:

©2017 Memorial Sloan Kettering Cancer Center - Generated on April 4, 2017