

Información sobre la prueba de alergia a la penicilina

Un enfermero con capacitación en la prueba de alergia a la penicilina le hará la prueba. La prueba de detección de alergia que podría necesitar tiene tres pasos:

Paso 1: La prueba cutánea (también llamada prueba de punción)

Paso 2: La prueba intradérmica

Paso 3: La prueba de provocación (también llamada prueba de provocación oral).
Algunas personas solo se realizan la prueba de provocación.

Su proveedor de cuidados de la salud decidirá si usted necesita realizarse una parte de la prueba de alergia o las tres. Generalmente, la prueba tarda de una hora y media a dos horas.

Cómo prepararse para su prueba de alergia a la penicilina

Deje de tomar ciertos medicamentos

Su equipo de atención le dirá que deje de tomar ciertos medicamentos antes de su prueba de alergia como, por ejemplo, los antihistamínicos (medicamentos contra la alergia). Lea el folleto *Medicamentos que debe dejar de tomar antes de realizarse una prueba de alergia*. En este encontrará una lista de los antihistamínicos más comunes junto con otros medicamentos que debe dejar de tomar antes de su prueba de alergia. Puede encontrarlo en www.msk.org/pe/stop-medications-before-allergy-test-spanish o bien, solicitar una copia a su proveedor de cuidados de la salud.

Para tener en cuenta

- Lleve ropa suelta y cómoda el día en que vaya a realizarse la prueba de alergia. Puede que reciba algunas inyecciones debajo de la piel, por lo que le recomendamos usar una remera de mangas cortas de ser posible.
- Asegúrese de comer antes de su prueba de alergia o bien, lleve algún refrigerio para comer en su cita. Puede comer y beber normalmente. Comer antes de realizarse la prueba de alergia le ayudará a prevenir cualquier malestar estomacal como por ejemplo, calambres, gases e hinchazón.

Qué esperar durante la prueba de alergia a la penicilina

Paso 1: La prueba cutánea (prueba de punción)

Primero, el enfermero pondrá una gota de cada medicamento en su antebrazo: histamina, salino normal, penicilina G y Pre-Pen (véase la Figura 1). Luego, hará girar suavemente sobre su piel un dispositivo plástico filoso llamado lanceta (véase la Figura 2). Esta lanceta hará una punción (pinchazo) en la piel por debajo de cada gota, permitiendo que el medicamento entre en la piel.




Figura 1. Prueba cutánea




Figura 2. Lanceta

Luego de 15 minutos, el enfermero controlará su piel para ver si tuvo alguna reacción. Los signos de una reacción positiva son enrojecimiento o un bulto elevado donde la penicilina tocó la piel. Debería tener un pequeño bulto en el lugar de la histamina, el cual podría darle picazón.

Su enfermero le comunicará los resultados y cuáles son los pasos a seguir.



Paso 2: La prueba intradérmica

Primero, el enfermero le inyectará estos medicamentos debajo de la piel: salino normal, penicilina G y Pre-Pen. Los medicamentos harán que se forme una burbuja de líquido debajo de la piel, que se llama vesícula (véase la figura 3). Luego, el enfermero delineará cada vesícula con un bolígrafo (véase la figura 4).




Figura 3. Inyección intradérmica




Figura 4. Rótulos de la prueba intradérmica

Luego de 15 minutos, el enfermero controlará su piel para ver si tuvo alguna reacción. Los signos de una reacción positiva son enrojecimiento o hinchazón alrededor de la vesícula.

Su enfermero le comunicará los resultados y cuáles son los pasos a seguir.

Paso 3: La prueba de provocación (provocación oral)

Primero, el enfermero le dará una pequeña cantidad de penicilina de manera oral (por la boca). Esta pequeña cantidad se denomina dosis de prueba.

Luego, lo monitorearán (lo observarán atentamente) durante 30 minutos. Si nota alguno de estos signos, dígaselo al enfermero de inmediato:

- Comezón
- Dificultad para respirar
- Erupción cutánea o urticaria
- Inflamación del rostro, los labios o la lengua

Si no tiene una reacción a la dosis de prueba, el enfermero le suministrará una dosis completa de penicilina. Luego, lo controlará durante 60 minutos para ver si hay signos de una reacción alérgica. Si no tiene una reacción luego de tomar la dosis completa significa que ya no es alérgico a la penicilina.

Su enfermero actualizará la información de su historia clínica con esta información y allí terminará la prueba.

Qué esperar luego de su prueba de alergia a la penicilina

Si ya no es alérgico a la penicilina, recibirá una tarjeta donde se indiquen los resultados de su prueba de alergia. Puede enseñar esta tarjeta a otros proveedores de la salud y en las farmacias fuera de MSK.

Reacción diferida

Una reacción diferida es una reacción alérgica que podría suceder luego de terminar con su prueba de alergia a la penicilina. Puede darse algunas horas o, incluso, algunos días después de realizada la prueba de alergia. Generalmente, una reacción diferida no es de gravedad y desaparece dentro de las 48 horas (2 días).

Los signos de una reacción alérgica diferida son picazón, urticaria o sarpullido en el lugar donde se realizó la prueba. Si presenta algunos de estos signos, tome una foto de la reacción. Luego, llame al consultorio de Alergia e Inmunología al 646-888-3814.

