



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Información sobre la inmunoglobulina subcutánea (Hizentra®)

En esta información se explica qué es Hizentra y se responden algunas preguntas frecuentes. También se explican, las pautas que debe seguir mientras lo recibe y los efectos secundarios que debe tener en cuenta.

¿Qué es Hizentra?

Hizentra es un medicamento que se utiliza para tratar enfermedades o problemas que afectan el sistema inmunitario. Es un tipo de medicamento llamado inmunoglobulina subcutánea, o IgG subcutánea (IgG SC).

- **Subcutáneo** significa “debajo de la piel”. Usted se administra Hizentra utilizando una aguja pequeña y una bomba para infundir (introducir lentamente) el medicamento debajo de la piel.
- Una **inmunoglobulina** es otro nombre para un anticuerpo (una proteína que produce el sistema inmunitario). Los anticuerpos ayudan al cuerpo a combatir infecciones y enfermedades. Hizentra le da anticuerpos al sistema inmunitario para ayudarlo a funcionar mejor.

Su proveedor de cuidados de la salud le puede recetar Hizentra si tiene:

- Un sistema inmunitario débil. Esto significa que al cuerpo le cuesta combatir infecciones y enfermedades porque:
 - Su sistema inmunitario no está produciendo suficientes anticuerpos.
 - Los anticuerpos no están funcionando correctamente.
- Una enfermedad autoinmunitaria. Esta se produce cuando el cuerpo ataca sus propios tejidos y órganos sanos por error.

¿Qué hace Hizentra?

Hizentra puede ayudar a prevenir infecciones o a hacerlas menos graves (no tan malas)

si usted tiene:

- Un sistema inmunitario débil.
- Hepatitis A.
- Sarampión.
- Varicela.
- Rubéola (también llamado sarampión alemán).

Hizentra también puede ayudar a tratar algunas enfermedades autoinmunes, como:

- **Trombocitopenia inmune o PTI.** Esto ocurre cuando el sistema inmunitario ataca las plaquetas (células sanguíneas que ayudan a formar coágulos y a controlar el sangrado). La plaquetopenia inmunitaria puede hacer que le aparezcan moretones con facilidad y que sangre más de lo normal si tiene un corte o una lesión.
- **Polineuropatía desmielinizante crónica inflamatoria o CIDP.** Esto ocurre cuando el sistema inmunitario ataca la mielina (la cubierta protectora que rodea los nervios). La CIDP puede causar daño a los nervios e inflamación (hinchazón). Esto provoca cambios en la sensibilidad (cómo se siente), como entumecimiento u hormigueo y debilidad muscular.

Su proveedor de cuidados de la salud le puede recetar Hizentra para tratar otros problemas de salud que no aparecen en este recurso. Hable con su proveedor si tiene preguntas sobre por qué le está recetando Hizentra.

¿Quién no debe tomar Hizentra?

No tome Hizentra si:

- Es alérgico a Hizentra.
- Es alérgico a alguno de los ingredientes que componen Hizentra, como el polisorbato 80. Este es un ingrediente común que se encuentra en medicamentos, cosméticos y productos alimenticios.
- Tiene hiperprolinemia. Esto ocurre cuando el cuerpo tiene dificultades para descomponer un aminoácido llamado prolina. Tomar Hizentra puede ser dañino porque la prolina es uno de sus ingredientes.

¿Qué debo informarle a mi proveedor de cuidados

de la salud antes de comenzar a usar Hizentra?

- Si tiene alergias, incluso alergias a los medicamentos o alimentos. También debe informarle a su proveedor de cuidados de la salud qué síntomas presenta durante una reacción alérgica.
- Si está amamantando, está embarazada o planea quedar embarazada. Hable con su proveedor de cuidados de la salud para saber si es seguro que tome Hizentra. Le explicarán los beneficios y los riesgos para usted y su bebé.
- Si está planeando ponerse una vacuna. Las vacunas podrían no funcionar tan bien como deberían mientras esté usando Hizentra.
- Si toma algún medicamento. Esto incluye medicamentos recetados y sin receta, suplementos alimenticios (como hierbas, vitaminas o remedios caseros), parches y cremas.
 - Pregúntele a su proveedor de cuidados de la salud si es seguro tomar Hizentra con sus otros medicamentos. Algunos medicamentos pueden interactuar (mezclarse) entre sí y causar problemas.
 - No comience, suspenda ni cambie la dosis (cantidad) de ningún medicamento sin hablar antes con su proveedor de cuidados de la salud.

¿Cómo tomo Hizentra?

Usted mismo se administrará Hizentra mediante una infusión subcutánea. Una infusión subcutánea administra el medicamento en el tejido graso justo debajo de la piel, donde el cuerpo lo absorbe.

Usará un dispositivo pequeño llamado bomba de infusión para administrarse Hizentra. La bomba envía el medicamento lentamente a través de un tubo delgado que está conectado a una aguja pequeña. Introducirá la aguja en la piel en un lugar del cuerpo llamado sitio de infusión.

El enfermero que le ayuda con la infusión en el hogar le enseñará cómo administrarse la infusión de forma segura en su hogar. Le ayudará a practicar hasta que se sienta cómodo haciéndolo por su cuenta.

También puede encontrar instrucciones para la infusión en el sitio web de Hizentra. Visite www.hizentra.com para descargar instrucciones por escrito o mirar un video.

La infusión toma de 1 a 2 horas. Durante este tiempo, puede relajarse o realizar

actividades tranquilas, como leer un libro o ver la televisión.

¿Cómo elijo un sitio de infusión?

Elija un sitio de infusión donde haya suficiente piel para pellizcar. Lo mejor es usar una de las siguientes zonas (véase la figura 1):

- La parte delantera de la parte superior de los brazos.
- El abdomen (vientre), a excepción de la zona de 2 pulgadas (5 centímetros) alrededor del ombligo.
- La zona media delantera o la zona media exterior de los muslos.
- La zona superior de los glúteos (nalgas), solo si otra persona le introduce la aguja en la piel.
- La parte posterior de los brazos, solo si otra persona le introduce la aguja en la piel.




Figura 1. Sitios de infusión

Si su proveedor de cuidados de la salud le indica que utilice un sitio de infusión determinado, siga sus instrucciones.

No introduzca la aguja en los siguientes lugares:

- Un músculo.
- Un vaso sanguíneo (vena o arteria).
- Una zona que esté sensible, roja, magullada, dura o que tenga cicatrices o estrías.

¿Debo elegir un sitio de infusión diferente cada vez que tomo Hizentra?

Sí. Esto se denomina rotación de los sitios de infusión. Cambiar los sitios de infusión ayuda a evitar la formación de tejido cicatricial. Si se forma tejido cicatricial, puede evitar que el medicamento funcione como debería. También dificultará introducir la aguja en la piel.

¿Tendré que utilizar varios sitios de infusión al mismo tiempo?

Es posible que algunas personas necesiten utilizar varios sitios de infusión al mismo tiempo cuando toman Hizentra. Esto depende de la cantidad de medicamento que necesite. Durante la infusión, puede usar más de 1 bomba de infusión. Colocará una aguja en cada sitio de infusión, y se asegurará de que estén separados por al menos 2 pulgadas (5 cm) entre sí.

Su enfermero que le ayuda con la infusión en su hogar le indicará si necesita utilizar varios sitios de infusión antes de comenzar a tomar Hizentra.

¿Por qué hay líquido en el sitio de infusión después de tomar Hizentra?

A veces, puede formarse una burbuja de líquido en el sitio de infusión después de una infusión. Esto es normal y desaparecerá en 24 horas (1 día).

¿Qué pautas debo seguir mientras tomo Hizentra?

- Informe a todos sus proveedores de cuidados de la salud que está tomando Hizentra. Esto incluye a todas las personas de su equipo de atención en MSK. También incluye a todos sus proveedores de cuidados de la salud fuera de MSK, como médicos, enfermeros, farmacéuticos y dentistas.
- Tome Hizentra como indica la receta. Siga las instrucciones de su proveedor de cuidados de la salud cuando tome Hizentra. No cambie la dosis de Hizentra sin hablar antes con su proveedor de cuidados de la salud.
- Solo tome la dosis de Hizentra que le hayan recetado. Nunca comparta sus medicamentos con nadie ni tome los medicamentos de otras personas.

¿Qué debo hacer si olvido una dosis de Hizentra?

Debe tomar Hizentra en un calendario fijo. Si se saltea una dosis, llame al proveedor de cuidados de la salud que le receta Hizentra. Le dará instrucciones sobre lo que tiene que hacer.

¿Cuáles son los efectos secundarios más comunes de Hizentra?

- Enrojecimiento, hinchazón, picazón, moretones o los cuatro síntomas en el sitio de la infusión
- Dolor de cabeza o migrañas
- Síntomas de gripe, tales como:
 - Fiebre, escalofríos, o ambos
 - Tos
 - Goteo o congestión nasal
 - Fatiga (sentirse más cansado y débil de lo normal)
 - Náuseas (una sensación de que va a vomitar)
 - Vómito (devolver)
 - Diarrea (caca suelta o aguada)
- Dolor en el pecho, la espalda, los brazos, las piernas o las articulaciones
- Dolor de estómago, hinchazón o ambos
- Urticaria (bultos elevados en la piel que pican), sarpullido o comezón
- Dificultad para respirar o para recuperar el aliento
- Siente mareo o aturdimiento (como si se fuera a desmayar)

Informe a su proveedor de cuidados de la salud si los efectos secundarios empeoran o no mejoran. Le ayudará a controlarlos. También es importante informarle a su proveedor si presenta otros efectos secundarios que no se mencionan aquí.

¿Cuándo debo llamar al 911 o ir a la sala de urgencias?

Llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana si tiene:

- Una emergencia potencialmente mortal
- Algún signo de una reacción alérgica, como por ejemplo:
 - Urticaria, erupción cutánea o comezón
 - Presión en el pecho o la garganta
 - Dificultad para respirar
 - Silbidos al respirar (chiflido o chillido cuando respira)
 - Mareo
 - Desmayo (pérdida del conocimiento)
 - Inflamación de la boca, la cara, los labios, la lengua o la garganta

¿Cuándo debo llamar a mi proveedor de cuidados de la salud?

Llame de inmediato a su proveedor de cuidados de la salud si presenta alguno de los signos que se enumeran a continuación. Si el consultorio está cerrado, siga las instrucciones para comunicarse con el centro de llamadas de triaje telefónico fuera del horario de atención (AHTT) de MSK. También puede llamar al operador de MSK al 212-639-7900.

A través del AHTT, puede hablar con un proveedor de cuidados de la salud cuando no pueda esperar a que su equipo de atención esté disponible a causa de su problema médico. Para obtener más información, lea [Información sobre el triaje telefónico fuera del horario de atención en MSK](#).

Si tiene una emergencia que pone en riesgo su vida, llame siempre al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana.

Signos de problemas en los riñones

- Menos producción de orina (la cantidad de pis es menor a la habitual)
- Aumento repentino de peso
- Hinchazón en las piernas

Signos de un coágulo

- Dolor, hinchazón o ambos, con sensación de calor en un brazo o una pierna

- Decoloración de la piel (piel enrojecida u oscurecida) en un brazo o una pierna
- Dificultad para respirar
- Dolor o malestar en el pecho que empeora al respirar profundamente
- Una frecuencia cardíaca más rápida de lo normal
- Entumecimiento o debilidad en un lado del cuerpo

Signos de meningitis

La meningitis es una infección en la que se inflaman los tejidos que rodean el cerebro y la médula espinal. Algunos signos son:

- Dolor de cabeza muy fuerte (muy malo)
- Cuello rígido
- Náuseas
- Vómito
- Fiebre
- Dolor al mover los ojos o sensibilidad a la luz

Signos de un problema en la sangre

- Orina roja o marrón oscura
- Una frecuencia cardíaca más rápida de lo normal
- Ictericia (cuando la piel y el blanco de los ojos se ven amarillos)

Signos de infección

- Temperatura de 100.4 °F (38.0 °C) o más

¿Cómo guardo Hizentra?

- Guarde Hizentra a temperatura ambiente. Debe mantenerse entre 68 y 77 °F (20 y 25 °C). No lo congele.
- Guarde Hizentra en su caja original hasta que esté listo para usarlo. Esto ayuda a protegerlo de la luz.
- Mantenga Hizentra en un lugar seguro, como un armario cerrado con llave. Asegúrese de guardarlo lejos del alcance de otras personas, incluidos niños,

mascotas, familiares, amigos y acompañantes.

¿Cómo desecho Hizentra?

- Tire las agujas y jeringas usadas, junto con cualquier material desechable usado, en un recipiente para instrumentos cortopunzantes. Se trata de un recipiente rígido y cerrado por el que las agujas no pueden atravesar. Por ejemplo, puede usar un recipiente de plástico de jabón para la ropa que tenga tapa. Lea [Cómo guardar y desechar los instrumentos médicos cortopunzantes en el hogar](#) para obtener instrucciones sobre cómo elegir un recipiente para elementos cortopunzantes.
- Guarde el recipiente de objetos cortopunzantes en un lugar seguro, lejos del alcance de otras personas, incluidos niños, mascotas, familiares, amigos y acompañantes.

¿Cómo puedo deshacerme del Hizentra que no use o que haya caducado?

- Deshágase del Hizentra que no utilice o haya caducado cuando ya no lo necesite. Lo mejor es llevarlo a un punto de devolución de fármacos. Para obtener más información, lea [Cómo deshacerse de las medicinas no utilizadas](#).
- No tire Hizentra al inodoro ni lo vierta por el desagüe, a menos que su proveedor de cuidados de la salud se lo indique.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

About Subcutaneous Immunoglobulin (Hizentra®) - Last updated on December 19, 2025

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Última actualización

Diciembre 19, 2025

Learn about our [Health Information Policy](#).

Díganos qué piensa

Díganos qué piensa

Sus comentarios nos ayudarán a mejorar la información educativa que brindamos. Su equipo de atención no puede ver nada de lo que escriba en este formulario para comentarios. No lo use para consultar sobre su atención. Si tiene preguntas sobre su atención, comuníquese con su proveedor de cuidados de la salud.

Cuando leemos los comentarios, no podemos responder preguntas. No escriba su nombre ni su información personal en este formulario para comentarios.

¿Esta información fue fácil de entender?

Sí

Algo

No

¿Qué podríamos haber explicado mejor?

No escriba su nombre ni su información personal.

Enviar