



EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

Información sobre el catéter para bloqueo nervioso continuo de las extremidades inferiores

En esta información se explica lo que es un catéter para bloqueo nervioso continuo de las extremidades inferiores, además de cómo funciona y qué esperar una vez que se coloca.

Información sobre el catéter para bloqueo nervioso

Un bloqueo de nervios consiste en administrar anestesia local para bloquear un grupo de nervios y evitar que se sienta dolor. La anestesia local es un medicamento que se administra para entumecer una región particular del cuerpo.

En un **bloqueo nervioso continuo**, la anestesia local se administra a través de un catéter (una sonda delgada y flexible), el cual se conecta a una bomba. Un bloqueo nervioso continuo puede dejarse en su lugar durante unos días para ayudarle a sentir menos dolor después de su cirugía. El anestesista (médico que se especializa en medicamentos que ayudan con el dolor antes, durante y después de una cirugía) programará la bomba para administrarle una cantidad específica de anestesia local. Es posible que esa cantidad se tenga que cambiar, según cuánto dolor sienta después de su cirugía.

En un **bloqueo nervioso continuo de las extremidades inferiores**, la anestesia local se administra para bloquear los nervios de una de las extremidades inferiores (una pierna) y no se sienta dolor. El catéter para bloqueo de nervios se coloca cerca o alrededor de la ingle, el muslo o la rodilla para que llegue a los

nervios que pasan por la pierna.

El bloqueo nervioso continuo para las extremidades inferiores le eliminará la mayor parte del dolor, aunque puede que no todo. También es posible que tenga que tomar un analgésico mientras tenga el bloqueo de nervios.

Qué esperar después de su cirugía

El catéter para el bloqueo nervioso se le colocará antes, durante o después de su cirugía. Es normal que la pierna se sienta entumecida después de su cirugía.

Aproximadamente de 8 a 16 horas después de su cirugía, el efecto de la anestesia local más fuerte que le puso el médico durante su cirugía comenzará a desaparecer. Entonces podrá mover la pierna con más facilidad. Es posible que sienta molestias mientras recupera la sensibilidad. El enfermero programará la bomba del medicamento para comenzar a administrarle anestesia local a través del catéter para el bloqueo nervioso. También puede que le dé un analgésico para ayudarle con las molestias que sienta.

Pídale un analgésico a su enfermero antes de irse a dormir la primera noche después de su cirugía. Eso le ayudará a evitar que se despierte con dolor después de que se le quite el entumecimiento.

Qué esperar mientras tenga puesto el catéter para el bloqueo nervioso

- Es posible que tenga goteo de líquido alrededor del catéter para el bloqueo nervioso. Lo que gotee será la anestesia local. Eso es normal y no significa que no esté funcionando. Si el catéter para el bloqueo nervioso gotea, dígame al enfermero.
- Es posible que el catéter para el bloqueo nervioso se le caiga o se salga por accidente. Si eso sucede, dígaselo al enfermero. No tire el catéter a la basura.
- Tenga cuidado al caminar. La pierna la tendrá débil debido a la anestesia local y puede que esta no soporte todo su peso. Dígame al enfermero si necesita que

alguien le ayude a caminar.

- Dígale a su enfermero si no siente la pierna en lo absoluto. Es probable que la bomba se tenga que apagar por un rato. En cuanto vuelva a sentir la pierna se puede volver a encender.

Informe al médico o al enfermero si tiene:

- Una erupción cutánea o urticaria en alguna parte del cuerpo
- Entumecimiento alrededor de la boca
- Una sensación de metal en la boca
- Zumbido en los oídos
- Mareo
- Confusión
- Problemas para hablar
- Dolor de pecho
- Temblor en alguna parte del cuerpo
- Convulsiones (agitación o rigidez sin control del cuerpo)

Detalles de contacto

Si tiene preguntas o inquietudes, llame al Servicio de Anestesia al 212-639-6851. Puede llamarnos de lunes a viernes de 9:00 AM a 4:00 PM.

Después de las 4:00 PM, los fines de semana y los feriados, llame al 212-639-2000 y pregunte por el anestesista que esté de guardia.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y podrá hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.

About Your Continuous Lower Extremity Nerve Block Catheter - Last updated on April 17, 2019

©2020 Memorial Sloan Kettering Cancer Center