



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Información sobre el catéter para bloqueo nervioso continuo de las extremidades inferiores

En esta información, se explica qué es el catéter para bloqueo nervioso continuo de las extremidades inferiores. Se explica qué es, cómo funciona y qué puede esperar luego de que se lo coloquen.

## Información sobre el catéter para bloqueo nervioso

Un bloqueo de nervios consiste en administrar anestesia local para bloquear un grupo de nervios y evitar que se sienta dolor. La anestesia local es un medicamento que se usa para entumecer una región particular del cuerpo.

En un **bloqueo nervioso continuo**, el medicamento se administra a través de un catéter (una sonda delgada y flexible) que se conecta a una bomba. Un bloqueo nervioso continuo puede dejarse en su lugar durante unos días para ayudarlo a sentir menos dolor después de su cirugía. El anesthesiólogo programará la bomba para administrarle la cantidad necesaria de anestesia local. El anesthesiólogo es un médico con una formación especial en medicamentos que ayudan con el dolor antes, durante y después de una cirugía. Podría necesitar más o menos medicamento, según cuánto dolor sienta después de la cirugía.

En un **bloqueo nervioso continuo de las extremidades inferiores**, la anestesia local se usa para bloquear los nervios de una de las extremidades

inferiores (piernas) para que no sienta dolor. El catéter para bloqueo nervioso se coloca cerca o alrededor de la ingle, el muslo o la rodilla. Desde ese lugar, puede llegar a los nervios que pasan por la pierna.

A través del bloqueo nervioso continuo de las extremidades inferiores, se eliminará la mayor parte del dolor. Aunque puede que no le quite todo el dolor. También es posible que tenga que tomar un analgésico mientras tenga el bloqueo nervioso.

## **Qué esperar después de la cirugía**

El catéter para el bloqueo nervioso se le colocará durante la cirugía. Es normal que la pierna se sienta entumecida después de su cirugía.

Aproximadamente de 8 a 16 horas después de su cirugía, el efecto de la anestesia local más fuerte que le administraron durante su cirugía desaparecerá. Entonces podrá mover la pierna con más facilidad. Es posible que sienta molestias mientras recupera la sensibilidad. El enfermero programará la bomba para administrarle anestesia local a través del catéter para el bloqueo nervioso. También puede que le dé un analgésico para aliviar las molestias.

Pídale un analgésico al enfermero antes de irse a dormir la primera noche después de su cirugía. Esto le ayudará a evitar que se despierte con dolor después de que se le quite el entumecimiento.

## **Qué esperar mientras tenga puesto el catéter para el bloqueo nervioso**

- Es posible que tenga goteo de líquido alrededor del catéter para el bloqueo nervioso. Lo que gotee será la anestesia local. Eso es normal y no significa que no esté funcionando. Si el catéter para el bloqueo nervioso gotea, dígame al enfermero.
- Es posible que el catéter para el bloqueo nervioso se le caiga o se salga por accidente. Si eso sucede, dígaselo al enfermero. No tire el catéter a

la basura.

- Tenga cuidado al caminar. Tendrá la pierna débil debido a la anestesia local y puede que esta no soporte todo su peso. Dígale al enfermero si necesita que alguien le ayude a caminar.
- Dígale al enfermero si no siente la pierna. Es probable que la bomba se tenga que apagar por un rato. En cuanto vuelva a sentir la pierna se puede volver a encender.

## **Cuándo llamar al proveedor de cuidados de la salud**

Llame a su proveedor de cuidados de la salud si tiene alguno de los siguientes síntomas:

- Una erupción cutánea o urticaria en alguna parte del cuerpo.
- Entumecimiento alrededor de la boca.
- Sabor metálico en la boca.
- Zumbido en los oídos.
- Mareo.
- Confusión.
- Problemas para hablar.
- Dolor de pecho.
- Temblor en alguna parte del cuerpo.
- Convulsiones (agitación o rigidez sin control del cuerpo).

## **Detalles de contacto**

Si tiene preguntas o inquietudes, llame al Servicio de Anestesia al 212-639-6851. Puede hablar con un integrante del personal de lunes a viernes de 9 a. m. a 4 p. m. Después de las 4 p. m, durante los fines de semana y los días feriados, llame al 212-639-2000 y pida hablar con el anestesista de guardia.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

About Your Continuous Lower Extremity Nerve Block Catheter - Last updated on March 1, 2024

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center