



## EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Información sobre el catéter para bloqueo nervioso continuo de las extremidades superiores

En esta información, se explica qué es el catéter para bloqueo nervioso continuo de las extremidades superiores. Se explica qué es, cómo funciona y qué puede esperar luego de que se lo coloquen.

## Información sobre el catéter para bloqueo nervioso

Un bloqueo de nervios consiste en administrar anestesia local para bloquear un grupo de nervios y evitar que se sienta dolor. La anestesia local es un medicamento que se usa para entumecer una región particular del cuerpo.

En un **bloqueo nervioso continuo**, el medicamento se administra a través de un catéter (una sonda delgada y flexible) que se conecta a una bomba. Un bloqueo nervioso continuo puede dejarse en su lugar durante unos días para ayudarle a sentir menos dolor después de su cirugía.

El anestesiólogo programará la bomba para administrarle la cantidad necesaria de anestesia local. El anestesiólogo es un médico con una formación especial en medicamentos que sirven para aliviar el dolor antes, durante y después de una cirugía. Podría necesitar más o menos medicamento, según cuánto dolor sienta después de la cirugía.

Un **bloqueo nervioso continuo de las extremidades superiores** bloquea el dolor en los nervios de la extremidad superior (hombro, brazo o mano). La anestesia local fluye a través del catéter para bloqueo nervioso que se coloca cerca del

cuello para poder llegar a estos nervios.

El bloqueo nervioso continuo para las extremidades superiores le eliminará la mayor parte del dolor. Aunque puede que no le quite todo el dolor. También es posible que tenga que tomar un analgésico mientras tenga el bloqueo nervioso.

## Qué esperar después de su cirugía

El catéter para el bloqueo nervioso se le colocará durante la cirugía. Es normal que el hombro, el brazo o la mano se sienta entumecido después de su cirugía.

Es posible que sienta entumecimiento en el lado de la cara o del cuello en el cual se le hizo la cirugía. También puede que hable con ronquera, que tenga los párpados caídos, que las pupilas se le contraigan o que tenga congestión nasal. Estas sensaciones son normales. Están causadas por la anestesia local.

Desaparecerán después de que se le quite el catéter para el bloqueo nervioso.

Aproximadamente de 8 a 16 horas después de la cirugía, el efecto de la anestesia local más fuerte que le administraron durante su cirugía desaparecerá. Podrá mover el hombro, el brazo o la mano con más facilidad. Es posible que sienta molestias mientras recupera la sensibilidad. El enfermero programará la bomba para administrarle anestesia local a través del catéter para el bloqueo nervioso. También puede que le dé un analgésico para aliviar las molestias.

Pídale un analgésico al enfermero antes de irse a dormir la primera noche después de su cirugía. Esto le ayudará a evitar que se despierte con dolor después de que se le quite el entumecimiento.

## Qué esperar mientras tenga puesto el catéter para el bloqueo nervioso

- Es posible que tenga goteo de líquido alrededor del catéter para el bloqueo nervioso. Lo que gotee será la anestesia local. Eso es normal y no significa que no esté funcionando. Si el catéter para el bloqueo nervioso gotea, dígale al enfermero.

- Es posible que el catéter para el bloqueo nervioso se le caiga o se salga por accidente. Si eso sucede, dígaselo al enfermero. No tire el catéter a la basura.
- Recuerde tener presente la posición del hombro, del brazo o de la mano en todo momento. Es posible que no pueda sentirlos completamente debido a la anestesia local. Protéjalos para que no se lastime. Si el enfermero le dio un cabestrillo, siempre mantenga el brazo en él, excepto cuando reciba fisioterapia.
- Si siente el hombro, el brazo o la mano completamente entumecido, dígaselo al enfermero. Es probable que la bomba se tenga que apagar por un rato. En cuanto vuelva a sentir el brazo se puede volver a encender.

## **Cuándo llamar al proveedor de cuidados de la salud**

Llame a su proveedor de cuidados de la salud si tiene alguno de los siguientes síntomas:

- Problemas para respirar o dolor de pecho.
- Una erupción cutánea o urticaria en alguna parte del cuerpo.
- Entumecimiento alrededor de la boca.
- Sabor metálico en la boca.
- Zumbido en los oídos.
- Mareo.
- Confusión.
- Problemas para hablar.
- Temblor en alguna parte del cuerpo.
- Convulsiones (agitación o rigidez sin control del cuerpo).

## **Detalles de contacto**

Si tiene preguntas o inquietudes, llame al Servicio de Anestesia al 212-639-6851. Puede hablar con un integrante del personal de lunes a viernes de 9 a. m. a 4 p. m. Después de las 4 p. m, durante los fines de semana y los días feriados, llame al 212-639-2000 y pida hablar con el anestesista de guardia.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

About Your Continuous Upper Extremity Nerve Block Catheter - Last updated on April 2, 2024

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center