

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

## **Ventriculostomía endoscópica del tercer ventrículo (ETV): información para niños, adolescentes y jóvenes adultos**

Esta información le ayudará a aprender sobre la ventriculostomía endoscópica del tercer ventrículo (ETV). En este recurso, las palabras “usted” y “su” se refieren a usted o a su niño.

Una ETV es una cirugía para drenar el exceso de líquido cefalorraquídeo (LCR) del cerebro. El LCR es un líquido que se produce en los ventrículos (espacios huecos) del cerebro.

El LCR protege el cerebro y la médula espinal actuando como un amortiguador. También transporta nutrientes al cerebro y elimina los desechos. Todo el tiempo producimos LCR nuevo.

El LCR circula desde los ventrículos, por el cerebro y la médula espinal y va hacia el torrente sanguíneo. Si se

produce una acumulación excesiva de LCR en los ventrículos, puede causar hidrocefalia.

La hidrocefalia se produce cuando hay un exceso de LCR que agranda los ventrículos y ejerce presión sobre el cerebro (véase la figura 1). La hidrocefalia se puede producir si se bloquea el flujo del LCR. También puede generarse cuando el torrente sanguíneo no absorbe suficiente LCR.




Figura 1. Cerebro con y sin hidrocefalia

## Información sobre la cirugía ETV

La cirugía ETV se realizará en el quirófano mientras usted esté dormido. Su enfermero podrá afeitarle un poco de cabello cerca de la zona donde se hará la incisión (corte quirúrgico). No le afeitarán toda la cabeza.




Figura 2. Ventriculostomía endoscópica del tercer ventrículo (ETV)

---

Durante su cirugía, el cirujano hará un orificio pequeño en el tercer ventrículo del cerebro. Esto permitirá que el LCR en exceso drene a otra zona del cerebro donde será absorbido (véase la figura 2). Para obtener más información, lea el recurso *Información sobre la ventriculostomía endoscópica del tercer ventrículo (ETV) en MSK Kids* ([www.mskcc.org/es/cancer-care/patient-education/about-your-etv-surgery-pediatric-patients](http://www.mskcc.org/es/cancer-care/patient-education/about-your-etv-surgery-pediatric-patients)).

## **Pautas de seguridad después de su cirugía**

### **Utilice productos MedicAlert®**

Siempre debe usar un brazalete o collar MedicAlert que diga que usted tiene hidrocefalia con una ETV. Esto ayudará a los trabajadores del servicio de emergencias a

cuidarle si alguna vez se enferma o se lastima gravemente y necesita ayuda médica.

Puede comprar un brazalete o collar MedicAlert en la mayoría de las farmacias. También puede pedirle a un miembro de su equipo de atención que le haga una solicitud. Visite el sitio web de MedicAlert en [www.medicalert.org](http://www.medicalert.org) para obtener más información.

### **Si es necesario, use un casco.**

Puede reanudar sus actividades habituales después de su cirugía. Use un casco para disminuir el riesgo de lesión en la cabeza, si fuera necesario. Pídale a su cirujano pautas específicas sobre cómo usar un casco.

### **Continúe con los escaneos de imagenología**

Puede realizarse todo tipo de escaneos de imagenología después de su cirugía. Esto incluye imagen por resonancia magnética (IRM), tomografía computarizada (TC) o radiografías. No tendrá que tener ningún cuidado especial.

## **Cuándo llamar al proveedor de cuidados de la salud**

Llame a su proveedor de cuidados de la salud si tiene alguno de los siguientes síntomas.

- Tamaño más grande de la cabeza y un punto blando

protuberante en la cabeza del bebé.

- Dolor de cabeza que no mejora al descansar o tomar medicamentos.
- Vómitos sin náuseas o con pocas náuseas (sensación de que uno va a vomitar).
- Fatiga (sentir cansancio o debilidad inusuales).
- Irritabilidad (enojarse o molestarse con facilidad).
- Cambios de la personalidad (no actuar normal).
- Problemas con el pensamiento y la memoria (como confusión).
- Problemas con el equilibrio o al caminar.
- Dificultad para despertarse o permanecer despierto.
- Problemas para retener la orina (pis).
- Convulsiones (temblores incontrolables).
- Llanto en tono alto en bebés.
- Problemas para comer.
- Problemas de la vista, como:
  - Vista borrosa
  - Visión doble
  - Pérdida de la visión
  - Mirada hacia abajo (también llamada ojos en puesta)

de sol)

Estos signos de advertencia pueden aparecer rápidamente. Si su niño tiene alguno de estos indicios o síntomas, llame a su proveedor de cuidados de la salud de inmediato.

Si no puede despertar a su niño, llame al 911 o vaya a la sala de emergencias más cercana de inmediato.

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

Endoscopic Third Ventriculostomy (ETV): Information for Children, Teens, and Young Adults - Last updated on May 30, 2024  
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center



Memorial Sloan Kettering  
Cancer Center