



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Información sobre la inyección intraocular en pacientes pediátricos

En este recurso, se explica qué esperar antes, durante y después de una inyección (pinchazo) intraocular. En este recurso, las palabras “usted” y “su” se refieren a usted o a su niño.

Una inyección intraocular es una forma de administrar una medicina de forma directa en el ojo. Su proveedor de cuidados de la salud le explicará qué medicina le darán durante su procedimiento y por qué lo hacen.

La medicina que le recete su proveedor de cuidados de la salud dependerá de:

- Su diagnóstico (la causa de su enfermedad).
- La cantidad de tratamiento que necesite.

Las inyecciones intraoculares se usan para tratar muchos problemas en los ojos, por ejemplo:

- Sangrado.
- Hipertensión intraocular. Sucede cuando la presión del ojo es más alta de lo normal.
- Tumores dentro del ojo.

Es posible que deba hacerse este tratamiento durante más de una visita. Su proveedor de cuidados de la salud le dirá con qué frecuencia tiene que asistir a consultas para recibir más inyecciones.

La mayoría de las personas reciben anestesia general para este procedimiento. La anestesia general es una medicina que le administran para que duerma durante su procedimiento.

Antes de su inyección intraocular

La semana antes de su cita, recibirá una llamada telefónica o un correo electrónico para confirmar la hora de su cita. También le explicarán a dónde ir y cuándo debe dejar de comer y beber el día de su procedimiento.

Organice que alguien lo lleve a casa

Debe contar con su padre o madre, un tutor o una persona responsable que le lleve a casa después de su procedimiento. Una persona responsable es alguien que le ayude a llegar bien a casa. También debe poder comunicarse con su equipo de cuidados de la salud en caso de tener inquietudes. Haga los arreglos necesarios antes del día de su procedimiento.

Instrucciones sobre lo que se debe comer y beber antes de su procedimiento

No coma ni beba nada después de cierta hora de la noche antes de su procedimiento. La hora exacta se basa en la edad y en cualquier otro problema médico que tenga.

Su proveedor de cuidados de la salud hablará con usted sobre lo que puede y no puede comer antes del procedimiento.

Si no sigue las instrucciones que le dé su equipo de atención médica, es posible que tengamos que cancelar o cambiar la fecha de su procedimiento.

Qué hacer el día de la inyección intraocular

Algunos aspectos para tener en cuenta

Use sus anteojos el día de su procedimiento. Si usa lentes de contacto, deberá quitárselos antes del procedimiento.

Traiga una lista de todas las medicinas y suplementos que toma. Esto incluye las

medicinas de venta libre (aquellas que puede comprar sin presentar una receta médica).

A dónde ir

Su procedimiento se realizará en:

La sala de oftalmología (Ophthalmology Suite) en Memorial Hospital (el hospital principal de MSK)

425 East 67th Street (entre la avenida First y la avenida York)

Nueva York, NY 10065

Tome los ascensores C al 3.º piso y vaya a la sala A330.

Qué esperar a su llegada

Un integrante del personal le pedirá que diga y deletree su nombre y fecha de nacimiento muchas veces. También le darán un brazalete con su nombre y fecha de nacimiento. Esto se hace por su seguridad. Es posible que haya personas con el mismo nombre que usted o con un nombre parecido que se hagan procedimientos el mismo día.

Su equipo de oftalmología le revisará los ojos y les tomará fotografías. Si necesita una inyección, su proveedor de cuidados de la salud le pedirá que firme un formulario de consentimiento. Un formulario de consentimiento es un formulario en el que acepta el procedimiento y confirma que comprende los riesgos.

Le colocarán gotas para los ojos para dilatar (hacer más grande) la pupila. La pupila es la parte negra del ojo. Estas gotas pueden nublarle la visión y hacer que los ojos sean más sensibles a la luz. Es posible que le sea difícil leer y enfocarse en los objetos que están cerca de usted.

Su equipo de oftalmología le llevará a la sala de procedimientos donde le colocarán la inyección. Su procedimiento durará menos de 5 minutos. Puede tardar más la preparación para su procedimiento.

En la sala de procedimientos

Recibirá la anestesia por medio de una mascarilla. Una vez que esté dormido, su equipo de oftalmología le revisará el ojo y le dará la medicina. Le lavarán el ojo y el párpado con una solución de limpieza.

Su proveedor de cuidados de la salud le colocará un campo (una cobertura) de plástico sobre la cara con un corte para el ojo. Solo se verá el ojo que le estén tratando. También podrían colocarle un aparato entre los párpados para mantener el ojo abierto durante el procedimiento.

Su proveedor de cuidados de la salud inyectará la medicina en el ojo. Cuando le quite la aguja, es posible que use crioterapia (congelamiento) para cerrar un pequeño orificio en el sitio de la inyección. El sitio de la inyección es el lugar donde se introdujo la aguja en la piel.

Después de la inyección, su proveedor de cuidados de la salud mirará el ojo usando una luz brillante y una lente portátil. También le limpiará el ojo y el párpado con salino (agua salada estéril).

Después de la inyección intraocular

- Las gotas para los ojos que le recetaron durante su tratamiento pueden causar visión borrosa. Puede ser difícil enfocar objetos que estén cerca de usted. Esto mejorará en pocas horas.
- Puede comer y beber como siempre.
- Puede comenzar a usar lentes de contacto 24 horas después de su procedimiento.
- Trate de no frotarse los ojos durante 2 días después de su tratamiento.

Efectos secundarios

- Es posible que vea una pequeña cantidad de sangre en el sitio de la inyección. Esto hará que la parte blanca del ojo esté roja.
- Es posible que sienta una sensación áspera en el ojo o que tenga la sensación de tener arena en él.
- Es posible que sienta una leve sensación de ardor en el ojo cuando pase el

efecto de la medicina anestésica.

- Es posible que tenga inflamación bajo el párpado.
- Es posible que tenga molestias leves (no intensas) en el ojo que recibió tratamiento. Tome acetaminophen (Tylenol®), como se lo recetaron.

Su proveedor de cuidados de la salud le puede recetar gotas para los ojos para ayudarle con los efectos secundarios. Los efectos secundarios deberían desaparecer en aproximadamente 1 a 3 días.

Mantenga una rutina normal

Visitar a familiares y amigos y estar rodeado de gente puede ayudarle a sentirse normal después del tratamiento. Siga haciendo sus actividades habituales, si puede.

Programe visitas de seguimiento

Programe revisiones oftalmológicas con su proveedor de cuidados de la salud. Esto ayuda a confirmar que el tratamiento ha funcionado y le permite estar atento a cualquier posible problema. Siga las instrucciones de su proveedor de cuidados de la salud para programar visitas de seguimiento.

Cuándo llamar al proveedor de cuidados de la salud

Llame al proveedor de cuidados de la salud si tiene:

- Fiebre de 100.4 °F (38 °C) o más.
- Dolor que no se alivia después de tomar analgésicos.
- Grandes cantidades de sangre en el ojo.
- Disminución o pérdida de visión.
- Sensibilidad a la luz.
- Lagrimeo en el ojo que recibió tratamiento.
- Hinchazón visible en el ojo que recibió tratamiento.

- Una sensación de arena o comezón en el ojo que no desaparece en 3 días.
- Náuseas (sensación de que uno va a vomitar) y vómitos (devolver).
- Otros problemas para retener alimentos o líquidos, si recibió anestesia.

Detalles de contacto

Si tiene alguna pregunta o inquietud, llame al equipo de retinoblastoma de MSK al 212-639-7232. Puede comunicarse de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Después de las 5 p. m., durante los fines de semana y días feriados, llame al 212-639-2000 y pida hablar con el pediatra de guardia. También puede enviar un mensaje a su equipo de atención a través de MSK MyChart (el portal para pacientes de MSK).

Si no tiene una cuenta de MSK MyChart, puede registrarse en mskmychart.mskcc.org. También puede pedir a un miembro de su equipo de atención que le envíe una invitación.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

About Your Intraocular Injection for Pediatric Patients - Last updated on September 28, 2026

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center