



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Información sobre la cirugía de Mohs

En esta información se explica qué esperar antes, durante y después de su cirugía de Mohs en Memorial Sloan Kettering (MSK).

Acerca de su cirugía de Mohs

La cirugía de Mohs es un tipo de cirugía para tratar el cáncer de piel. Se realiza con una técnica especial para eliminar todo el cáncer de piel y salvar el tejido sano. Esto ayuda a reducir las cicatrices.

La cirugía de Mohs es el tratamiento más eficaz contra el cáncer de piel. Se utiliza a menudo con el fin de tratar el cáncer de piel, el cual:

- Se encuentra en zonas que son importantes en cuanto a la apariencia y la función
- Ha regresado luego de haber sido eliminado
- Tiene bordes que no son uniformes
- Es grande
- Crece con rapidez

Durante la cirugía, se extraerá una capa de tejido de la piel y se buscarán células cancerosas con un microscopio. Si hay células cancerosas, se extraerán más capas y se buscarán células cancerosas. Esto continuará hasta que se elimine todo el cáncer de piel.

La cirugía de Mohs es un procedimiento ambulatorio, lo que significa que no debe internarse en el hospital. Durante la cirugía no se le aplicará anestesia general

(medicamentos que hacen que se duerma). Se le aplicará anestesia local (medicamentos que adormecen una zona del cuerpo).

Riesgos de la cirugía de Mohs

Hable con el médico acerca de los riesgos de la cirugía de Mohs. Algunos riesgos posibles son:

- Dolor o molestia en el sitio de la cirugía
- Infección
- Sangrado en el sitio de la cirugía
- Cicatrices
- Cicatrización lenta o mala
- Adormecimiento en el sitio de la cirugía
- La herida se abre en donde se hizo la incisión (corte quirúrgico). Este riesgo se corre solo si su herida se cierra con sutura (puntos).

Antes de su cirugía de Mohs

Le brindaremos información sobre cómo prepararse para la cirugía. Tendrá tiempo para revisarla y hacer preguntas. Si un cirujano plástica cerrará la herida, usted también recibirá más información.

Si antes del procedimiento le aparece alguna enfermedad (fiebre, resfrío, dolor de garganta o gripe) o es hospitalizado, llame al consultorio del médico.

Le recomendamos que venga con un amigo o familiar el día de la cirugía. Si no le es posible, llame al consultorio del médico.

Dependiendo de cuántas capas de tejido deban ser eliminadas, es posible que permanezca en MSK por varias horas. Le recomendamos que traiga comida o bocadillos el día de su cita. Habrá un refrigerador donde podrá guardar su comida, si lo necesita.

Si tiene preguntas antes de la cirugía, llame al consultorio del médico.

El día de la cirugía de Mohs

El tiempo de la cirugía depende de la cantidad de capas de tejido que se eliminen. Es posible que algunas personas deban pasar todo el día en el MSK.

Para **cada capa** de tejido, se necesitarán:

- Alrededor de 15 minutos para extirpar el tejido.
- Unos 60 minutos o más para procesar el tejido y analizarlo para ver si tiene células cancerosas.

Durante su cirugía de Mohs

Primero, le pondremos una inyección de anestesia local para adormecer el sitio de la cirugía. Una vez que el área esté adormecida, se extirpará el tejido canceroso y una delgada capa del tejido que lo rodea. Se le colocará vendaje sobre la herida.

Luego de que le venden la herida, lo llevarán al área de espera o permanecerá en la sala donde se llevó a cabo el procedimiento. Mientras espera, puede relajarse y comer un refrigerio liviano o su almuerzo.

El tejido extirpado será procesado y examinado en el laboratorio. Si hay células cancerosas en el límite (borde) del tejido, le extirparemos otra capa de tejido.

Estos pasos se repetirán hasta que no se encuentren más células cancerosas en los bordes del tejido extirpado.

Cómo se cierra la herida

Luego de que se extirpe todo el cáncer, usted y el médico hablarán sobre la mejor manera de cerrar y curar la herida. Algunos ejemplos son:

- Dejar que la herida sane por sí misma.
- Cerrar la herida con sutura.
- Elaborar un injerto o colgajo de piel para cerrar la herida. Un injerto o colgajo de piel es tejido que se toma de otra parte del cuerpo y se coloca sobre la zona que debe cubrirse.

- Que un cirujano plástico cierre la herida. Si necesita que un cirujano plástico cierre la herida, el procedimiento se debe planificar con tiempo.

Antes de recibir el alta de MSK, le brindaremos información sobre cómo cuidar de la herida en casa. También le informaremos en qué fecha debe volver al MSK para una cita de seguimiento.

Luego de su cirugía de Mohs

Podrá irse a casa inmediatamente después del procedimiento.

- Es posible que sienta dolor después de la cirugía. Si siente dolor, pruebe tomar acetaminophen extrafuerte (como Tylenol® Extra Strength).
 - Si es alérgico al acetaminophen o si no puede tomarlo debido a una enfermedad, pregunte a su proveedor de cuidados de la salud qué puede tomar en su lugar.
 - No tome aspirin ni medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID) como ibuprofen (Motrin®, Advil®) y naproxen (Aleve®) salvo que su proveedor de cuidados de salud le indique que está bien tomarlos. Esos medicamentos pueden causar hemorragia.
- También puede aplicarse una compresa de hielo sobre la herida para reducir el dolor y la hinchazón. Sostenga la compresa de hielo sobre la herida durante 15 a 20 minutos cada hora o siga las indicaciones de su proveedor de cuidados de la salud.
- Si le hicieron suturas, se las sacarán durante una cita de seguimiento.

Si tienes preguntas, contacta a un integrante del equipo de atención médica directamente. Si eres paciente de MSK y necesitas comunicarte con un proveedor después de las 5:00 PM, durante el fin de semana o un día feriado, llama al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visita www.mskcc.org/pe y busca en nuestra biblioteca virtual.

About Your Mohs Surgery - Last updated on April 17, 2019

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center