



EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

Aminolevulinic Acid (Topical)

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

Marcas estadounidenses

Ameluz; Levulan Kerastick

Marcas canadienses

Levulan Kerastick

¿Para qué se usa este medicamento?

- Se utiliza para tratar un problema de piel precanceroso denominado queratosis actínica.

¿Qué debo informar al médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico al ácido aminolevulinico o cualquier otro componente de este medicamento.
- Si es alérgico a las porfirinas.
- Si es alérgico a algún medicamento como este, a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado, tales

como, sarpullido; urticaria; comezón; falta de aire; sibilancia; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.

- Si su piel es sensible a la luz.
- Si tiene porfiria.
- Si está consumiendo medicamentos que podrían hacer que su piel sea más sensible a la luz. Existen muchos medicamentos que pueden producir esto. Pregunte al médico o al farmacéutico si no está seguro.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga. Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

¿Qué debo tener en cuenta al usar este medicamento?

Todas las presentaciones:

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- El área tratada puede volverse más sensible a la luz. La luz

puede ocasionar una sensación de ardor o escozor. Proteja el área tratada y la piel alrededor de ella del sol, las lámparas solares, las luces interiores brillantes y las camas solares después de colocar este medicamento y durante el tiempo que le haya indicado su médico. Utilice la cobertura apropiada como un sombrero de ala ancha, una camisa de mangas largas o guantes para proteger la piel tratada de la luz. El filtro solar no será útil.

- No aplique filtros solares ni otros medicamentos en la zona afectada.
- Hable con su médico antes de usar otros medicamentos o productos en la piel.
- Este medicamento puede causar daño si se traga. Si traga este medicamento, llame a un médico o un centro de toxicología de inmediato.
- Las personas que toman este medicamento pueden presentar reacciones cutáneas en el área en la que lo aplican o alrededor de ella. Estas reacciones pueden incluir ardor, formación de costras, sequedad, piel descascarada, comezón, supuración, enrojecimiento, formación de cáscaras, escozor o hinchazón. En la mayoría de los casos, estas reacciones desaparecen semanas después de tomar este medicamento. Consulte con el médico.
- Consulte con su médico de inmediato si presenta una reacción cutánea molesta o si la reacción dificulta la administración de este medicamento. Consulte con su

médico de inmediato si presenta una reacción cutánea que dificulta sus actividades cotidianas.

- Informe a su médico si está embarazada o tiene intención de embarazarse. Tendrá que hablar acerca de los riesgos y beneficios de utilizar este medicamento mientras esté embarazada.
- Informe a su médico si está amamantando a su bebé. Tendrá que hablar acerca de si hay riesgos para el bebé.

Solución:

- Este medicamento contiene alcohol en su composición. Se puede producir una irritación muy grave si se cubre o se utiliza una venda durante más de 3 horas. Si tiene preguntas, consulte con el médico.

Razones por las que debe llamar a su médico de inmediato.

ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN: A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho

o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.

- Hemorragia en el lugar en que se utilizó el medicamento.
- Inflamación de los párpados.
- Cambio de coloración en la piel en la zona donde se aplica el medicamento.
- Rara vez se producen problemas de memoria con el uso de este medicamento y fototerapia. La mayoría de las veces, estos problemas de memoria se revierten en poco tiempo. Llame al médico de inmediato si tiene problemas o pérdida de la memoria, o si se siente confundido.

¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Escalofríos.
- Dolor de cabeza.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

Todas las presentaciones:

- Este medicamento se utiliza con fototerapia.
- El médico u otro profesional de la salud lo aplicará en la piel.
- No acerque a la boca, la nariz ni los ojos (puede quemar).
- Si cualquiera de estas áreas entra en contacto con este medicamento, enjuague bien con agua.
- No lave la parte tratada antes de realizarse la fototerapia.
- Tendrá que proteger sus ojos durante la fototerapia. Siga las instrucciones de su médico.
- Si no puede realizar la fototerapia después de que le aplicaron este medicamento, hable con su médico. Evite la luz brillante durante el tiempo que le haya indicado su médico.
- No cubra el área (con vendas, apósitos, maquillaje) a menos que se lo indique el médico.

Solución:

- Deberá regresar al consultorio de su médico por la

fototerapia luego de que se haya aplicado este medicamento en la piel. Asegúrese de saber cuándo debe regresar al consultorio.

¿Qué hago si se me olvida tomar una dosis?

- Llame al médico para obtener instrucciones.

¿Cómo debo conservar este medicamento?

- Si necesita almacenar este medicamento en casa, hable con su médico, enfermera o farmacéutico sobre cómo hacerlo.

Afirmaciones generales

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.
- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos que toma (recetados, productos naturales, suplementos, vitaminas, medicamentos que obtuvo sin receta). Entregue esta lista al médico.
- Hable con su médico antes de comenzar a tomar cualquier medicamento, ya sea uno recetado o sin receta, productos naturales o vitaminas.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado.

No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento

médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

Copyright

© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciados y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas, llame a un miembro de su equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor de cuidados de la salud después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y los feriados, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y podrá hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.

Aminolevulinic Acid (Topical) - Last updated on August 15, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center