



## EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

# Registro de vacunas para los pacientes con asplenia

Esta información le ayudará a mantener un registro de las vacunas que necesitará si le extirpan el bazo o si este se debilita.

Recibe este recurso porque:

- Le extirparon o le extirparán todo o parte del bazo. Esto se llama esplenectomía.
- Recibió tratamiento con radiación en el bazo, por lo que este está más débil y no puede combatir las infecciones como lo haría con normalidad. Esto se llama asplenia funcional.

El bazo es una parte importante del sistema inmunitario del cuerpo. Sin el bazo o con un bazo debilitado, usted tiene más posibilidades de tener una infección bacteriana.

Puede ayudar a prevenir estas infecciones colocándose las vacunas recomendadas.

## Vacunas y cirugía

- Si sabe que se someterá a una cirugía, póngase las vacunas al menos 14 días antes de su cirugía.
- Si tuvo una cirugía no programada, debe esperar al menos 14 días después de su cirugía para comenzar a colocarse las vacunas.

## Tipos de vacunas

Necesitará varias vacunas. Su proveedor de cuidados de la salud le dirá qué vacunas deberá recibir. Todas las vacunas se administran como inyecciones en el músculo.

- **Haemophilus B (Hib) conjugada.** Esta vacuna sirve para prevenir la enfermedad de Hib. La enfermedad de Hib puede causar meningitis (inflamación en el cerebro y la médula espinal), neumonía (inflamación que provoca la acumulación de fluidos en los pulmones) y otras enfermedades graves. Estas enfermedades pueden provocar discapacidad o la muerte.
- **Antineumocócica.** Esta vacuna ayuda a prevenir la infección por bacterias neumocócicas. Las bacterias neumocócicas pueden provocar neumonía, meningitis y otras enfermedades graves que pueden causar la muerte.
- **Antimeningocócica.** Esta vacuna sirve para prevenir la meningitis. Para tener una mayor protección, hay

3 vacunas antimeningocócicas disponibles, Penmenvy<sup>®</sup>, Menveo<sup>®</sup> y Bexsero<sup>®</sup>.

- Penmenvy es la mejor opción para iniciar con la vacunación antimeningocócica. Por sí sola, brinda protección contra todos los tipos de meningococo contra los que Menveo y Bexsero pueden ofrecer protección si se los combina.
- Si aún no ha comenzado con la vacunación antimeningocócica, debe recibir 2 dosis de Penmenvy, con un intervalo de 6 meses. Si, luego de esto, sigue estando en riesgo, recibirá Menveo y Bexsero como refuerzos.
- Si ya comenzó con la vacunación antimeningocócica con Menveo y Bexsero, debería completar el cronograma con esas vacunas.
  - Menveo se administra en 2 dosis, con un intervalo de 12 semanas. Debe recibir refuerzos cada 5 años.
  - Bexsero se administra en 2 dosis, con un intervalo de 6 semanas. Si recibió la segunda dosis antes de los 6 meses, debe recibir una tercera dosis al menos 4 meses después de la segunda dosis. Se administra un refuerzo al año siguiente y, luego, cada 2 o 3 años según sea necesario.
- **Gripe desactivada.** Esta vacuna sirve para prevenir la

**gripe.**

- Debería recibir la vacuna antigripal todos los años. Normalmente está disponible a principios del otoño.
- Puede recibir la vacuna antigripal en cualquiera de las rondas de vacunas.

## **Registro de vacunas**

No puede recibir todas estas vacunas de una sola vez. Por este motivo, se dividen en rondas. Su proveedor de cuidados de la salud le ayudará a decidir qué vacunas recibirá y cuándo las recibirá. Dígale a su proveedor de cuidados de la salud si ya le colocaron alguna de estas vacunas.

Traiga este registro cuando vea a su proveedor de atención primaria para que sus vacunas estén actualizadas.

La mayoría de las personas pueden recibir la primera ronda de vacunas en MSK. Después de eso, puede recibir el resto de las vacunas en el consultorio de su proveedor de atención primaria. Si su proveedor de atención primaria tiene alguna consulta, puede comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud en MSK.

<b>Vacuna</b>	<b>Fecha de administración</b>	<b>Fecha de la vacuna de refuerzo</b>	<b>Fecha de segunda vacuna</b>
---------------	--------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------

Haemophilus B Conjugada		Ninguno	Ninguno
Vacuna antineumocócica conjugada 20-valente (PCV20)		Ninguno	Ninguno
Antimeningocócica (Penmenvy)		6 meses después de la dosis 1: _____	Recibirá Menveo y Bexsero si sigue estando en riesgo después de completar la vacunación con Penmenvy.
Antimeningocócica (Menveo)		12 semanas después de la dosis 1: _____	Cada 5 años.

<p>Antimeningocócica (Bexsero)</p>		<p>6 meses después de la dosis 1: _____</p> <p>Si recibió la segunda dosis antes de los 6 meses, 4 meses después de la segunda dosis: _____</p>	<p>1 año después, luego, cada 2 o 3 años según sea necesario.</p>
<p>Gripe</p>		<p>Ninguno</p>	<p>Una vez al año.</p>

Si tiene preguntas o inquietudes, contáctese con su proveedor de cuidados de la salud. Un integrante de su equipo de atención le responderá de lunes a viernes de 9 a. m. a 5 p. m. Fuera de ese horario, puede dejar un mensaje o hablar con otro proveedor de MSK. Siempre hay un médico o un enfermero de guardia. Si no está seguro de cómo comunicarse con su proveedor de cuidados de la salud, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y busque en nuestra biblioteca virtual.

---

Asplenia Vaccine Record - Last updated on December 16, 2025  
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de  
Memorial Sloan Kettering Cancer Center