



## EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

# Bismuth Subcitrate, Metronidazole, and Tetracycline

Esta información de Lexicomp® le explica lo que debe saber sobre este medicamento, por ejemplo, para qué se usa, cómo tomarlo, sus efectos secundarios y cuándo llamar a su proveedor de cuidados de la salud.

## Marcas estadounidenses

Pylera

## Advertencia

- El uso prolongado del metronidazol ha causado cáncer en ratones y ratas. Hable con su médico.
- El médico le ha administrado este medicamento para tratar un problema de salud determinado. No utilice este medicamento para otros problemas de salud.

## ¿Para qué se usa este medicamento?

- Se utiliza para tratar las úlceras gastrointestinales (GI) ocasionadas por una infección.

## ¿Qué debo informar al médico ANTES de tomar este medicamento?

- Si es alérgico al bismuto, la metronidazola, los salicilatos, la

tetraciclina o cualquier otro componente de este medicamento.

- Si es alérgico a algún medicamento como este, a otros medicamentos, alimentos o sustancias. Informe a su médico acerca de esta alergia y qué síntomas ha presentado, tales como, sarpullido; urticaria; comezón; falta de aire; sibilancia; tos; inflamación de la cara, los labios, la lengua o la garganta o cualquier otro síntoma.
- Si tiene alguno de los trastornos siguientes: Enfermedad renal o enfermedad hepática.
- Si ha tomado disulfiram las últimas 2 semanas.
- Si bebe alcohol o toma algún medicamento que contenga alcohol.
- Si está o podría estar embarazada. No tome este medicamento si está embarazada.
- Si amamanta, no amamante durante al menos 48 horas después de consumir este medicamento.
- Si el paciente es un niño. Este medicamento no está aprobado para su administración en niños.

Esta no es una lista de todos los medicamentos o trastornos que pueden interactuar con este medicamento.

Informe a su médico y farmacéutico acerca de todos los medicamentos que tome (sean estos recetados o de venta libre, productos naturales, vitaminas) y los trastornos que tenga.

Debe verificar que sea seguro para usted tomar este medicamento junto con todos sus otros medicamentos y trastornos. No empiece, detenga ni modifique la dosis de ningún medicamento sin consultar antes al médico.

### **¿Qué debo tener en cuenta al usar este medicamento?**

- Avise a todos sus proveedores de atención médica que toma este medicamento. Esto incluye a los médicos, enfermeras, farmacéuticos y dentistas.
- Evite el consumo de alcohol y de productos con alcohol o propilenglicol mientras toma este medicamento y durante al menos 72 horas luego de la última dosis. El consumo de alcohol o de productos que contengan alcohol o propilenglicol, como por ejemplo jarabe para la tos, puede causar cólicos, malestar estomacal, dolor de cabeza y sofocos.
- Puede quemarse con el sol más fácilmente. Evite el sol, las lámparas y camas solares. Use filtro solar, ropa protectora y artículos que protejan los ojos.
- No lo use durante más tiempo que el indicado. Es posible que haya una segunda infección.
- Este medicamento puede afectar ciertas pruebas de laboratorio. Avise a todos sus proveedores de atención médica y bioquímicos que toma este medicamento.
- Este medicamento puede afectar la cantidad de otros medicamentos presente en el organismo. Si toma otros

medicamentos, consulte con su médico. Es posible que deban controlar sus análisis de sangre con mayor atención mientras tome este medicamento junto con sus demás medicamentos.

- Se presentaron problemas del sistema nervioso con este medicamento. Algunas de las personas que tomaron este medicamento durante un período prolongado presentaron problemas nerviosos que permanecieron durante mucho tiempo. Llame al médico de inmediato si tiene ardor, entumecimiento u hormigueo que no se siente normal; cambio en el equilibrio o la vista; mareos o desmayos; dolor de cabeza; insomnio; convulsiones; o dificultad para hablar. Llame al médico de inmediato si se siente confundido, deprimido, irritable, cansado o débil.
- Algunas personas que tomaron este medicamento presentaron una reacción muy grave, y a veces mortal. La mayoría de las veces, esta reacción tiene signos como fiebre, picazón o ganglios inflamados con problemas en los órganos corporales como el hígado, los riñones, la sangre, el corazón, los músculos y las articulaciones o los pulmones. Consulte al médico.
- Puede producirse una reacción cutánea grave (síndrome de Stevens-Johnson/necrólisis epidérmica tóxica). Puede ocasionar problemas de salud graves que no desaparecen y, en ocasiones, la muerte. Obtenga ayuda médica de inmediato si presenta signos como enrojecimiento, inflamación, ampollas o descamación de la piel (con o sin

fiebre); enrojecimiento o irritación en los ojos; o heridas en la boca, la garganta, la nariz o los ojos.

- Este medicamento puede aumentar la posibilidad de un problema del cerebro muy grave denominado meningitis aséptica. Llame a su médico de inmediato si tiene dolor de cabeza, fiebre, escalofríos, malestar estomacal fuerte o vómitos, rigidez en el cuello, sarpullido, siente molestias en los ojos con las luces brillantes, se siente somnoliento o presenta signos de confusión.
- Este medicamento puede provocar un cambio en el color de los dientes a amarillo, gris, marrón en niños menores de 8 años. Si se produce este cambio en el color de los dientes, no desaparecerá. Consulte al médico.
- Las pastillas anticonceptivas y otros métodos anticonceptivos a base de hormonas pueden dejar de prevenir el embarazo. Utilice también otro método anticonceptivo, como un condón, mientras toma este medicamento.
- Este medicamento puede dañar al feto si se toma durante el embarazo. Si está embarazada o queda embarazada mientras toma este medicamento, llame al médico de inmediato.

**Razones por las que debe llamar a su médico de inmediato.**

**ADVERTENCIA/PRECAUCIÓN:** A pesar de que es muy poco frecuente, algunas personas pueden sufrir efectos

secundarios muy graves, que causen incluso la muerte, al tomar un medicamento. Si presenta alguno de los siguientes signos o síntomas que puedan estar relacionados con un efecto secundario muy grave, infórmelo a su médico o busque asistencia médica de inmediato:

- Signos de reacción alérgica tales como sarpullido; urticaria; picazón; piel enrojecida, hinchada, con ampollas o descamada, con o sin fiebre; sibilancia; opresión en el pecho o la garganta; problemas para respirar, tragar o hablar; ronquera inusual; o hinchazón de la boca, el rostro, los labios, la lengua o la garganta.
- Materia fecal oscura, negra o con sangre.
- Vomitar sangre o vómito que parece granos de café.
- Se produjo aumento de la presión cerebral con el uso de este medicamento. Por lo general, se normalizará después de suspender el medicamento. A veces, puede ser la causa de la pérdida de la visión y podría no desaparecer incluso después de suspender el medicamento. Llame a su médico de inmediato si tiene dolor de cabeza o problemas de la vista como visión borrosa, visión doble o pérdida de la visión.
- Este medicamento ha causado un recuento bajo de glóbulos blancos. Esto puede generar un riesgo mayor de contraer una infección. Llame a su médico de inmediato si tiene signos de infección, como fiebre, escalofríos o dolor de garganta.
- Es común sufrir de diarrea al tomar antibióticos. En pocas

ocasiones, puede ocurrir una forma grave de diarrea conocida como diarrea asociada con *Clostridium difficile* (C diff) (DACD). A veces, esto produce un problema en el intestino que puede ocasionar la muerte (colitis). La DACD puede ocurrir mientras toma un antibiótico o al cabo de unos meses tras haberlo suspendido. Llame a su médico de inmediato si presenta dolores estomacales, cólicos, o heces muy blandas, acuosas o con sangre. No intente tratar la diarrea sin consultar primero con su médico.

- Algunas personas con síndrome de Cockayne han tenido problemas hepáticos al tomar este medicamento. En ocasiones, esto resultó mortal. Si tiene síndrome de Cockayne y toma este medicamento, llame al médico de inmediato si presenta signos de problemas hepáticos, como orina oscura, cansancio, falta de apetito, malestar o dolor estomacal, heces de color claro, vómitos, o piel u ojos amarillentos.

### **¿Qué otros efectos secundarios tiene este medicamento?**

Todos los medicamentos pueden tener efectos secundarios. Sin embargo, muchas personas no tienen ningún efecto secundario o tienen solamente efectos secundarios menores. Llame a su médico o busque asistencia médica si le molesta alguno de estos efectos secundarios o no desaparece:

- Náuseas.
- Diarrea.

- Dolor de cabeza.
- Dolor abdominal.
- Lengua y materia fecal oscuras.

Estos no son todos los efectos secundarios que podrían ocurrir. Si tiene preguntas acerca de los efectos secundarios, llame al médico. Llame al médico para que lo aconseje acerca de los efectos secundarios.

Puede informar los efectos secundarios al organismo de salud de su país.

### **¿Cuál es la mejor forma de tomarlo?**

Tome este medicamento según las indicaciones de su médico. Lea toda la información que se le brinde. Siga todas las instrucciones con atención.

- Tome este medicamento después de las comidas y a la hora de acostarse.
- Se debe tragar entero. No se debe masticar, romper ni triturar.
- Tome este medicamento con un vaso de agua.
- Luego de este medicamento, no tome calcio, hierro, magnesio, zinc, multivitaminas con minerales, colestipol, colestiramina, didanosina ni antiácidos durante 2 horas.
- Para sacar el mayor provecho de este medicamento, no se salte ninguna dosis.



- Siga tomando este medicamento según se lo indique el médico u otro proveedor de atención médica, aun si se siente bien.

### **¿Qué hago si se me olvida tomar una dosis?**

- Salte la dosis que no tomó y vuelva a su horario regular.
- No tome dos dosis al mismo tiempo ni tome dosis adicionales.
- Si olvida tomar 4 dosis, llame a su médico.

### **¿Cómo debo conservar este medicamento?**

- Conserve a temperatura ambiente.
- Mantener en un lugar seco. No conservar en un baño.
- Guarde los medicamentos en un lugar seguro. Mantenga todo medicamento fuera del alcance de los niños y las mascotas.
- Deseche los medicamentos sin usar o que hayan expirado. No los tire por el retrete ni los vierta al desagüe a menos que así se lo indiquen. Consulte con el farmacéutico si tiene preguntas sobre la mejor manera de desechar medicamentos. Pueden existir programas de devolución de medicamentos en su área.

### **Afirmaciones generales**

- Si sus síntomas o trastornos no mejoran o si empeoran, llame al médico.

- No comparta su medicamento con otras personas ni tome el medicamento de ninguna otra persona.
- Lleve consigo una lista de todos los medicamentos que toma (recetados, productos naturales, suplementos, vitaminas, medicamentos que obtuvo sin receta). Entregue esta lista al médico.
- Hable con su médico antes de comenzar a tomar cualquier medicamento, ya sea uno recetado o sin receta, productos naturales o vitaminas.
- Algunos medicamentos pueden tener otro folleto informativo para el paciente. Si tiene alguna pregunta sobre este medicamento, hable con su médico, enfermera, farmacéutico u otro proveedor de atención médica.
- Si cree que ha habido una sobredosis, llame al centro de toxicología local o busque atención médica de inmediato. Prepárese para responder qué se ingirió, qué cantidad y cuándo.

## **Exención de responsabilidad y uso de la información del consumidor**

No se debe utilizar esta información para decidir si se debe tomar este medicamento o cualquier otro. Solamente el proveedor de atención médica tiene el conocimiento y la capacitación para decidir qué medicamentos son adecuados para un paciente específico. Esta información no recomienda ningún medicamento como seguro, eficaz o aprobado para tratar a ningún paciente o enfermedad. Es solamente un breve

resumen de información general sobre este medicamento. NO incluye toda la información sobre los usos, las instrucciones, las advertencias, las precauciones, las interacciones, los efectos secundarios o los riesgos posibles que podrían aplicarse a este medicamento. Esta información no constituye asesoramiento médico específico y no reemplaza la información que usted recibe de su proveedor de atención médica. Debe hablar con el proveedor de atención médica para obtener información completa sobre los riesgos y los beneficios de tomar este medicamento.

## Copyright

© 2019 Wolters Kluwer Clinical Drug Information, Inc. y sus licenciantes y/o afiliados. Todos los derechos reservados.

Si tiene preguntas, llame a un miembro de su equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor de cuidados de la salud después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y los feriados, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite [www.mskcc.org/pe](http://www.mskcc.org/pe) y podrá hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.

---

Bismuth Subcitrate, Metronidazole, and Tetracycline - Generated on July 19, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center