



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Preparación intestinal para su cirugía ginecológica

En esta información, se explica cómo hacer una preparación intestinal (eliminar la caca del cuerpo) antes de su cirugía ginecológica.

Compre los artículos necesarios

Compre los siguientes insumos en cualquier farmacia. No necesita receta médica.

- 1 frasco (de 238 gramos) de polietilenglicol (MiraLAX®).
- 1 botella (64 onzas (1.9 litros)) de líquido claro. Para ver una lista de líquidos claros, lea la sección “Lleve una dieta de líquidos claros”.
- Líquidos claros adicionales para beber mientras sigue una dieta de líquidos claros.

Es posible que su proveedor de cuidados de la salud haya enviado a su farmacia la receta de los siguientes antibióticos:

- Metronidazole (Flagyl®, Metrogel®), comprimidos de 500 mg.
- Neomycin (Neo-Fradin®), comprimidos de 500 mg.

No olvide recoger también estos antibióticos, si los tiene que tomar.

El día antes de su cirugía

Siga una dieta de líquidos claros

El día antes de su cirugía, tendrá que hacer una dieta de líquidos claros. En una dieta de ese tipo solo se incluyen líquidos que sean transparentes. Puede

encontrar ejemplos en la tabla de la “Dieta de líquidos claros”.

Mientras siga una dieta de líquidos claros:

- Trate de tomar por lo menos un vaso (8 onzas) de líquido claro cada hora mientras esté despierto.
- Tome líquidos claros de distintos tipos. No tome solamente agua, café y té.
- No tome líquidos que no sean transparentes, como leche o batidos.
- No tome líquidos sin azúcar, a menos que tenga diabetes y que se lo indique un integrante de su equipo de atención médica.
- No coma ningún alimento sólido.

Cómo seguir una dieta de líquidos claros si padece diabetes

Pregúntele al proveedor de cuidados de la salud que trata su diabetes:

- Qué hacer mientras sigue una dieta de líquidos claros.
- Si necesita cambiar su dosis de insulina u otros medicamentos para la diabetes, si los toma.
- Si debe tomar líquidos claros sin azúcar.

Controle el nivel de azúcar en la sangre con frecuencia mientras siga una dieta de líquidos claros. Si tiene preguntas, hable con su proveedor de cuidados de la salud.

Dieta de líquidos claros		
	Puede ingerir	No ingiera
Sopas	<ul style="list-style-type: none">• Caldo y consomé.	<ul style="list-style-type: none">• Cualquier producto con trozos de comida o condimentos.
Dulces	<ul style="list-style-type: none">• Gelatina, como Jell-O®.• Hielo de sabores.• Caramelos duros, como Life Savers®, gotas de limón y mentas.	<ul style="list-style-type: none">• Todos los otros dulces.

Bebidas	<ul style="list-style-type: none"> Jugos de frutas claros, como limonada o jugo de manzana, arándano y uva. Refrescos, como ginger ale, 7-UP®, Sprite® y seltzer. Bebidas deportivas, como Gatorade® o Powerade®. Café negro o té sin leche o crema. Agua, incluida agua gasificada (con gas) y saborizada. Bebidas nutritivas claras, como Boost® Breeze, Ensure Clear™, Pedialyte® y Diabetishield®. 	<ul style="list-style-type: none"> Jugos con pulpa. Néctares. Batidos o licuados. Leche, crema y otros productos lácteos. Leches de frutos secos, leches vegetales, cremas no lácteas y otras alternativas lácteas. Bebidas con alcohol.
---------	--	--

Tome la preparación intestinal MiraLAX

La mañana del día antes de su cirugía, mezcle los 238 gramos de MiraLAX con las 64 onzas (casi 2 litros) de líquido claro hasta que el polvo de MiraLAX se disuelva. Una vez que el polvo esté disuelto, si lo desea, puede poner la mezcla en el refrigerador.

A las 5:00 p. m. del día antes de su cirugía, comience a tomar la mezcla de MiraLAX. Causa defecaciones frecuentes, así que asegúrese de estar cerca de un baño.

- Tome 1 taza (8 onzas, 236 ml) de la mezcla cada 15 minutos hasta que se termine.
- Cuando haya terminado de tomar la mezcla MiraLAX, tome de 4 a 6 vasos de líquidos claros. Luego puede seguir tomando líquidos claros, aunque no es obligatorio.
- Aplique petroleum jelly (como Vaseline®), pomada de óxido de zinc (como Desitin®) o crema de vitamina A y D (como pomada A+D®) en la piel alrededor del ano (abertura por donde las heces salen del cuerpo) después de cada defecación. Esto ayuda a prevenir la irritación.

Tome los antibióticos, si se los indicaron

Si su proveedor de cuidados de la salud le indicó que tomara antibióticos

(metronidazole, neomycin o ambos) antes de su cirugía, tómelos en los siguientes horarios.

- A las 7:00 p. m. de la noche antes de su cirugía, tome 1 comprimido de metronidazole y 2 comprimidos de neomycin.
- A las 11:00 p. m. de la noche antes de su cirugía, tome 1 comprimido de metronidazole y 2 comprimidos de neomycin.

Instrucciones sobre lo que debe comer



Deje de comer a la medianoche (12 a. m.) de la noche antes de su cirugía. Esto incluye caramelos y chicles.

Es posible que su proveedor de cuidados de la salud le haya dado instrucciones diferentes sobre cuándo debe dejar de comer. Si es así, siga sus instrucciones. Algunas personas necesitan ayunar (no comer) durante más tiempo antes de la cirugía.

El día de su cirugía

Instrucciones sobre lo que debe beber

Entre la medianoche (12 a. m.) y 2 horas antes de su hora de su llegada, beba únicamente los líquidos de la siguiente lista. No coma ni beba nada más. Deje de beber 2 horas antes de la hora de llegada.

- Agua.
- Jugo de manzana claro, jugo de uva claro o jugo de arándanos claro.
- Gatorade o Powerade.
- Café negro o té. Se puede añadir azúcar. No añada nada más.
 - No añada ninguna cantidad de ningún tipo de leche o crema. Esto incluye las leches y cremas vegetales.
 - No añada miel.
 - No añada jarabe aromatizado.

Si tiene diabetes, preste atención a la cantidad de azúcar que contienen las

bebidas que toma. Será más fácil controlar sus niveles de azúcar en la sangre si incluye versiones de estas bebidas sin azúcar, bajas en azúcar o sin azúcares añadidos.

Es útil mantenerse hidratado antes de la cirugía, así que beba líquido si tiene sed. No beba más de lo necesario. Recibirá líquidos por vía intravenosa (VI) durante su cirugía.



Deje de beber 2 horas antes de la hora de llegada. Esto incluye agua.

Es posible que su proveedor de cuidados de la salud le haya dado instrucciones diferentes sobre cuándo debe dejar de beber. Si es así, siga sus instrucciones.

Tome sus medicamentos según le indicó el médico

Un integrante de su equipo de atención médica le dirá qué medicamentos tomar la mañana de su cirugía. Tome solo esos medicamentos con un trago de agua. Según lo que tome habitualmente, pueden ser todos, algunos o ninguno de sus medicamentos matutinos habituales.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Bowel Prep for Your Gynecologic Surgery - Last updated on February 9, 2022

Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center