

EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Cuidado de la herida después de su procedimiento cutáneo con suturas

Esta información explica cómo cuidar de la herida después de su procedimiento cutáneo con suturas (puntos).

A usted se le sometió a un procedimiento para extirpar una lesión preocupante en la piel. Es importante cuidar de la herida después del procedimiento cutáneo para prevenir infecciones y permitirle cicatrizar con poco dolor o molestia.

Cuidado de la herida en casa

- Déjese las curitas en la herida durante _____ horas después de su procedimiento. Manténgalo limpio y seco.
- Retire las curitas después de _____ horas.
- Si su médico o enfermero le dijeron que aplique hielo en la herida, puede poner una compresa de hielo sobre la herida cada hora mientras esté despierto durante _____ minutos. Haga esto durante las primeras 24 a 48 horas (1 a 2 días) después de su procedimiento. Esto ayudará a reducir el sangrado, el dolor y la hinchazón.
- Si tiene Steri-Strips™ (tiras de cinta) sobre la herida, no se las quite. Se caerán solas lentamente durante la primera semana después de su procedimiento.
 - Primero, comenzarán a levantarse los bordes de las Steri-Strips. Recorte los bordes con una tijera a medida que comiencen a despegarse.
 - Es normal ver sangre seca en las Steri-Strips.
 - Si el médico o enfermero le dijeron que se las dejara hasta la cita de seguimiento, no se las quite.
- Puede ducharse _____ horas después de su procedimiento. Es posible que su proveedor de cuidados de la salud le pida que mantenga secas las Steri-Strips hasta su próxima consulta.
 - Permita que el agua de la ducha corra suavemente sobre la herida.
 - Seque la herida con golpecitos utilizando una gasa o toallita limpia y seca.
 - No tome baños de inmersión, no nade ni se sumerja en una tina de hidromasaje

hasta que la herida haya cicatrizado.

Limpieza de la herida

Limpie la herida todos los días. Haga esto durante ____ días/semanas después de su procedimiento o hasta la cita de seguimiento. Siga las siguientes instrucciones cada vez que limpie la herida.

Materiales

Necesitará los siguientes artículos para limpiar la herida:

- Un paquete de bastoncillos de algodón (Q-tips®)
- Un paquete de gasas antiadherentes
- Cinta de papel
- Curitas adhesivas (Band-aid®) cortadas del tamaño de la herida
- Solución _____
- Pomada _____
- Gasa o toallita seca y limpia

Instrucciones para limpiar la herida

1. Reúna los materiales.
2. Lávese las manos con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos, o use un desinfectante de manos a base de alcohol.
3. Limpie la herida con la solución _____.
4. Seque la herida con golpecitos suaves utilizando una gasa o toallita limpia y seca. No frote la zona.
5. Use bastoncillos de algodón para ponerse pomada _____ en la herida.
6. Cubra la herida con gasa antiadherente o curitas adhesivas (Band-aid) cortadas del tamaño de la herida. Si utiliza gasa antiadherente, sujétela con cinta de papel.
7. Cuando termine, lávese las manos con agua tibia y jabón durante al menos 20 segundos o use un desinfectante de manos a base de alcohol.

Siga estas instrucciones por _____ días/semanas o hasta que la herida haya cicatrizado.

Otras instrucciones:

Cómo hacer frente al dolor después de su procedimiento

Es posible que sienta dolor o molestia después de su procedimiento. Para ayudarle con esto, tome acetaminophen (Tylenol®) o acetaminophen extrafuerte (Extra Strength Tylenol®).

- No tome aspirin ni medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID) como ibuprofen (Advil®) o naproxen (Aleve®). Estos medicamentos dificultan la coagulación de la sangre, lo que posiblemente aumente el sangrado.
- Siga las indicaciones de dosis que vienen en el envase. Si esta dosis no le ayuda con el dolor, llame al consultorio de su médico.
- Si es alérgico al acetaminophen o si no puede tomarlo debido a una enfermedad, pregunte a su proveedor de cuidados de la salud qué puede tomar en su lugar.
- Si está participando en un ensayo clínico de tratamiento contra el cáncer, pregúntele a su oncólogo (médico especializado en cáncer) qué analgésicos puede tomar.
- También puede aplicarse una compresa de hielo sobre la herida para reducir el dolor, la hinchazón y los moretones. Coloque una compresa de hielo sobre la herida durante 15 a 20 minutos cada hora o de acuerdo con las indicaciones de su proveedor de cuidados de la salud.

Sangrado y moretones después de su procedimiento

- Es posible que tenga sangrado y moretones después de su procedimiento. Por lo general, esto desaparece después de ____ días.
- Si tiene sangrado, presione firmemente la herida con una gasa limpia durante ____ minutos. Una compresa fría también ayudará a disminuir el sangrado. Si el sangrado no se detiene después de aplicar presión, llame al _____ (línea de emergencia).
 - Si la herida se encuentra por encima del cuello, aplique presión sobre el sitio, siéntese y use almohadas para elevar la cabeza ligeramente. Si la herida se encuentra en el brazo o la pierna, aplique presión sobre el sitio, y eleve el brazo o la pierna por encima del nivel del pecho.

Actividades

- No haga ejercicios vigorosos, como correr o levantar cosas pesadas, durante _____ semanas.
- Pregunte al médico o enfermero cuándo puede levantar objetos de un peso superior a 5 libras (2.3 kilogramos). Quizás pueda hacer esto inmediatamente después de su procedimiento o tal vez deba esperar hasta que sea seguro para usted hacerlo.
- Consulte al médico o los enfermeros antes de comenzar cualquier actividad de gimnasia, como correr, trotar o levantar pesas.
- Si su procedimiento cutáneo fue en el cuello, el rostro, la espalda o el cuero cabelludo, no se incline repetidamente a la altura de la cintura hasta que le retiren las suturas. Es posible que el médico le diga que espere _____ semanas.
- La herida no debe sumergirse (como en una piscina, tina o tina de hidromasaje) hasta que se retiren las suturas y la herida haya cicatrizado por completo.

Sueño

- Si el procedimiento cutáneo fue por encima del cuello, duerma con el respaldo de la cama levantado 45 grados durante los primeros ____ días después de su procedimiento. Puede hacer esto durmiendo con 2 almohadas debajo de la cabeza.
- Si el procedimiento cutáneo fue en un brazo o en una pierna, duerma con esa parte del cuerpo levantada por encima del nivel del corazón. Puede hacer esto apoyando el brazo o la pierna en almohadones.
- Pregunte al enfermero si debe evitar acostarse sobre la herida o ejercer presión sobre ella durante las primeras 48 horas. Al hacerlo, puede ayudar a reducir la irritación y el sangrado.

Proceso de cicatrización

Puede que la piel del sitio de la herida cambie de color (rosa o rojo) hasta por 1 año después de su procedimiento. Es posible que en algunas personas esto dure aún más.

Una vez que la herida haya cicatrizado, aplíquese un protector solar de amplio espectro con un SPF de 30, como mínimo, en la zona. Esto ayudará a proteger la cicatriz de la exposición al sol.

Eliminación de las suturas

- Si tiene suturas no solubles, deberá regresar al consultorio del médico para que se

las quiten. Programe la cita para que le retiren las suturas en _____ días/semanas.

- Si tiene suturas solubles, se disolverán solas. Esto puede tardar de 1 a 2 meses como máximo.
 - Continué verificando las suturas hasta que se hayan disuelto. Probablemente, tengan el aspecto de un pequeño trozo de hilo blanco en la herida. Si las suturas no son una molestia para usted, permita que se disuelvan completamente. Si las suturas comienzan a ser una molestia, llame al consultorio del médico.

Cuándo llamar al proveedor de cuidados de la salud:

Llame a su proveedor de cuidados de la salud si tiene alguno de los siguientes síntomas:

- Tiene una temperatura de 100.4 °F (38 °C) o superior
- Escalofríos (sensación de frío y temblores)
- Cualquiera de los siguientes síntomas en la herida o en la zona alrededor de esta:
 - Aumento del enrojecimiento o la hinchazón
 - Aumento del dolor o las molestias
 - Piel que se siente dura, tibia o caliente al tacto
 - Drenaje de color verde o amarillo brillante
 - Sangrado que no se detiene después de aplicar presión sobre la zona durante 30 minutos
 - Mal olor
 - La herida aparentemente se abrió
 - Erupción cutánea
 - Formación de ampollas
 - Drenaje que atraviesa las curitas
 - Cualquier pregunta o problemas inesperados

Si tiene preguntas o inquietudes, hable con un integrante del equipo de atención. Puede comunicarse con ellos de lunes a viernes, de 9 a. m. a 5 p. m. al _____ . Después de las 5:00 pm, los fines de semana y los feriados, llame al _____. Si no hay ningún número en la lista o no está seguro, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Caring for Your Wound After Your Skin Procedure With Sutures - Last updated on May 22, 2026
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center

Última actualización

May 22, 2026

Learn about our [Health Information Policy](#).

Díganos qué piensa

Díganos qué piensa

Sus comentarios nos ayudarán a mejorar la información educativa que brindamos. Su equipo de atención no puede ver nada de lo que escriba en este formulario para comentarios. No lo use para consultar sobre su atención. Si tiene preguntas sobre su atención, comuníquese con su proveedor de cuidados de la salud.

Cuando leemos los comentarios, no podemos responder preguntas. No escriba su nombre ni su información personal en este formulario para comentarios.

¿Esta información fue fácil de entender?

Sí

Algo

No

¿Qué podríamos haber explicado mejor?

No escriba su nombre ni su información personal.

Enviar