



EDUCACIÓN PARA PACIENTES Y CUIDADORES

Cuidado de la herida después de la excisión en los Servicios para Tumores Gástricos Mixtos

Esta información le ayudará a cuidar de la herida después de la excisión en los Servicios para Tumores Gástricos Mixtos.

A usted se le hizo un procedimiento para extraer una zona sospechosa de piel o tejido. A este procedimiento se le llama excisión.

La herida se cerró mediante suturas (puntos). Es importante cuidar ella para evitar infecciones y ayudar a que cicatrice. Su enfermero leerá estas instrucciones con usted antes de que se vaya a casa.

Cuidado de la herida

- Puede quitarse la tiritita unas horas después de su procedimiento. Es posible que la tiritita tenga sangre. Esto es normal.
- Puede que la herida tenga un aspecto diferente de la

piel que la rodea. Esto es normal y mejorará con el tiempo. También es posible que la herida esté sensible. Mientras esté cicatrizando, la herida puede tener el siguiente aspecto:

- Rojo
- Negro
- Magullado
- Es posible que el sitio de la herida esté tapado con Steri-Strips® (tiras delgadas de cinta de papel) o Dermabond® (pegamento quirúrgico).
 - Si la incisión está tapada con Steri-Strips, déjelas puestas hasta que se caigan solas. Si después de 10 días no se han caído, puede quitárselas con delicadeza.
 - Si la herida está cubierta de Dermabond, no retire el pegamento. Se saldrá por sí solo. Si no se ha salido después de 10 días, puede quitárselo con agua, jabón y un paño. Pásese el paño húmedo por la zona con mucha delicadeza hasta que el pegamento se salga.
- Es posible que le salga un líquido rosa por la herida durante unas horas después del procedimiento. Esto es común y no constituye un problema. Para ayudar con esto, presione la zona con suavidad durante 5 minutos.

Si la tiritita está muy mojada, cámbiela por una seca y llame al proveedor de cuidados de la salud.

- Puede ducharse 24 horas después de su procedimiento. Antes de ducharse debe quitarse la tiritita. Puede dejar que el agua de la ducha corra por encima de la herida, pero no sumerja la herida en el agua. Limpie la herida con agua y jabón, y séquela dándose palmaditas con una toalla limpia. No es necesario que se coloque otra tiritita en la herida después de ducharse.

A menos que su proveedor de cuidados de la salud le indique lo contrario:

- No se ponga cremas, pomadas ni lociones en la herida.
- No se cubra la herida con una tiritita, a menos que la ropa la irrite.

Suturas

Hay algunas suturas que no es necesario retirar porque el cuerpo las absorbe. Se llaman suturas reabsorbibles.

Después de que el sitio haya cicatrizado, su proveedor de cuidados de la salud retirará las suturas que el cuerpo no absorba. El enfermero le indicará qué tipo de suturas tiene usted.

Extracción de las suturas

- **Suturas no reabsorbibles:** regresará al consultorio de su proveedor de cuidados de la salud para que le retiren las suturas en unos pocos días o semanas. Si aún no ha programado una cita para esto, llame a su proveedor de cuidados de la salud para agendarla.
- **Suturas reabsorbibles:** siga observando las suturas hasta que estas se reabsorban, lo que puede llevar de 1 a 2 meses. Es posible que vea un hilo pequeño en el extremo de la herida. Este probablemente pertenece a las suturas que aún no se han reabsorbido. Si tiene alguna inquietud, llame al consultorio de su proveedor de cuidados de la salud.

Dolor

Es posible que sienta dolor después del procedimiento. Para ayudar a aliviarlo, tome algún medicamento sin receta, como acetaminophen (Tylenol®) o ibuprofen (Advil®). Es posible que el proveedor de cuidados de la salud le diga que se coloque una bolsa de hielo en la zona afectada para contribuir a aliviar el dolor.

Si le han recetado un analgésico, tómelo como el proveedor de cuidados de la salud le haya indicado.

Actividades

Puede retomar la mayoría de las actividades inmediatamente después del procedimiento. No haga ninguna de las actividades siguientes hasta que el proveedor de cuidados de la salud le indique que es seguro hacerlo:

- No levante ningún objeto que pese más de 5 libras (2.3 kilogramos).
- No haga ejercicios intensos, como correr, trotar y levantar pesas. Su proveedor de cuidados de la salud le dará instrucciones sobre qué tipo de ejercicios y movimientos puede hacer mientras cicatrizan las heridas.

Sueño

Si la herida se encuentra por encima del cuello, duerma con la cabeza levantada 45 grados durante los primeros 10 días después del procedimiento. Puede hacer esto durmiendo con 2 almohadas debajo de la cabeza.

Cicatrices

Durante un período de hasta un año después de la cirugía, es posible que la piel del sitio donde se encuentre la herida tenga un color diferente (rosa o rojo). Una vez que la herida haya cicatrizado, aplique un protector solar de

amplio espectro en la zona, que tenga un factor de protección (SPF) de 30 como mínimo. Esto protegerá la herida para que no se forme cicatriz.

Llame al proveedor de cuidados de la salud si tiene:

- Drenaje amarillento que sale por la herida
- Fiebre superior a 100.4 °F (38 °C)
- Una zona de enrojecimiento o hinchazón que mide más de $\frac{1}{4}$ de pulgada (aprox. 6 mm) alrededor de la herida
- Aumento del dolor o las molestias alrededor de la herida
- Piel alrededor de la herida que está dura o caliente al tacto
- Escalofríos (temblores)
- Cualquiera de los siguientes síntomas en la herida o en la zona alrededor de esta:
 - Mal olor
 - Si parece que la herida se abrió

Uso de MSK MyChart

MSK MyChart (mskmychart.mskcc.org) es su cuenta del portal para pacientes de MSK. Por medio de MSK MyChart puede enviar y recibir mensajes de su equipo de atención

médica, ver los resultados de sus exámenes, ver las fechas y horas de sus citas, entre otras cosas.

Si aún no tiene una cuenta de MSK MyChart, puede crear una en my.mskcc.org. También puede comunicarse con el servicio de ayuda de MSK MyChart llamando al 646-227-2593.

If you have questions or concerns, contact your healthcare provider. A member of your care team will answer Monday through Friday from 9 a.m. to 5 p.m. Outside those hours, you can leave a message or talk with another MSK provider. There is always a doctor or nurse on call. If you're not sure how to reach your healthcare provider, call 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y busque en nuestra biblioteca virtual.

Caring for Your Wound After Your Excision in the Gastric Mixed Tumor Service - Last updated on January 31, 2025
Todos los derechos son propiedad y se reservan a favor de Memorial Sloan Kettering Cancer Center