



EDUCACIÓN DE PACIENTES Y CUIDADORES

Cuidado de sí mismo después de la extracción del puerto implantado o catéter Broviac® para pacientes pediátricos

En esta información se explica cómo cuidarse luego de la extracción del puerto implantado o catéter Broviac®. En el resto de este recurso, nuestro uso de la palabra “usted” y “su” se refiere a usted o a su hijo.

Cómo hacer frente al dolor

- Cuando se despierte después de su procedimiento, la zona en la cual se le colocó el puerto o catéter estará adormecida. Esto es porque el médico utilizó anestesia local (medicamento que adormece una zona del cuerpo).
- La anestesia desaparecerá después de algunas horas. Si tiene dolor, tome analgésicos como se lo haya recomendado su proveedor de cuidados de la salud (HCP).
- Llame a su HCP si aún siente dolor después de tomar analgésicos.

Información sobre la incisión

- Tendrá un vendaje sobre el sitio de la incisión (corte quirúrgico).
- Tendrá suturas (puntos) debajo de la piel, que se disuelven y no es necesario quitarlas.
- Es posible que vea un hilo claro que le sale de la incisión. Este es el extremo de las suturas. El enfermero posiblemente lo corte en su próxima cita.
- También tendrá Steri-Strips™ (tiras pequeñas de cinta de papel) o pegamento (Dermabond®) sobre el sitio de la incisión debajo del vendaje.

- Las incisiones cicatrizarán después de 6 a 8 semanas.

Cuidado del sitio de la incisión

- No se duche por 48 horas después de su procedimiento. Mantenga el vendaje que se encuentra sobre la incisión limpio y seco.
- Después de 48 horas, puede quitarse el vendaje y ducharse. Lávese suavemente la incisión con agua y jabón. Enjuáguese bien la piel y séquela dándose palmaditas con una toalla suave.
- Después de la ducha, puede dejar descubierta la incisión. No será necesario que coloque otro vendaje.
- No tome baños ni entre en una piscina por 2 semanas después de su procedimiento.
- Las Steri-Strips comenzarán a aflojarse y se caerán en 7 a 10 días. Si no se han caído después de 10 días, puede quitárselas.

Actividades

- Después de su procedimiento, podrá volver a su dieta habitual.
- No levante nada que pese más de 10 libras (4.5 kilogramos) por 2 semanas.
- No practique deportes de contacto (como fútbol o rugby) por 6 a 8 semanas.
- Díganos si necesita una nota para la escuela o el trabajo.

Llame a su proveedor de cuidados de la salud si tiene:

- Cualquier signo de infección alrededor del sitio de la incisión después de los primeros días, como por ejemplo:
 - Enrojecimiento
 - Dolor ligero
 - Inflamación
 - Moretones

- Cualquier forma de supuración de la incisión
- Una temperatura de 100.4 °F (38.0 °C) o superior
- Dolor que no se controla con medicamentos

Información de contacto

Si tiene preguntas o inquietudes, hable con su proveedor de cuidados de la salud. Si llama entre las 9:00 AM y las 5:00 PM, llame al médico o enfermero al 212-639-7002. Después de las 5:00 PM, los fines de semana y los feriados, llame al 212-639-2000 y pida hablar con el médico que esté de guardia en lugar de su médico.

Si tiene preguntas, llame a un miembro de su equipo de atención médica directamente. Si es paciente de MSK puede comunicarse con un proveedor de cuidados de la salud después de las 5:00 PM, durante los fines de semana y los feriados, llame al 212-639-2000.

Para obtener más recursos, visite www.mskcc.org/pe y podrá hacer búsquedas en nuestra biblioteca virtual.

Caring for Yourself after the Removal of Your Implanted Port or Broviac® Catheter for Pediatric Patients - Last updated on April 17, 2019

©2019 Memorial Sloan Kettering Cancer Center